



11. 3. 79



SVMMA PLANTARVM
QVÆ HACTENVS INNOTVERVNT .
METHODO LINNÆANA
PER GENERA ET SPECIES
DIGESTA ILLUSTRATA DESCRIPTA
A FVLGENTIO VITMAN

AB. VALLVMBROS.

2M B. MEDIOL. LYG. PVBL. BOTANICIS PROF.


ET PLVR. ACAD. SOC.

TOMVS VI.



MEDIOLANI. MDCCXCII.

2YPSI IMPER. MONAST. S. AMEROSII MAJORIS.
SVPERIORVM PERMISSV.



9

CLASSIS XXIII.
POLYGAMIA.
~
MONOECIA.

1362. *Musa*. *Hermaphroditus*. Cal. spatha magna, oblonga, multifi. Cor. 2-petal. altero erecto, 5-dent., altero nectarifero, concavo, brevior. Filam. 6. horum quinque perfecta. Styl. 1. Germ. inferum abortiens.
Hermaphrodita. Cal. cor. filament. Pistillum hermaphroditi, filamento 1. perfecto. Bacca oblong. triquetra, infera.
1366. *Holcus*. *Hermaph.* Cal. gluma 1-2-fl. Cor. gluma aristata. Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1., folliculo fixum.
Mas. Glum. 2-valv. Cor. o. Stam. 3.
1369. *Cenchrus*. Involucr. laciniatum, echinatum, 2-fl. congestum. Cal. gluma 2-fl. altero masc. altero hermaphrod.
Hermaphr. Cor. gluma mutica. Stam. 3. Styl. 1.
Mas. Cor. gluma mutica. Stam. 3.
1368. *Ischaemum*. *Hermaph.* Cal. gluma 2-fl. Cor. 2-valv. Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.
Mas. Cal. & cor. prioris. Stam. 3.
1371. *Manisuris*. *Hermaph.* Cal. gluma 2-valv. 1-fl. valvula exteriore lateribus, apiceque emarginata. Cor. calyc. minor. Stam. 3. Styl. 2-fid.
Mas. ut in *hermaphrod.* sed fl. lateris inferioris eiusdem spicae magis exstantibus.
1370. *Aegylops*. *Hermaphr.* Cal. gluma sub 3-fl. cartilaginea. Cor. gluma 3-arist. Stam. 3. Styli 2. Sem. 1. oblong. valvulae cor. interiori accretum.
Mas. Cal. & cor. gluma hermaph. Stam. 3.
1364. *Spinifex*. *Hermaphr.* Cal. gluma 2-valv. 2-fl. valvulis rachis parallelis. Cor. 2-valv. mutica. Stam. 3. Styli 2.
Mas. ut in *hermaphrod.*

POLYGAMIA MONOECIA.

Differt a Lulin calyc. valvulis 2. a Tritico non transversis.

1365. *Andropogon*. *Hermaphr.* Cal. gluma 1-fl. Cor. gluma basi aristata. Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.
Mas. Cal. cor. prioris. Stam. 3. Sem. 1. folliculo involutum, aristatum.
1367. *Apluda*. *Hermaphr.* Cal. gluma comm. 2-valv. flosculo femin. sessili; masculis pedunculat.
Fem. Cal. o. Cor. 2-valv. Styl. 1. Sem. 1. testum.
Mas. Cal. o. Cor. 1-valv. Stam. 3.
1372. *Valantia*. *Hermaphr.* Cal. o. Cor. 4-part. Stam. 4. Styl. 2. fid Sem. 1. tridentat.
Mas. Cal. o. Cor. 3 4. part. Stam. 3 4. Pistil. obsoletum.
1378. *Ophioxylon*. *Hermaphr.* Cal. 5-fid. Cor. 5-fid. infundibulifor. Stam. 5. Pist. 1.
Mas. Cal. 2-fid. Cor. 5-fid. infundibulif. ore nario cylindrico. Stam. 2.
1380. *Celtis*. *Hermaphr.* Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 3. Styl. 2. Drupa 1-sperm. subrotund.
Mas. Cal. 5-7-part. vel 5-phyll. Cor. o. Stam. 6.
1363. *Verastrum*. *Hermaphr.* Cal. o. Cor. 6-petal. Stam. 6. Pistil. 3. Caps. 3. polysperm.
Mas. Cal. Cor. Stam. prioris. Pistil. rudimentum.
Flos persistens. Petal. serrata.
1379. *Acer*. *Hermaphr.* Cal. 5 fid. coloratus. Receptacul. balsamicum, tuberculofum, rotundum, intra calycem. Cor. 5-petal. Stam. 8. Pist. 1. Caps. 2-3. monosperm. alatae.
Mas. ut in hermaphr.
1381. *Couquilia*. *Hermaphr.* Cal. 5-fid. Cor. o. Anth. 5. sub calyptra testis. Styl. 3-fid. Fruct. inferus, 3 queter, 3-partibilis.
Mas. Simil. absque germine, & stigmate.
1383. *Mimosa*. *Hermaphr.* Cal. 5-dent. Cor. 5-fid. Stam. 5-plura. Pist. 1. Legum.
Mas. Cal. & cor. prioris. Stam. 4-100.
Mimosa Tourn. Legum. articul. Fol. sensitiva tactui.
Acacia Tourn. Legum. cylindr. Fol. tactui non sensu moventia.
1376. *Bradeia*. *Hermaphr.* Cal. Amenti squama. Cor. 4-part. superne revoluta. Stam. 4. Pist. 1. Stigma. 2. Drupa nucleo globoso, carnosio.

POLYGAMIA MONOECIA:

3

- Maf.* Calyc. Ameni squamæ 3-fl. Cor. 4-5-part.
Stam. 4-5. fauci inserta. Styl. 2-fid. abortiens.
1375. *Terminalia*. *Hermaphr.* Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 10. Drupa infera, cymbiform.
- Maf.* Flos prioris.
1377. *Clusia*. *Maf.* Cal. 4-6-phyll. foliol. oppositis, imbricatis. Cor. 4-6-pet. Stam. numerosa.
- Fem.* Cal. & cor. maris. Nectar. ex antheris coalitis, germen includens. Capit. 3-locul. 5-valv. pulpa farcta.
1382. *Hermas*. *Hermaphr.* Umbella terminalis. Involucra utraque. Umbellul. rad. truncatis; centrali florifero. Petal. 5. Stam. 5. sterilia. Sem. 2. suborbicul.
- Maf.* Umbellæ lateral. Involuc. utraque. Umbellulæ multifl. Petal. 5. Stam. 5. fertilia.
1393. *Pariceta*. *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. o. Stam. 4. Styl. 2. Sem. 1. elongatum, superum.
- Fem.* Cal. cor. sem. prioris. Stam. o. Styl. 1.
1394. *Atriplex*. *Hermaphr.* Cal. 5-phyll. Cor. o. Stam. 5. Styl. 2-fid. Sem. 1. depressum.
- Fem.* Cal. 2-phyll. Cor. Styl. & sem. prioris.
- Atriplex absque fl. femin. effec Chenopodium.*

* *Æsculus*. *Mammea* Jacq. *Euphorbia*,
Melochia. *Ilex*.

DIOECIA.

1392. *Panax*. *Hermaphr.* Umbella. Cal. 5-dent. superus. Cor. 5-petal. Stam. 5. Styl. 2. Bacca 2-sperm.
- Maf.* Umbella. Cal. integer. Cor. 5-petal. Stam. 5.
1386. *Diospy*. *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. urceolat. 4 fid. Stam. 8. Styl. 4-fid. Bacca 8-sperma.
- Maf.* Omnia ut in priore.
1393. *Chrysa*. *Hermaphr.* Gluma 2-valv. Cor. paleæ numerosæ, setaceæ. Stam. taula, mixta paleis. Pist. 1.
- Maf.* ut in priore. Pist. o.
1389. *Silba*. *Hermaphr.* Cal. exter. 3-phyll. interior 5-dent. cartilagineus. Cor. infundibulif. 5-fida. Stam. 4. Styl. 1. Sem. 1. calyce interiore calyptratum.
- Maf.* Similis. Cal. inter. o. Fruct. o.

A L.

1387. *Nyssa*. *Hermaphr.* Cal. 5-part. Cor. 0. Stam. 5. Pist. 1.
Drupa infera.
Mas. Cal. & cor. prioris. Stam. 10.
1388. *Frazianus*. *Hermaphr.* Cal. 0-4-part. Cor. 0-4-pet. Stam. 2.
 Pist. 1. Fructus linguiformis, membranaceus.
Fem. ut in priore.
1388. *Anthospermum*. *Hermaphr.* Cal. conicus, 4-fid. lacin. oblong. obtusis, revolutis. Cor. 0. Stam. 4. Pist. 2.
Peric. inferum.
Mas, & fem. in eadem, vel distincta planta.
1390. *Arthropus*. *Mas.* Umbella composita. Involuc. 5-phylla. Cor. 5-petal. Stam. 5. Pist. 2, abortientia.
Androg. Umbel. simpl. Involucr. 4-part. spinosum, maximum, continens floscul. maximum in disco plurimos. *Femin.* 4, in radio.
Mas. Petal. 5. Stam. 4.
Fem. Petal. 5. Styl. 2. Sem. 1. 2-locul. inferum.
1384. *Gleditsia*. *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. 4-pet. Stam. 6. Pist. 1. Legum.
Mas. Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Stam. 6.
Fem. Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Pist. 1. Legum.
1391. *Pisonia*. *Herm.* Cal. vix ullus. Cor. campanul. 5-fid. Stam. 5-6. Pist. 1. Caps. oblong. angulata, 5-valv. 1-locul. 1-sperm.
Mas, & fem. nunc in eadem, nunc in diversa planta.

* *Ilex Aquifolium*. *Rhamnus Alaternus*.
Guilandina.

TRIOECIA.

1394. *Ceratonia*. *Hermaphr.* Cal. 5-part. Cor. 0. Stam. 5. Styl. 1.
 Legum. coriaceum, polyspermum, isthmis interceptum, magnum, compressum, nitidum, pulposum.
Dioica. *Mas, & fem.* distincta.
1395. *Ficus*. Fructificat. in cavo pomi carnosu, five calyc. communis contentæ, cuius umbilicus aliquot squamis clauditur.
Mas. Cal. 3-part. Cor. 0. Stam. 3.
Fem. Cal. 5-part. Cor. 0. Pist. 1. Sem. 1.

MONOECIA.

1362. MUSA. *Hermaphroditus*. Cal. spatha, magna, ovata oblong. Cor. 2-petal., altero erecto, 3-dent., altero nectifero, concavo, brevior. Filam. 6. horum 5: perfecta. Styl. 1. Germ. inferum, abortiens.

Hermaphrodita. Cal. cor. filam. pist. hermaphroditi, filam. unico, perfecto. Bacca oblonga, 3-quetra; infera.

1. *paradisaca*. M. spadice nutante; fl. mascul. persistentibus. S. fl. veg. ed. 14.

M. *cliffortiana*. Lin. mus. 1. tab. 1. Trew. chret. tab. 18. 19. 20. Clusi. exot. 219. Sterb. citr. tab. 4. Rumph. amb. 3. tab. 60. Garsin. ad. angl. 1730. tab. 2.

Bata. Hort. mal. 1. tab. 12. 13. 14.

In India 24.

Altitudo 2-orgyal. & ultra. Caudex rotundus, ex quo diffitis intervallis rami exeunt 3-4 simplic. quorum interiores ex exterioribus, a quibus arcte comprehenduntur, ordine sunt decussato. Fol. quæ ramorum summam partem involvunt; oblong-rotunda, & lata, ferme sesquihominis longa, in medio lata ferme unius cubiti, apice, & basi angustiora, glabra, viridis vividi, & nitentis, venis densis parallelis. Fl. & fruct. in cono caudicis oriuntur. Conus spitham. ex pl. fol. oblong. rotundis constans. Cor. basis albid-flavescens, apex glauc-rubens, col. tristi. Petal. crassi, subpellucida, nitentia, venis striata. Fruct. aggregati, subspitham. oblongi, cortice flavo; carne rufa. *Hybrida planta mure Bhai, pare ignota.*

2. *sapientum*. M. spadice nutante; fl. masculis deciduis. Syst. veg. ed. 14. Trew. chret. tab. 21. 22. 23.

In India 24.

Caudex maculatus. Fol. venosa, subrus glauca.

A iv

POLYGAMIA MONOECIA:

Fructus brevior, odoratus. *Hybrida matris Bikat.*

3. *Troglodytarum.* M. spadice erecto: spathis deciduis. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 5. tab. 61.*
In Moluccis.
 Fol. angustiora. Fruct. parvi, crassi, rufi, striis nigricantibus, polyspermi. Caro lutea, dulcis. Officula plana, & fusca.

- Bumelia.* M. vasculis coccin. 5-6-fl. fruct. 3-gon. violac.
Aubl. Guian.
In Guiana.
 Fol. angustiora, acuminata.

1363. *VERATRUM.* *Hermaphr.* Cal. o. Cor. 6-petal. Stam. 6. Pist. 3. Caps. 3, polyspermi.

- Mas. ut in priore, sed pistil. rudiment.
 2. *album.* V. racemo supradecomposito: cor. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 315. Mill. ic. tab. 271. Gunn. norv. tab. 1. Ludw. ed. tab. 137. 138. Black. tab. 74. Dod. pempt. 383.*

Helleborus albus. Clus. hist. 1. p. 274.

In Italia, Helvetia montosis 24.

Caul. 2-4-ped. inferne glaber, superne villosus. Fol. vaginanti-amplexicaul. plicata, integerr. nervosa, lineata, supra virent. & glabra, subtus pallidiora, villosa: inferiora ovato-obtusae; superiora lanceol-acuta. Racemus subped. Petala dilute viridia.

2. *nigrum.* V. racemo composito: cor. patentissimis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 336.*
Helleborus &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 4. f. 1.
In Hungaria, Sibiria apricis siccis 24.
Priori valde adfne, sed minus. Fol. inferiora petiolato-vaginantia, ovalia, acuta; superiora breviora. Pedunc. villosi. Fl. foetentes, atorubentes.

3. *luteum.* V. racemo simplicissimo: fol. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia, Canada.

Rad. bulbosa. Fol. radical. plura, ovato-lanceol. nervosa, firma, glabra. Caul. ped. simplex. Fol. caulina nonnulla, inæqualiter posita, parva, non vaginantia, ut in reliquis, angusta, lanceol. Racemus terminal. primum ovatus, dein longitudine caulis, densus; floscul. parvis, flavis.

Sabadilla. V. Retz. Obs. Fafe. 1.

Habitat

Racemus simpl. spicatus; fl. secundis, subnutantibus, pedunculat. nigro-purpur.

1364. SPINIFEX. *Hermaphr.* Cal. gluma 2-valv. 2-flora, valvulis rachi parallelis. Cor. 2-valv. mutica. Stam. 3. Styl. 2.

Maf. ut in priore.

Differt a Lolio cal. valvulis 2. a Tritico non transversis.

1. *squarrosus*. S. Syst. veg. ed. 14

Arundo &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 8. f. 11.

Ilu-mullu. Hort. mal. 12. p. 75.

In India oriental. arvensis maritimis &c.

Gramen maximum, semillimum *Stipa spinifex*, ut, dempta fructificatione, non distinguendum, (quæ minus). Planta frutescens, glauca. Culmi maximi, crassitie digiti, geniculati; ad genicula acervis fol. instructi, læves, farcti. Fol. graminea, palmaria, convoluta, recurvato-patentia, rigida, apice spinosa, vaginis ampliatis, striatis, ligula lanata. Fascicul. 3-4, terminal. foliorum, inter quæ spicæ sæpius 3. digitum longæ.

1365. ANDROPOGON. *Hermaphr.* Cal. gluma 1-fl. Cor. gluma basi aristata. Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1. follic. involutum, aristatum.

Maf. Cal. Cor. Stam. prioris.

2. *cariosum*. A. spica solitar. imbricata: seminibus hirsutis; aristis nudis, contortis. Syst. veg. ed. 14.

Gramen &c. Rumph. amb. 5. tab. 7. f. 2.

In India.

Culm. 2-ped. & ultra, filiform. geniculati, simplic. vel ramosi, glabri. Fol. digital. alterna, vaginis fauce hirsutis, ensiformia, pilis raris adspersa. Spica digitalis, *Alopecuri*, griseo-hirsuta. Sem. hirsutæ ferruginea testa.

3. *conortum*. A. spica solitaria; floscul. hinc masculis muticis, inde femineis longissim. unito, contortoquæ aristatis. Syst. veg. ed. 14.

Gramen &c. Pluk. alm. tab. 191. f. 5. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 4. f. ult.

In India orient. & in Pedemontii rupibus &c.

Culmi multi, filiform. falcati, debiles, geniculis 3-5. ramosi, rubicundi. Fol. spitham. complicata, basi, & fauce subciliata. Spica imbricata, instar *Alopecuri*, 2-pollic. filiform. coarctata, pedunculata, lævis. Omnes arilæ in unum corpus coalescunt, & contorquentur. Sub cortice purpur. adest sem. album.

3. *erialeum*. A. spica (sæpe) solitar. hirsuta; aristis nudis, geniculat. longissimis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 7.*

In Japonia.

Radic. fasciculatæ, filiform. Culm pl. spitham. psd. simplic. & ramosi, erecti, articulati, glabri, inferne filiform. superne capillar. Rami alterni, quandoq. ramulosi. Fol. digital. alterni, glabra, ad genicula villosa. Spicæ pollicar. lineares. Calycinæ glumæ glabræ.

4. *divaricatum*. A. spica oblonga: fl. remotis, divaricatis, lanatis; arista flexuosa, nuda. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

Spica terminal. conica, laxa, nutans. Lana semine longior.

5. *gryllus*. A. paniculæ pedunculis simpliciss. 3-fl. flosculo hermaphrod. sessili, aristato, ciliato, basi barbato. *Syst. veg. ed. 14.*

Festuca, Bauh. theat. 149. ic. non vero flos festu- sim pictus.

Ægypops &c. Bauh. hist. 2. p. 436. Scheuchz. gram. tab. 6. f. 1.

Gramen &c. Barr. ic. 18. f. 2. Mont. ic. 67.

In Italia, Helvetiæ &c. pratis non irriguis 24.

Culm. 3-ped. 4-nodis. Fol. subtus villosula.

Spica semiped. verticillaris, laxa, nodis ad 7. fusco-rubris. Locustæ longe penolat. Receptacul. rufo villo pubescens. Arista basi tortilis, infracta. Lanugo brevissima, baseos hermaphr.

Obs. Festuca dumetorum &c. Bauh. theat. 149. vulgo ad Avenam fatuam relata, huius synonymon per Haller.

6. *nutans*. A. panicula nutante; aristis tortuosis, lævibus: glumis calycinis hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia, Jamaica ☉.

Habet multa communia cum priore. Culmi multi, ped. geniculati, ramosi, superne subnutan-

tes. Fol. plura, alterna, margine scabra, versus vaginam ciliata. Panicula decomposita, foliosa, peduncul. nudis, pedicellis 2-fl. Fl. ambo aristati; altero sessili. Lanugo brevis in ipsis glumis.

7. *ciliatum*. A. panicula cernua; calyce exteriori multifi. ciliato; aristis contortis, pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In montibus Negascki.

Culm. erectus, 2-ped. simplex, teres, articulatus. Fol. longitudine culmi, vaginantia, pilis sparsis longis, potissimum prope genicula, striata. Lanugo extra calyc. proprium, ferruginea, calyce brevior. Floscul. steriles, pl.

8. *ferratum*. A. panicula laxa; flosculo altero sessili; altero pedicellato, pedicellis hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Culm. erectus, 3-ped. simplex, teres, glaber. Fol. ciliato-ferrata, venosa, glabra, ore vaginalium hirsuto. Panicula spitham. ferruginea. Pedunc. erecti, flexuosi, capillares, glabri. Calyc. inferne nigri, pilosi; superne glabri. Arista fl. quadruplo longior, contorta, glabra, decidua.

9. *cotuliferum*. A. panicula patula, villosa; arista tortili, nuda; pedicellis incrassatis, patheriformibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Culm. 2-ped. crassitie digiti, simpl. articulatus, teres, striatus, glaber. Fol. pedal. vaginantia, linearia, nervosa, fauce villosa, glabra, margine tenuissime ferrulata. Panicula supradecomposita, floscul. deciduis. Pedunc. capillar. flexuosi. Calyc. gluma lanceolat. acuminata, striata, scabra, villosa. Arista calyce duplo longior, patens.

Gramen singulare, quod omnes pedicelli apice concavi pro excipiendo fl.

10. *cymbarium*. A. panicula sparsa, bracteis cymbiformibus; fl. transversis, aristatis, ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India orient.

Culmi orgyal. lævissimi, farcti, maxima parte tecti fol. vaginis, crassitie pennæ. Fol. graminea, maiuscula, pedal. striata, margine sca-

bra, vaginis lævibus. Panicul. ex axillis fol. superiorum, in unam dispersæ, plurimæ, ped. bracteis purpurascens. Cal. comm. 2-phyl.

11. *squarrosum*. A. panicula conferta; glumis subulatis, scabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Supra flagna in Zeylona.

Culmi glabri. Fol. scabriuscula. Flos hermaphrod. sessilis; masculi pedicellati. Cor. ciliata. Panicula, & glumis refert *Agrostidem*.

12. *prostratum*. A. peduncul. umbellato-3-fl. ecalyculatis; flosculo hermaphrodito aristato. Syst. veg. ed. 14. In India orient.

Culmi multi, pedal. prostrati, radicanes, ramulif. geniculati, læves. Fol. plura, alterna, lævia, margine scabra; vaginis compressis, folio latioribus. Peduncul. filiform. ex alis ultimis fol. ramorumq. apicibus. Loco calyc. comm. barba brevis. Simile *cymbario*.

13. *alopencuroides*. A. panicula laxa; rachi lanata; flosculo utroq. arista tortuosa. Syst. veg. ed. 14.

Gramen &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 14. 12b. 70. f. 1.

In Amer. septentrionaliore.

Panicula longa, pedal. angusta, ramulis alternis, longis, ramulosis, col. paleaceo. Lanugo fl. longior, etiam in ipsis glumis.

14. *distachyum*. A. spicis binis terminalibus: culmo indiviso. Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 3. f. 2.

In Helvetia &c. ad rupes 14.

Culm. 2-ped. Rami nulli. Fol. plana, glabra. Spicæ oblong. erectiusculæ, tingulæ ex fl. 20-pl. Calyc. valvula exterior lævis, subtruncata, apice scariosa, pubescente.

15. *Schænanthus*. A. paniculæ spicis coniugatis, ovat-oblongis, rachi pubescente: floscul. sessilibus, arista tortuosa. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 3. tab. 71.

Rad. parva, lignosa, albicans. Caul. pl. pedal. rotundi, geniculati. Fol. triticea, palmum excedentia, firma, crassa, convoluta, & squamatum interstita, inferius lata, albidiora, & subflava, superiore parte mucronata, viridia, aut purpurascens. vaginantia. Spicæ tomento

cardicantes; calyc. læves. *Fol. & fl. odore aromatico.*

16. *virginicum*. A. paniculæ spicis coniugatis; peduncul. simplicibus; rachi lanata, floscul. muticis; masculo t. besciente. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 68. f. 2.

In America.

Culmus altus. Spica villosa, candida.

17. *bisorne*. A. paniculæ spicis coniugatis; peduncul. ramossissimis; rachi lanata; flosculis arista caduca; masculo t. besciente. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. Sloan. hist. 1. tab. 15.

In Brasilia, Jamaica.

Culmi ramosi. Panicula fere sesquicubita, ramossissima, fol. intermixtis. Spica congesta, subcorymbosæ, semipollic.

18. *hirtum*. A. paniculæ spicis coniugatis; calycibus hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. Pluk. alm. tab. 92. f. 1.

In Lusitania, Strelia &c. locis saxosis, & aridis 24.

Geniculi magno fasciculo fol. antiquorum obtecti. Fol. angusta, glauca. Vaginæ longæ. Membrana ovata, acuta, ad basin pilosa. Pedunculi hirti, uti & rachis, & glumæ. *Hirsuties glumarum flore non longior.*

19. *insulare*. A. panicula laxa, glabra; flosculis geminis, muticis; pedicello altero breviora, calycibus lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Panicum lanatum. Rottbœl. Ad. lit. Hafn. 1778. tab. 1. f. 2?

Gramen &c. Slon. Jam. hist. 1. tab. 14. f. 2.

In Jamaica.

Differt ab. A. nutante, quod aristæ desint; quod cal. sit lanatus, nec tantum pubescens; quod singuli fl. proprio peduncul. donentur.

20. *barbatum*. A. spicis digitatis; calyc. persistentibus; cor. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India orient.

Culm. erectus, ped. articular. lævis. Fol. 3. remota, graminea, alterna, angusta, margine scabra, vaginæ barbæ, ciliatæ. Peduncul. sub exitu spicularum incrassatus, pubescens. Spica sæpius 10. conniventes, lineares, æ-

- quales, extrorsum secundæ, erectæ, sessiles.
Anth. albæ. Pist. purpur.
21. *Nardus*. A. paniculæ ramis supradecompositis; proliferis.
Syf. veg. ed. 14.
Culamus odoratus Matth.
Arundo farcta. Rumph. amb. 4. tab. 6?
In India.
Altitudo *Arundinis*. Ex alis fol. summorum pedunc. duo, quorum alter brevior ex sinu producit pedunculos aliquot breves, iterum proliferos; alter longior sæpe prolifer est; hinc panicula mixta foliolis calycem *Avenæ* mentientibus.
22. *muticum*. A. spicis digitatis, subternis: floscul. alternis, sessilibus, muticis. Syf. veg. ed. 14.
Ad cap. b. Sprei.
Culmi multi, spitham. subpilosi, etiam vaginis, & fol. Fol. convoluto-subulata. Spicæ lineares, articulatæ, secundæ. Calyc. 2-valv. acuti, ad latera dehiscentes, virides. Petal. contraria calyci, colorata, tenera. Aristæ nullæ.
23. *Ispahanum*. A. spicis digitatis, plurimis; floscul. sessilibus; aristato, muticoque; pedicellis lanatis. Syf. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 384.
Schreb. gram. P. 2. tab. 33.
Gramen &c. Barr. ic. 753. f. 2. Tabern. ic. 222.
In *Europæ australis aridis, saxosis collibus* 24.
Culm. sesquiped. geniculati, fusci, basi prostrati. Fol. supra glabra, subtus pilosa, angusta, acumin. pallide virentia, vaginantia. Spicæ 2-10. sæpius 6-7. infimæ, & terminal. plerumq. oppositæ, intermediæ alternæ, vel etiam oppositæ. Rachides 1-2-uncial. & fere capillares, erectiuscul. rubentes, pilosæ. Aristæ longæ.
24. *fasciculatum*. A. spicis digitat. plurimis, erectiuscul. articulatis, lævibus: flosculis utriusq. aristatis. Syf. veg. ed. 14.
Gramen &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 3. f. 15.
Sloan. Jam. hist. 1. tab. 69. f. 2.
In Indiis.
Rad. fibrosa, albicans. Culmi geniculati, virid. Spicæ glabræ, fusco-rubescens. & nitidæ.
25. *polydactylon*. A. spicis fasciculatis; petalis exterioribus

aristatis; flosculi infer. ciliato-barbati. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. Swan. Jam. hist. 1. tab. 65. f. 2.

In Jamaica h.

Var. duplex. I. Culm. orgyal. frutescens, simplex, teres, glaber. Fol. lineari-ensiformia, serrata, carinata, glabra, striata. Panícula patula, raro, & parum ramosa: racemi usque spitham. capillar. flexuosi, glabri. Pedicelli alterni, gemini, recurvi.

Var. II. Culm. 3-ped. frutesc. simpl. Panícula simpl. patens. Racemi spitham. simplic. fasciculati, virgati, vel subfastigiati. Pedicelli lineam longi, altero brevior.

Bludvil.

A. spicis subobtusis; floscul. hermaphrod. sessili, aristato: neutro pedunculato, ciliato, mutico. *Retz. Obs. fasc. 2.*

In China.

Culm. simplex, parce foliosus, geniculis barbatis. Fol. graminea, pilis albis sparsis, præcipue ad vaginarum oras. Vaginæ nudæ, striatæ. Spicæ erectæ, lineares, inæqual. indivisæ. Floscul. alterni, geminati, basi pilis albis circumdati.

muricatum.

A. panícula contracta: spicis verticillatis; calycibus muticis, muricatis. *Retz. Obs. fasc. 3.*

Habituat

Gramen 5-ped. & ultra, glabrum. Culm. compressus. Fol. angusta. Panícula spitham. spicis 2-pollic. erectis, flexuosis. Flos mas pedunculat. hermaphr. sessilis. Cal. parvus, subæqual. valvula altera muricata. Pist. purpur. Arista nulla.

provinciale.

A. spicis fasciculat. lævibus, floscul. alternis, subsessilibus, secundis, aristatis. *Retz. Obs. fasc. 3.*

In Gallia meridion. ☉.

Rad. fibrosa. Culmi ped. basi ramosi. Fol. hinc inde ciliata, oris nudis. Spicæ terminal. 15-16. minime umbellatæ, patulæ. Cal. valvul. subulatis, inæqualibus, fl. brevioribus, muticis. Flos hermaphr. valvula exteriore longiore, amplectente, aristata; interiore brevior.

- ciliata. Flos neuter parvus, pedicellatus, aristata brevi. *Facies A. barbati.*
- dulce.* A. spica solitar. imbricata; floscul. muticis. *Burm. Ind.*
Cyperus &c. *Rumpk. amb. 6. tab. 3. f. 1.*
In India.
Rad. Cyperi rotundi, intus albæ.
- Gerardi.* A. spicis digitatis: fl. alterne geminis; hermaphrodito sessili, aristato; masculo pedunculato, mutico. *Gerard. gallo-prev. cum. fig.*
In Gallo provincia.
- gründinaceum.* A. panicula composita, densa, glumis 2-fl. lucidis; floscul. utroq. aristata tortuosa, divaricata. *Berg. Fl. Cap.*
Ad cap. b. Spei.
Culm. altus, geniculatus, teres, striatus, glaber. Fol. subpedal. striata, retrorsum scabra; superiora subulato-teretia, acuta, basi vaginantia.
- anulatum.* A. spicis ad apicem culmi confertis, alternis: fl. geminatis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
Culm. erecti, 2-ped. ramosi, genicul. incrassatis, hirsutis, speciose certe anulorum pilosorum instar, articulis semispitham. cylindricis, lævissimis. Fol. vaginæ 3 poll. striatæ, nudæ. Fol. subpedalia, plana, utrimq. hispida. Vaginæ intra fol. emittunt membranam amplexicaulem, ovatam, imberbem, hyalinam. Spicæ 3-pollic. lineares, quandoq. geminæ, interdum oppositæ, sæpe solitariae, alternæ, patentes. Fl. adpressi, alter sessilis, alter pedicellatus.
- ramosum.* A. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
Culmi cubit. ramosi. Spicæ terminales, conjugatæ, sicuti spiculæ, altera sessilis aristata; altera pedicellata, mutica, utraque 1-fl.
1366. *HOLCUS. Hermaphr.* Cal. gluma 1-2-fl. Cor. gluma aristata. Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1. folliculo adfixum.
Mesf. Cal. gluma 2-valv. Cor. o. Stam. 3.
- τ. spicatus.* H. glumis 2-fl. muticis: fl. geminis, penicillo involu-

involocratiss: spica ovat-oblong. *Syst. veg. ed.* 14.

Panicum americanum. *Clus. hist.* 2. p. 215.

Gramen &c. *Pluk. alm. tab.* 32. f. 4.

In India ☉.

Culm. 2-ped. tectus vaginis fol. hispidis, ut ipse culmus. Fol. saepius 10. latitudine digiti, hispida. Spica 3. unc. longa, crassissima, pedicellis brevissimis, apice fasciculo setarum, intra quena fl. 2. sessiles.

2. *bicolor*.

H. (panicula ovali erecta, coarctata) glumis glabris, nigris: seminibus globosis, albis, subaristatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Ad. helv.* T. 8. tab. 4. f. 4.

Milium &c. *Morif. hist.* 3. f. 8. tab. 5. f. 7.

In Persia ☉.

Simillim. H. *sargo*, sed differt glumis nigris, & seminibus albis.

3. *Sorghum*.

H. (panicula ovali, coarctata, maturescente cernua) glumis viridibus, villosis: seminibus rotundis, compressis, aristatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Ad. helv.* T. 8. tab. 4. f. 3. *Bauh. hist.* 2. p. 447.

H. *Durra*. *Forsk. Æg.*

In India ☉.

Culm. orgyal. Fol. arundinacea. Panicula ped. ramosissima. Cal. virilis, pubescens. Aristæ longæ, inferne fuscæ, superne læves, albidæ.

4. *halapensis*.

H. panicula terminali, acuminata, sparsa; locustis hermaphroditis lanceolat. glabris; seminibus oblongis, complanatis. *Ad. helv.* 8. tab. 4. f. 2.

H. glumis glabris; fl. hermaphrod. muticis; semin. aristato. *Syst. veg. ed.* 14. *Schreb. gram.* tab. 18. ic. optima.

Gramen &c. *Pluk. alm. tab.* 32. f. 1. *Scheuchz. gr. tab.* 11. f. 12. 15.

Andropogon arundinaceum. *Scop. Fl. Carn. All. Fl. Pedem.*

In Syria, Mauritania, Pedemonte &c.

Rad. articulata, alba. Culm. 3-ped. lævis, ad basin septus vaginis fuscis, striatis, villosis. Fol. arundinacea. Panicula palmar. patens, purpur-sc.

Tom. VI.

B

Ad Andropogoni genus spectat.

3. *saccharatus*. H. glumis villosis: feminibus omnibus aristatis.

Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 3. tab. 73.

In India &c.

Radices ex infimis caulis geniculis descendunt in terram. Culm. orgyal. Fol. facie *Sacchari*, linea longitudinali alba. Sem. flavescentia, vel ferruginea.

Differt ab H. sorgho, panicula erecta, subverticillata, racemis potentissim. horizontalibus, subpendulis; nec panicula parva, ovata. Rachis universal. paniculae laevis, nec scabra. Glumae undique villosae, nec tantum apice &c.

6. *mollis*.

H. glumis 2-fl. nudiuscul. floscul. hermaphrod. mutico; masculo arista geniculata. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 20. f. 2.*

Gramen caninum &c. Bauh. hist. 1285. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 23.

In Europae pratis, & pascuis elatioribus &c.

Smile H. lanato, sed calys. acutiores, acuminati magis quam in reliquis. Planta glauco-virid. Geniculi, fol. & vaginæ glabrae. Penicul. 2-unc. magis contracta: florescentiae tempore magis divergens, & spiculum deorsum diriguntur.

7. *lanatus*.

H. glumis 2-fl. villosis; floscul. hermaphr. mutico; masculo arista recurva. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 20. f. 1. Leers. herb. tab. 7. f. 6.*

Gramen pratense &c. Loef. pruss. is. 23. Scheuchz. gram. tab. 4. f. 24. A. B.

Gramen lanatum. Dulac. hist. 423.

In Europae pascuis arenosis, & pratis &c.

Planta mollissima, & fere holosericea. Culm. cespitosi, cubital. & plerumq. geniculati. Fol. cinerea. Panicula 3-unc. erecta, stricta, viridis, alba, aut rubella. Paniculae racemi binati.

8. *laxus*.

H. glumis 2-fl. glabris, acuminatis, muticis; panicula filiform. debili, *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia, Canada.

Habitus Aira caerulea. Culmi 2-ped. angusti, subnutantes. Fol. plura, laevia, margine scabra, ore piloso. Panicula parum admodum ramosa, subnutans.

9. *striatus*. H. glumis 2-fl. striatis, acuminatis, muticis: panicula oblong. conferta. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia paludibus.
 Fol. longa, plana, vaginis crassiuscul. striatis. Panicula adtenuata, peduncul. brevissim. ramosa. Cal. minimus, 1-phyll.
10. *ferratus*. H. glumis 2-fl. pubescentibus, muticis: fol. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spec. 24.
 Rad. repens. Culmi inferne decumbentes, confertim ramosi, vaginis fol. tecti, superius nudii, pedal. simplicissimii. Fol. stricta, magis serrata quam in aliis. Racemus angustus, compositus. Fl. purpurascens.
11. *odoratus*. H. glumis 3-fl. acuminatis, muticis, hermaphrodito diandro. *Syst. veg. ed. 14.*
Crumen marie &c. Loesel. pruss. tab. 26.
In Europa pascuis humentibus 24.
Habitus Melica. Culm. cubital. Fol. glabra, retroversu aspera. Panicula exigua, sescunc. nutans, non valde sparsa, atro-purpur. Floscul. 2. laterales triandri.
12. *latifolius*. H. glumis 3-fl. flosculo primo inermi; duobus margine aculeatis: fol. subovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In India.
 Culmus vix pedal. laevis. Fol. valde lata, vaginis latiuscul. striatis. Paniculae rami simplic. virgati. Fl. ovato-oblong. alterni, solitar. pedicellis capillaribus.
13. *pertusus*. H. spicis digitatis; glumis valvula pertusa. *Syst. veg. ed. 14.*
In India orient.
 Culm. subped. ascendens, ramosus, articulatus, laevis. Fol. graminea, angustiora, remota, alterna. Spicae 5. aequales, lineares, erectiusculae, pedicellatae, subpilosae. Rachis filiform. pilosa. Flosculi petalo exteriore in medio pertuso foraminulo.
-
- Elburnicus*. H. calyc. substinente 2. fl. mascul. totidemq. hermaphroditos. *Scop. Fl. Carn.*
In Carniola.
 Spica 2-unc. Cal. singulus 2-glum. Quandoq. unus flos est masculus, duoq. fertiles; inter-

dum unus fertilis, alio abortiente. Est & unus fertilis; duoque masculi.

- Doctus.* H. paniculæ ramis subternato-verticillaris, patentibus; rudimentis fl. sessilibus, sub fl. fertilibus aristatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Gramen maximum, sæpe 5-uln. Culmi sæpe ramosi, geniculis incrassatis, villosis, flavis. Fol. setiquispitham. lineari-lanceol. plana, viridia, nervis obscurioribus, linea media nivea, glabra, basi marginata, membrana erecta, cauli adpressa. Calyc. glumæ villosæ, flavicantes, ovales, muticæ, apice virides. Cor. parva; alba, villosa, pellucida. Sem. magnitudine *Oryzæ*, ovale, compressum, ferrugineum.

- exiguus.* H. paniculis coarctatis, ramis alternis; rudimentis fl. pedicellatis; sub fl. fertilibus, aristatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Differt a priore, altitudine vix ulna; fol. linearibus; paniculis coarctatis; spicul. lanceolat; rudimentis fl. non sessilibus, sed pedicellatis.

- racemosus.* H. spica cylindrica; spicul. ternatis, pedicellatis; involucr. longissim. setaceis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Prope accedit ad H. Docknam.

Culm. cubit. simplex, superne, ubi nudus, scaber. Folior. vaginæ convolutæ, glabræ, margine ciliatæ. Fol. subpedal. linear. canaliculata, glabra, margine scabra. Spica terminali. spitham. digitum crassa, pilosissima, involucris patentibus, & racemulis.

3367. *APLUDA.* Cal. Gluma comm. 2-valv. floscul. femin. sessili; masculis peduncular.

Fem. Cal. o. Cor. 2-valv. Styl. 1. Sem. 1. testum.

Mas. Cal. & cor. prioris. Stam. 3.

Pertinet ad Monoeciam.

- ex, neutra.* A. fol. lanceolat. floscul. omnibus muticis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India.

Culmi longissimi, debiles, glabri, geniculis tumidis. Fol. longa, plana, versus vaginam adtruncata in petiolum. Panicula parva, angusta.

2. *aristata*. A. fol. lanceolat. fl. mascul. muticis; sessili aristata terminali. *Syst. veg. ed. 14.*

In India.

Culmi ped. glabri, geniculis inflexis. Fol. graminea, petiolat. scabra. Racemi laterales, & terminales. Fl. terni in eodem pedicello.

3. *Zengites*. A. fol. ovatis: flosculis masculis muticis, sessili aristata terminali. *Syst. veg. ed. 14. Brown, Jam. tab. 4. f. 3.*

In Jamaica.

Culmus ramosissimus. Fol. brevia. Petioli fol. breviores, excepta vagina culmum ambiente.

4. *digitata*. A. spicis digitatis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In India.

Gramen inter altiora.

1368. *ISCHÆMUM*. *Hermaphr.* Cal. gluma 2-fl. Cor. 2-valv. Stam. 3. Styl. 2. Sem. 1.

Mas. Cal. Cor. Stam. maris.

1. *muticum*. I. feminibus muticis. *Syst. veg. ed. 14.*

Tagadi. Hort. mul. 12. tab. 49.

In India 24.

Culmi viridi-albicantes. Fol. oblongo-angusta, pilis longis, albicantibus obsita, venosa. Spica oblonga, cuspidata, 2-part. viridi-albicans, apice viridi-fusca, imbricata peduncul. alternis, culmo adpressis, simplicibus, angularis, bifloris, foliosis.

2. *aristatum*. I. feminibus aristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China 3.

Structura spicæ, & fl. omnino eadem cum prior; sed culmus altior; spica longior; & peduncul. spicæ nudus. Sem. arista intorta, flosculis longiore armata.

1369. *CENCHRUS*. Involucr. laciniatum, echinatum, congestum, 2-fl. Cal. gluma 2-fl. altero masculino; altero hermaphrod.

Hermaphr. Cor. gluma mutica. Stam. 3.

Styl. 1.

Mas. Cor. gluma mutica. Stam. 3.

1. *racemosus*. C. panicula spicata; glumis mucatis fetis ciliariis. *Syst. veg. ed. 14.*

Agrostis &c. Schreb. gram. tab. 4.

Gramen &c. Barr. ic. 713.

In Europa austr. maritimis, & in India orientali.

POLYGAMIA MONOECIA.

Culm. dodrant. radicans, teres, reclinatus, rufo-fescens. Fol. ad singula genicula 2; quod in Graminibus insolitum; glauca, firma, undulata, lappaceis, durisque ciliis ferrata. Spica erecta, simplex, superne congestior, hispida; fructificans ferruginea. Glumæ, absoluta florescentia, rubent.

Obs. Involucro destituitur, adeoque aut Cenchri species, aut Melicæ.

2. *lappaceus*. C. paniculæ ramis simplicissimis; cor. retrorsum hispidis; calycibus 3-valvibus, 2-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In India.

Culm. ramosus, lævis. Fol. cordato-lanceol. margine scabra. Panicula patentissima, ramis horizontalibus, capillaribus. Spicul. alternæ, pedicellatæ, ovat-oblong.

3. *muricatus*. C. spica muricata; squamis variis, mucronatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India orient.

Culm. procumb. spitham. foliosus; ramosus. Fol. graminea, mollia, subtus in primis pilosa, vaginantia. Peduncul. terminalis, filiformis. Spica oblonga, secunda, nuda. Rachis utrimq. membranacea, articulata, flexuosa. Fl. glomerulis congestis ad genicula racheos, confertis, sessilibus, squarrosis. *Facies Tripsac androgyni.*

4. *capitatus*. C. spica ovato-subrotunda, (echinata) simplici. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Col. ceph. 1. tab. 338. f. 1. Barr. rar. tab. 28. f. 1. & tab. 862. f. 2.*

In Gallia Narbon. Italia ☉.

Culm. 2-unc. enodis, vel geniculo unico. Fol. uncial. subpubescent. vagina angulata, membrana albida.

5. *echinatus*. C. spica oblonga, conglomerata. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 23. f. 1.*

Gramen &c. *Pluk. alm. tab. 92. f. 3.*

Elymus caput Medusæ. *Forsk. Æg. monente Vahl. In Jamaica, Curassao ☉.*

Culm. pl. repentes, ped. & ultra, geniculis fuscis. Fol. ped. spitham. glabra, margine aspero, basi villosa. Spica 3-unc. palm. echinata, laxa, purpurascens.

6. *tribuloides*. C. spica glomerata; glumis femin. globosis, muricato-spinosis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Gramen &c. *Steen. Jam. hist. 1. p. 63. f. 1. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 5. f. 4.*

In Virginia maritima ☉.

Culmi tesquiped. infirmi, incurvi. Fol. vaginantia, glauca. Spica sescunc. angusta, albicans.

7. *ciliaris*. C. spica involucellis seraceis, ciliatis, 4-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Giseck. ic. fasc. 1. tab. 23.

Ad cap. b. Spec. margines agrorum.

Culm. spitham. adscendens, genubus inflexis, articulatus, lævis. Fol. graminea, vagina striata. Spica digito brevior, teres, fl. sparsis, alternis.

8. *granularis*. C. racemis (sæpe) geminis: fructibus globosis, rugoso-reticulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India orient.

Culmi ramosi, nudi, læves, hinc plani. Fol. graminea, quandoq. longis, & albis pilis prædita, sicuti vaginæ. Racemi axillar. bracteis præditi, quæ fl. distinguunt in racemis. Fruct. minuti, vix grani *Brassica* magnitudine.

9. *frutescens*. C. capitul. lateralibus: sessilibus: fol. mucronatis: culmo fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Arundo &c. Alp. exot. tab. 104.

In America b.

Pianta longe serpens. Culm. valde ramosus, ramis longis, ramulosis. Fol. brevia, dura, in duos aculeos desinentia. Spicæ echinatae.

1370. *MCILOPS*. *Hermaphr.* Cal. gluma subtrifi. cartilaginea. Cor. gluma terminata triplici arista. Stam. 3. Styl. 1. Sem. 1. oblong. valvula cor. interiori accretum.

Musf. Cal. cor. gluma prioris. Stam. 3.

1. *ovata*. A. spica aristata; calycibus omnibus triaristatis. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 73. Cam. epis. 928. & 2. Scheuchz. gram. tab. 1. f. 2.*

In Europa australi ☉.

Culmi pl. subpedal. Fol. vaginantia, utrimq. villosa. Spica oblonga (non ovata), ex spiculis 3-4. sessilibus constans. Calyc. glumæ alteræ tri-altera quadri-aristata, præter calycem terminalem.

2. *caudata*. A. spica aristata; calycibus omnibus biaristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Creta.

Spica gracilis. Aristæ duæ longissimæ, & asperæ. Glumæ omnes, excepta ultima, bidentatæ.

3. *triuncialis*. A. spica aristata; calycibus inferioribus biaristatis. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 10. f. 1.*

In Monspelli, Massilia &c. aridis ☉.

Spica 3-unc. oblonga, aristis flore multo longioribus. Calyc. valvula altera aristis 3; altera 2. Cor. valvul. altera aristis 3; altera 1.

4. *squarrosa*. A. spica subulata, aristis longiore. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. gram. tab. 27. f. 2.*

In Oriente.

1371. **MANISURIS.** *Hermaphr.* Cal. gluma 2-valv. 1-fl. valvula exteriori lateribus, apiceque emarginata. Cor. calyce min. Stam. 3. Styl. 2-fid.

Mas. ut in priore, sed floribus lateris inferioris ejusdem spicæ magis exstantibus.

5. *myurus*. M. *Syst. veg. ed. 14.*

In India.

Gramen fructificatione singulare, ut vix smile.

Culmi pedal. ascendentes, seu diffusi, articulati, læves, ad basin ramosi, superne ramis alternis, spiciferis. Fol. graminea, angustiora, patentia, lævia, vaginis intermedio brevioribus, crassiuscul. Fol. floralia ad basin pedunculi, absque vaginis, erecta, convoluta (uti glumæ), lanceolata. Spicæ solitar. in culmo 3-4. laterales, & terminalis, digital. peduncularæ, imbricatæ, versus terram articulatæ, bifariam squarrosæ, flosculi teretiuscul. striatis, prominulis.

872. **VALANTIA.** *Hermaphr.* Cal. 0. Cor. 4-part. Stam. 4. Styl. 2-fid. Sem. 1. trident.

Mas. Cal. 0. Cor. 3-4-part. Stam. 3-4. Pist. obsoletum.

1. *muralis*. V. fl. mascul. 3-fid. germi hermaphreditici glabro insidentibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 1. tab. 83. Mich. gen. tab. 7.*

Cruciata &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 21. f. 2

In Gallia, Italiae muris ☉.

Planta glabra. Caul. procumb. Fol. verticillata, quaterna. Cor. e viridi-pallescent. Fruct. asperi.

2. *hispida*. V. fl. mascul. 3-fid. gemini hermaphrodito hispidi insidentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa australi ☉.

Valde simil. priori, sed ma. erecta, hispida. Caul. semiped. hispidi. Fol. verticillata, quaterna, scabra. Fruct. hermaphroditus, rotundatus, undique hispidus, non rostratus.

3. *Cucullaria*. V. fructificationibus singulis bractea obovata, deflexa obtegit. *Syst. veg. ed. 14. Buxb. cent. 1. tab. 19. f. 2.*

In Cappadocia, Arabia montosis ☉.

Caul. erectus, palmar. ramosus. Fol. quaterna, lanceol. ad fl. opposita; infer. angustiora; superiora latiora. Pedunc. ex summis alis ramosi, multiflori.

4. *Aparine*. V. fl. masculis sub 3-fid. pedicellatis; hermaphroditici pedunculo insidentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Aparine &c. Vaill. parif. tab. 4. f. 3.

Inter Germania, Gallia &c. segetes ☉.

Fascis Galii Aparines. Caul. ped-cubital. scandens, retrorsum scaber, parum ramosus. Fol. sena, margine scabra; valde dentata. Pedunc. apice 3-fl.

5. *articulata*. V. fl. masculis 4-fid. pedunc. dichotomis, aphyllis: fol. cordatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Aegypto, Siria &c. ☉.

Caul. pedal. Fol. lata, glabra, subciliata, margine scabro: floralia sessilia, subcordata, basi involuta; absoluto flore arcte reflexa, fructumq. occultantia: maturo fructu caulis proli-fer cum foliis secundum articulos discedit.

6. *Cruciata*. V. fl. masculis 4 fid. peduncul. 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 257.*

In Italia, Germania &c. ☉.

Habitus villosus. Fol. verticillata, quaterna, breviter petiolat. ovat-obtuse-lanceolata. Cor. minima, lutea.

7. *glabra*. V. fl. mascul. 4-fid. peduncul. dichotomis, aphyllis: fol. ovalibus, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Galium &c. *Scop. Fl. carn. 2. tab. 2.*

In Austria, Italia &c.

Adfinit nimium prioris, sed glabra. Caul. erecti, vix semiped. 4-goni, glabri, simplices. Fol. quaterna, trinervia. Racemi laterales, binati. Cor. lutea. Fructus glaber.

3. hypocarpia. V. fl. omnibus 4-fid. interis; peduncul. nudis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica.

Statura V. cruciatæ. Planta tota hispida. Caul. herbacei, laxi, ramis alternis. Fol. quaterna, sessilia, oblong-ovata. Pedunc. axillar. solitar. 1-fl.

pedemontana. V. fl. masculis sub 4-fid. peduncul. aphyllis, paucifloris; fol. quaternis, ovalibus, hirsutis. *Bellard. Off. rev. Bot.*

In Pedemonte.

Caul. subpalm. 4-gonus, lineatus; in pinguibus procumb. Fl. axillar. breviter pedunculati, sim. fil. fl. V. *cruciatæ.* Planta tota hirsuta. *Semil. V. cruciatæ, sed minor.*

1373. PARIETARIA. *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. 0. Stam. 4. Styl. 1. Sem. 1. superum, elongatum.

Fem. Cal. 4-fid. Cor. 0. Stam. 0. Styl. 1. Sem. 1. superum, elongatum.

1. indica. P. fol. lanceolat. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Cratægonum. Rumph. amb. tab. 10. f. 1.*

In India.

Similis P. *officinali*, sed magis nuda. Fol. valde acuminata, trinervia, nuda. Fl. glomeres minores, excepti bracteis subulatis, nec ovatis, Styli longiores. Fruct. sessil. fulcati.

2. officinalis. P. fol. (lato-ellipticis); peduncul. dichotomis; calycibus 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 321. Ludw. ed. tab. 113. Black. tab. 136. Tabern. p. 350.*

Helxine. Cam. epic. 849. Matth.

In Europa temperationis parietibus &c.

Caul. ramosi, hirsuti, subrubri. Fol. alterni, longe petiolat. integerr. aspera, nitida. Verticilli fl. densi, axillar. sessiles. Fl. femin. 4-goni, pyramidati.

POLYGAMIA MONOECIA.

227

3. *judaea*. P. fol. ovatis: caulibus erectis; calycibus 3-fl. cor. masculis elongato-cylindricis. *Syst. veg. ed. 14. Boss. Sic. tab. 24. f. A.*
In Helvetia, Palæstina &c. 24.
 Caul. humilior. Fol. breviora, latiora, subhirsuta. Fl. racemi minores, & ad ramos; vix ulli ad caulem.
4. *lufitanica*. P. fol. ovatis, obtusis: caulibus ælifformibus, striatis, lævibus, procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
P. scula &c. Boss. Sic. tab. 24. f. B.
In Lufitania, Hispania &c.
 Fol. breviora, rotundiora P. *vulgaris*.
5. *urticaefolia*. P. fol. ovatis, oppositis, petiolat. ferratis, venosis, pubescentibus: fl. axillar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In insula de Bourbon.
 Ramosissima. Fol. parva, *Urticæ* simil.
6. *cretica*. P. fol. subovatis; involucris fructiferis 5-fid. compressis; laciniis lateralibus maioribus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Creta.
 Capsulæ sem. 3latæ.
7. *zeylanica*. P. fol. oppositis, oblong-ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Habitat in Zeylona.
8. *microphylla*. P. fol. oppositis, obovatis, integerrim. minoribusq. immixtis ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Herniaria &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 93. f. 1.
In Jamaica.
 Habitus *Herniariæ*. Fol. satore virid. petiolat.
1374. ATRIPLEX. *Hermaphr.* Cal. 5-phyll. Cor. o. Stam. 7. Styl. 2-part. Sem. 1. depressum.
Fem. Cal. 2-phyll. Cor. o. Stam. o. Styl. 2-part. Sem. 1, compressum, orbiculat.
1. *Halimus*. A. caul. fruticoso: fol. deltoidibus, integris. *Syst. veg. ed. 14.*
Halimus 1. Clus. hist. 1. p. 53.
In Hispania, Sibiria, Virginia &c. sepibus maritimis 1.
 Frutex *Rhamne* simil. ramosus. Fol. inordinata, carnosa, alba. Fl. terminales, racemosi, parvi, purpurascens.
2. *portulacoides*. A. caul. fruticoso: fol. (ovalibus). *Syst. veg. ed. 14.*

Portulaca marina. *Dod. pempt.* 771.

In Oceani Europae septentrional. lituribus h.

Caul. suberectus, ped. & ultra, fruticosus, ramosus, cylindricus, albicans. Fol. opposita, petiolat. raro subovat. carnosae, integerr. subtus brevi villosae, & polline tenuissimo. Fl. axillar. & terminal. glomerato-spicati.

3. *glauca*. A. caul. suffruticoso, procumbente: fol. ovariis, sessilibus, integerrimis; inferioribus subdentatis. *Syst. veg. ed.* 14.

A. *maritima* &c. *Dill. elth. tab.* 40. f. 46.

Polygonum &c. *Barr. rar. tab.* 733.

In Gallia australis, Hispaniae maritimis h.

Rami 2-3-cubit. ramulosi. Fol. breviter, plana, crassiuscula, argenteo-glauescentia. Ex alis summis fl. glomerati 2-3. Pistil. longiora, 2-fid.

4. *rosea*. A. caul. herbaceo; fol. (rhombico-cordatis, sinuato-denticulatis) fructibus 4-angularibus, dentatis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Europa australiore ☉.

Caul. erectus, sub 2-ped. ramosissim. ramis diffusis, albus. Fl. axillar. glomerati, sessiles. Fruct. compressus, roseus.

5. *sibirica*. A. caul. herbac. fol. deltoidibus, angulatis: calycibus fructus extus muricatis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Sibiria ☉.

Caul. ramosissimus. Magnitudo A. *hortensis*. Fol. subtus argentea. Fl. albi. Fructus basi tomentosus.

6. *tatarica*. A. caul. herbac. fol. deltoidibus, sinuato-dent. undulatis, alternis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Tataria ☉.

Planta orgyalis.

7. *hortensis*. A. caul. erecto, herbac. fol. (saepe) triangularibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Blask. tab.* 99. *ed.* 2. 552. *Dod. pempt.* 613.

In Tataria ☉.

Caul. 2-cubit. & ultra, crassus, nitens. Fol. crassa, glauco-pallide-virid. paucis venis distincta, variae formae: quaedam ex lata basi in longum mucronem terminata, oris aequalibus: vel deltoidea; alia serrata, aut sinuata, etiam triangularia; omnia tamen utroque extremo contradistincta. *Var. col. obscurae purpur.*

8. *laciniata*. A. caul. herbac. fol. deltoidibus, dentat. subtus argenteis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 32. f. 17.*

A. *marina*. *Dod. pempt. 613.*

Ad Europa, & Virginia septentrion. litora marina ☉.

Planta tota tecta quasi epidermide scedente. Caul. erectus, teres, nudus, virgatus, flavescent. Fol. exceptis ultimis, alterna. Spicæ terminales hermaphrod. anth. rubris. Fl. femin. axillar. gemini. Cal. fructus compressus, 3-dent. dente intermed. maiore.

9. *hastata*. A. caul. herbac. calyc. valvulis femin. magnis, deltoidibus, sinuatis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 32. f. 14.*

In Europa frigidiore ☉.

Caul. erectus, sesquiped. angulosus, ramis patentissimis. Fol. *Chenopodii*, triangularia, sed basi producta, lateribus convergentibus, rari-ter dentatis; viridia. Valvulae calyc. in hac haud raro etiam disco dentatae.

10. *patula*. A. caul. herbac. patulo: fol. subdeltoidico-lanceolat. calycibus sem. disco dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *sylvestris*, *Polygoni* &c. *Lob. ic. 257.*

A. *vulg. angustifol.* *Bauh. hist. 2. p. 973.*

A. *virgata*, *Scop. Delic. Insubr. Fasc. 2. tab. 7.*

Atriplice selvarico 1. *Matth.*

In Europæ cultis, ruderalis ☉.

Caul. sulcatus. Fol. succulenta, glauca; ima sagittata, reliqua lingulata. Racemi patentes, longi.

11. *litoralis*. A. caul. herbac. erecto: fol. omnibus linearibus. (saepe) integerrimis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa septentrion. litoribus maris ☉.

Color glaucus. Caul. sulcatus. Fol. etiam lanceolat. interdum dentata, sine recurvo.

12. *peduncula-* A. caul. herbac. divaricato: fol. lanceolat. obtusis, integris: calycibus femin. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 304.*

A. *maritima* &c. *Pluk. alm. tab. 36. f. 1.*

In Angliæ, Daniae maritimis ☉.

Racemi axillar. & terminales. Cal. *Bursa pastag.* ris fructui similis.

*felicina.**A. Pall. it. 1.**In Dauuria.*

Planta vel simplex, erectior; vel ramosa, diffusa, palm-cubital. obscure viridis. Caul. lineis albis, vel rubicundis. Fol. alterna, petiolar. lanceolat. denticul. remotis; radical. in planta iuniore linear. integerr.

coriacea.

A. caul. fruticos. decumb. fol. ovatis, concavis, farinosus, coriaceis. Forsk. Æg.

In Ægypto.

Caul. ped. ramosi. Fol. conferta, alterna, viridi-albentia. Spicæ terminal. longæ. flavæ, sæpe conjugatæ. Cal. magni, 2-valv.

alba.

A. caul. ramulosi fol. omnibus ovatis; fl. alaribus, glomeratis; valvulis seminiferis subrotund. dentatis, lævibus. Scop. Delic. Insul. Fasc. 2. tab. 8.

Habitat

Planta erecta, pallide glauca. Caul. 2 ped. rigidus, subrotuosus, sulcatus. Fol. dentata; ima brevi petiolar. superiora sessil. erecta.

8375. *TERMINALIA. Mas. Cal. 5. part. Cor. 6. Stam. 10. Hermaphr. Flos maris. Styl. 1. Drupa infera, cymbiformis.*

1. *Catappa. T. fol. obovatis, subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 1. tab. 64.*

Adamaram. Hort. mal. 4. tab. 34.

In India b.

Arb. procera, frondosa. Rami patentes, verticillati, pubescent. Fol. magna, brevibus, teretiuscul. rubicund. ac villosis petiolis innixæ, sesquispitham. longa, spithamam lata, crebra notata, subtus nervosa; ramorum conferta. Racemi interfolias. plurimi, teretes. Racemuli cylindrici. Bract. oblong. cordatæ, caducæ. Fl. exigui, peduncul. rubicundis, extus virid. iatus albicantes. Drupa *Amygdala* simil. sed maior, oblongo-rotunda, compressa, & in arcum tensa, cortice per maturitatem rufo, scabro. Nucleus albicans, sapore *Amygdali*, seu *Avelana*.

2. Benzoin.

T. fol. lanceolaris. Syst. veg. ed. 14.

T. angustifolia. Jacq. hort. 3. tab. 100.

In India b.

Arbuse. in horto 8-ped. erecta, pyramidal. cortice fusco, ramis horizontalibus, apice frondosis, ramulosis. Fol. plurima, in rosam patentem congesta, aliis nonnullis alternantibus, breviter petiolat. longe lanceol. acuta, integerr. virentia, oris, venisque utrimque sanguineis, inæqual. breviter utrimq. hirsuta, supra, & ad oras densius, subtus nitidula. Drupa inverse ovata, cum quadam flavedine fuscescens, ex una parte cymbiform. ex altera testudinem veluti refert. Caro flavescens, adstringens. Nux crassissima, ovata, obtusa, gibbis inæqualibus adpersa, ossa, durissima. Nucleus unicus, compressus, teres, membrana rufa, intus albidus, sapore amygdalino.

Nec cortex, nec lignum huius arbor. odorem Benzoin spargit, ne igni quidem incitum; unde adhuc dubium, si ex hac petatur.

1376. **BRABEJUM.** *Harmaphr.* Cal. Amenti squama. Cor. 4-part. superne revoluta. Stam. 4. Pist. 1. Stigm. 2. Drupa subrotund. Sem. globosum.

Masf. Amenti squamæ 3-fl. Cor. 4-5-part. Stam. 4-5. fauci inserta. Styl. 2-fid. abortiens.

1. *stellulifolium.* B. *Syst. veg. ed. 14.*

Amygdalus &c. *Breyn. cent. 1. tab. 1.*

Arbor &c. *Pluk. alm. tab. 265. f. 3.*

Ad cap. b. Spei b.

Arb. cortice obscure cinereo, punctis ferrugineis obsito. Rami rigidi, striati, purpurascens, subvillosi. Fol. verticillata, septena, palmaria, erecta, breviter petiolat. lanceol. *Nerii Olean-dri* forma, magnitudine, duritie, & crassitie similia, remote dentata, viridia, supra glabra, subrus reticulata, Amenta lateralia erecta, 2-pollic. petiolat. oblong. imbricata, teretia, squamis ovatis, acutis, pubescentibus, multiss. Fruct. *Amygdali* similis, sed minor, pedunculat. in matio crassior, tumidus, & ventricosus, antierius nonnihil reflexus, sericeus, ex rubro col. ad cinnamomum vergente.

1377. **CLUSIA.** *Masf.* Cal. 4-6-phyll. foliol. oppositis, imbricatis. Cor. 4-5-6. petal. Stam. numerosa.

Fem. Cal. & cor. maris. Nectar. ex anth.
coalitis, germen includens. Capf.
3-locul. 3-valv. pulpa farcta.

Pertinet ad Monoeciam.

1. *rosea.* C. fol. aveniis: cor. 6-petalis. *Syst. veg. ed.*
14.

Cenchræmidia &c. *Pluk. alm. tab.* 157. f. 2. *Cas-
seb. car. 2. tab.* 99.

In Carolina h.

Arb. 20-30-ped. parasitica, comosa, succo vi-
ridi, glutinoso, balsamico. Fol. opposita, bre-
viter petiolat. rotundiora, coriacea, integerr.
quondam emarginata, firma; pinguis, striis
parallelis oblique transversis. Pedunc. sæpe
terminales, breves, sæpius 3-fl. Fl. magni,
speciosi. Petal. rosea. Fruct. permanet vari-
dis.

2. *alba.* C. fol. aveniis: cor. 5-petalis. *Syst. veg. ed.* 14.
Jacq. amer. tab. 166. ed. 2. *piñ. tab.* 250.
Plum. ic. 87. f. 1.

In America h.

Arb. 20-ped. parasitica, coma ampla, succo
ut in priore. Fol. ut in priore, sed non a-
deo subrotunda. Pedunc. ut in priore. Petal.
albida. Fructus maturi coccinei, sicuti & pul-
pa. Sem. alba.

3. *flava.* C. fol. aveniis: cor. 4-petalis. *Syst. veg. ed.* 14.
Jacq. amer. tab. 167. ed. 2. *piñ. tab.* 251.

Terebinthus &c. *Sloan. Jum. hist. 2. tab.* 200.
fig. 1.

In Jamaica h.

Arb. priori simil. 20-ped. parasitica, succo al-
bicante. Fol. opposita, petiolat. obovata, suc-
culenta, glabra, obscure viridia. Fl. termi-
nal. Petal. flava.

4. *venosa.* C. fol. venosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Plum. ic.* 87.
f. 2.

In Amer. meridion. h.

Arb. 30-ped. comosa. Fol. 4-pollic. Petal. al-
ba. Fructus flavescentes.

1378. OPHIOXY-Hermaphr. Cal. 5-fid. Cor. 5-fid. infundibu-
LUM. lifor. Stam. 5. Pist. 1.

Maf. Cal. 2-fid. Cor. 5-fid. infundi-
bul. ore Nectar. cylindrico.
Stam. 2.

1. *fero*

1. *serpentinum*. O. *Syst. veg. ed. 14.*

Ligustrum &c. *Burm. Zeyl. tab. 64.*

In Zeylona h.

Planta in altum adsurgens. Caul. 3-gon. articulatus, striatus, erectus, simpl. Fol. verticil. ternata, breviter petiolat. oblongo-elliptica, acum. integerr. glabra. Fl. terminal. plurimi, subumbell. parvi. Fruct. subrotund. semi 2-fid. 2 locul.

1379. ACER. *Hermaphr. Cal. 5-fid. coloratus. Receptac. balsamicum, tuberculofum, rotundum intra calycem: ex eo petala 5. elliptica, calycis longitudine. Stam. 8. etiam 10. Pist. 1. Caps. 2-3. monosperm. ala terminata recurva.*

Maf. Cal. 5-fid. Cor. 5-pet. Stam. 8.

1. *sempervirens*. A. fol. ovatis, integerrim. sempervirentibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phys. tab. 3. f. 1.*

In Oriente h.

Fol. breviter petiol. biuga: fruct. tergemini.

2. *tataricum*. A. fol. cordatis, indivilis, serratis; lobis obfoletis: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. perop. 1749. tab. 13.*

In Tataria h.

Frutex albus, rectus, cortice cinereo, striis quibuldam prominulis exaratus. Rami cruciati, ramulosi. Fol. opposita, & cruciata, 2-3. unc. longa, 1-2. pollic. lata, *Carpini*, quandoque subrotunda vel ovalia, acute, & inaequaliter serrata, iuniora rubra. Racemi compositi, 3-uncial. virides.

3. *Pseudoplatanus*. A. fol. 5-lobis, inaequaliter serratis: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Du-ham. arb. 1. tab. 36. f. 1.*

A. maius. *Dod. pempt. 840.*

In Helvetia, Italia, Austria montanis h.

Arb. excelsa. Fol. subtus modo pallida, modo hirsuta, vel utrimq. viridia; lobis extremis minimis, medio magno, tripollic. sinibus acutis. Racemi subovati, cernui. Fl. parvi, flavo-virentes. *Var. fegmentis rotundioribus.*

4. *rubrum*. A. fol. 5-lobis, subdentat. subtus glaucis: peduncul. simplicissim. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *virginiana*. *Herm. par. tab. 1. Pluk. alm. tab. Tom. VI.*

C

2. f. 4. *Catesb. ear.* 1. tab. 62. *Mill. ic. tab.* 8. f. 2.

In Virginia, Pennsylvania h.

Arb. dioica. *Maris fol. ad basin usque fissis, ut facile pro distincta specie habeatur.* Fol. supra viridi-nitentia. Color. nascentium, & pereuntium ruber. Fl. e viridi-rubent. Fruct. rubri.

3. *saccharinum.* A. fol. 3-partito-palmat. acuminato-dentat. subtus pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pennsylvania h.

Fol. profundius, & versus basin divisa, venosa, subtus glauca, acuminata, apicibus, & denticibus a priore distincta, undulata: raro 3-fidis. Differt ab A. *Platanoides* fol. profundius divisis, & superficie rudiores.

6. *diffidum.* A. fol. multipartito-palmat; laciniis subpinnatifidis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia h.

Arb. rami, & ramuli 2-3-chotomi, patuli, subangulati, glabri. Fol. opposita, petiolat. glabra. Fl. terminal. umbellati, pedunculati. Cor. minutæ, purpur. Var fol. rubris.

Differt ab A. japonico, fol. ad basin diffidis, attenuato-subpetiolulatis.

7. *japonicum.* A. fol. multipart-incisis, villosis: fl. subumbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia h.

Arb. rami, & ramuli teretes, glabri, purpur. Fol. opposita, petiolat. subrotund. venis luteis. Fl. terminal. Cor. purpur. Sem. lanata.

8. *palmatum.* A. fol. palmatis, ferratis, glabris: fl. umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

Momiji. Kamph. aman. Fasc. 3. p. 892.

In Japonia h.

*Arb. mediocris, tota glabra. Rami, & ramuli oppositi, patentes, teretes, purpurasc. Fol. in apice ramulorum duo, petiolat. 5-7-nervia, utrimq. glabra, lobis 5-7. lanceolatis, acutis. Fl. inter fol. pedunculati. Differt ab A. *Platanoides*, fol. non lobatis, sed inciso-palmatis.*

9. *septemlobum.* A. fol. 7-lobis, glabris; lobis acuminatis, æqualiter argute ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japenia h.

Arb. Fol. petiolat. utrimq. glabra, supra virid. subtus pallidiora. Differt ab *A. Pseudo-platanus*, lobis, nervisque 7; fol. acutis, aequaliter serratis.

10. *picum*. A. fol. 7-lobis, glabris, lobis acuminat. integris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Kechuan. *Kamph. aman. Fasc. V. p. 292.*

In Japonia h.

Arb. mediocris. Rami, & ramuli teretes, glabri, cinerei. Fol. in apice aggregata, alternata, petiolat. albo variegata. Differt ab *A. Pseudo-platanus*, & rubro, lobis 7. acuminat. integris.

11. *platanoides*. A. fol. (plerumq.) 5-lobis, acuminat. acuto dentat. glabris: fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 8. f. 1. Pluk. alm. tab. 232. f. 1. Munting. phyt. 11. Trew. tab. 91.*

A. major. *Cam. epit. 63.*

In Europæ borealis montibus h.

Arb. cortice lævi, minus alba, quam *A. Pseudo-platanus*. Fol. teneriora, 6 uncial. latitudinis spithamæ, quandoq. 7-lobata, sinubus acutis, r-r-o lunatis, subrus dilute viridia, nitida. Racemi erecti: fl. ma. Petal. ovata, ex albo-virid.

12. *penfylvanicum*. A. fol. trilobis, acuminat. serrulatis: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. tab. 12. 13. f. 11. Mill. ic. tab. 7. Du-Roi herbk. 1. tab. 2.*

In Penfylvania h.

Arbor. parva. Fol. cum vestigio 4. & 5. lobi, venosa, rugosa, supra læte virid. subrus pallidiora, tomentosa. Fol. lobi integri, maxime acuminati, serraturis inæqualibus. Fl. flavi, penduli. *Var. fol. variegatis.*

13. *campestre*. A. fol. semitrilobatis, obtusis, emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. minus. *Dud. pempt. 840. Tabern. 937.*

In Europa australi h.

Frut. Fl. terminal. racemosi, longe pedunculati, penduli. Cor. subviridis. *Var. fructu rubente.* Fol. 2-poll. longa, dimidium plus lata, basi emarginata, 3-loba: lobus medius dimi-

dium folii efficit; exteriores integri. Petioli rubri.

Fl. omnes perfecti: in alia vero planta masculi, & polygami.

4. *monspessula*. A. fol. trilobis, integerr. glabris, annuis. *Syst. veg. ed. 14.*

A. trifolium. *Du-Roi. arb. 1. tab. 10. f. 8. Pluk. alm. tab. 25. f. 3.*

Montpelis, & in Peseumont. locis saxosis, aprilis h.

Fol. *Anemones hepaticæ*, lobis obtusis, sat ure virid. Petioli virides. Fl. e viridi flavicantes.

15. *creticum*. A. fol. trilobis, subintegerrim. pubescentibus, perennantibus. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 8. DuRoi. arb. 1. tab. 10. f. 9.*

A. *oriental. Potosk. orient. tab. 85.*

In Oriente h.

Planta pubescens. Fol. coriacea, supra intense, subrus lucidius virid. Petioli rubri. Cortex profunde ruber, punctis flavicantibus.

16. *trifidum*. A. fol. indivis. trifidisque, integris. *Syst. veg. ed. 14. Taumb. Jap.*

In Japonia h.

Arb. Ramuli teretes, glabri, purpureo. Fol. in apice ramulorum sparsa, utrimq. glabra, supra viridia, subtus pallida, ovata, acuta.

17. *Negundo*. A. fol. compolitis: fl. racemosi. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *maximum* &c. *Pluk. alm. tab. 123. f. 43.*

In Virginia h.

Fol. partim ternata, partim pinnata. Foliola 1-2. unc. lata, ad 4. usque longa, ovato-oblonga, utrimq. acuta, serrata, venosa, tenuis substantiæ, floride viridia. In planta masc. cor. o.

- Platanus*. A. fol. 5-partit palmar. lobis ovatis, acuminat. subrus tomentosis. *Burm. Ind.*

In India.

Differt ab A. Platanoides, lobis fol. maj. integerrim. & uno, vel altero denticulo; ac tomento e cinereo-splendente.

- javanicus*. A. fol. obovat. glaberrim. subtus tomentosis, apice eros, nervo medio productiore, acuminato. *Garcin. herb.*

In Java h.

1330. *CELTIS*. *Hermaphr.* Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 5. Styl.
2. *Diups* subrotund. 1-sperm.

Maf. Cal. 6 7-part. Cor. o. Stam. 6.

1. *australis*. C. fol. oblongo-lanceolat. in acumen adtenuatis.

C. fol. ovato-lanceolatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lorus arbor. Lob. ic. 186. Cam. epit. 155.

Loto. Matth.

In Europa australi, & Africa citeriore h.

Arb. procera, vassa. Fol. alterna, petiolat. circumferrata, aspera, hirsuta, supra sulcata, subtus nervosa, subalbida. Fl. axillar. solitar. longe pedunculati. Fructus puvus, niger.

2. *occidentalis*. C. fol. oblique ovatis, acuminat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 83. Du-ham. arbr. 1. tab. 53.*

In Virginia, Pennsylvania h.

Simil. priori, sed differt ramorum cortice obscuriore; fol. ovatis, semicordatis &c. Arb. Fol. tenera, ovato-lanceol. parum pubescentia; adulta lato-ovata, acumin. basi, & acumine integerrima, cæterum ferrata, nuda, nervoso-venosa, latere postico duplo minore.

3. *orientalis*. C. fol. oblique cordat. ferratis, subtus villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Salvifolia &c. Pluk. alm. tab. 221. f. 4.

Mallam toddali. hort. mal. 4. tab. 40?

In Indus h.

Arb. mediocris magnitudinis. Fol. alterna, petiolat. subtiliter ferrata, subtrinervis, nervis subtus lævibus, aspera, rigida, scabra, atrovirentia, subtus pallidiora. Fl. axillar. racemosi, subvirid. Baccæ parvæ.

1331. *GOUA*. *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. o. Anth. 5. sub calyptra testæ. Styl. 3-fid. Fruct. inferus, 3-partibil.

NIA.

Maf. Simil. absque germine, stigmatetq.

1. *domingensis*. G. fol. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 179. f. 40. ed. 2. pict. tab. 264. f. 96.*

Lupulus &c. Pluk. alm. tab. 201. f. 4. & tab. 63. f. 3. phyt. tab. 161. f. 3?

In Barbados, Jamaica h.

Planta fumentosa, cirrhosa. Fol. 2-pollic. alterna, petiolat. ovata, vel oblong-ovata, acuminata, vel obtusa cum acumine, inæqualiter

serrato-dent. vel leviter duntaxat crenata, sat
ture virentia. Racemi foliosi. Fl. exigui, sub-
flavescent. Sem. atra, nitida.

tomentosa. G. fol. tomentosis. Jacq. amer. p. 263.

In sylvaticis Domingensibus h.

Planta fruticosa, sarmentosa, cirrhis axillar. 3-
pollic. altissimas arbores scandens. Fol. 4-pol-
licar. alterna, petiolat. oblong-ovata, acuta,
leviter crenata. Racemi axillar. & terminal.
5-pollic. aphylli. Fl. exigui, pedunculat. sub-
flavescent. Sem. atra, nitida.

1381. HERMAS. *Hermaphr.* Umbella terminal utrisque involu-
cris. Umbellul. rad. truncatis;
centrali florifero. Petal. 5. Stam.
5. sterilia. Sem. bina, suborbicu-
lata.

Mosf. Umbellæ laterales involucri utris-
que. Umbellulæ multifi. Petal. 5.
Stam. 5. fertilia.

1. *depauperata.* II. Syst. veg. ed. 14.

Perfoliata &c. Burm. afr. tab. 71. f. 2.

Ad cap. b. Spei 24.

Caul. frutescens, altus, simplex, nudus, pur-
pureo. Squamæ 2-3. parvæ, remotæ, alter-
næ. Fol. radicalia, cordata, coriacea, supra
viridia, glabra; subtus albo-tomentosa. Pe-
dunc. ex alis squamarum, & ex apice caulis.
Umbella terminalis, magna, lata, peduncu-
lata, composita. Petal. lutea. Sem. oblongo-
striata.

2. *gigantea.* H. fol. lanceolat-ovatis, supra lanuginosis, sub-
tus tomentosis, integris. Syst. veg. ed. 14.

Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei montibus altissimis.

Fol. radical. petiolata, obsolete crenata, lon-
gitudine pedalia, latitudine spitham. Scapus
4-pedal. Umbella terminalis, pedunculata. In-
fra quam ramuli floriferi 4. verticillati, uno,
alteroq. ramo inferiore itidem prolifero. Invo-
lucr. polyphyll. lineare, acutum, umbella
brevius. Radii primordial. copiosissimi. Invo-
lucr. lateralia, sæpius 3-phylla. Radii um-
bellular. plurimi. Petal. lanceolata.

Tomentum ex fol. crassum infervit pro fomite ad cap. b. Spei, ut fomes Chincensium & lana Attemisfæ paratus.

3. *capitata.* H. caule tomentoso: fol. subcordat. ferratis: umbellis capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei 24.

Fol. radicalia petiolat. quandoq. ovata, obtusiuscula, venosa, subtus albo-tomentosa, pollicar. Scapus semiped. pubescens. Capitula 3. alterna, pedunculata. Involucr. generale sub 8-phyll. Rad. umbellæ brevissimi. Involucc. foliolo unico, laterali, lanceolat. Fl. pedicellati, albi.

4. *quinquedentata.* H. caule glabro: fol. ovatis, quinquedentat. subtus tomentosis: umbella solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

5. *ciliata.* H. caul. glabro: fol. ovatis, ciliatis, subtus tomentosis: umbellis pl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

1383. MIMOSA. *Hermaphr.* Cal. 5-dent. Cor. 5-fid. Stam. 5. seu plura. Pist. 1. Legum.

Maf. Cal. cor. Stam. maris.

* *Fol. simplicibus.*

1. *simplicifolia.* M. inermis, arborea: fol. ovatis, obtusis, integerrim. nervosis: spicis globosis, peduncularis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In insula Tanna h.

Arbuscula pulchra, cortice glabro, cinereo. Fol. magna, breviter petiolat. quandoq. oblonga, plana, absque costa longitudinali. Stipulæ nullæ. Spicæ axillar. parvæ, breviter pedunculatæ, globosæ. Legum. longitudine folior. compressum, incurvum, torulosum.

Nullus a sola herba hanc Mimosa discret.

** *Fol. simpliciter pinnatis.*

2. *Inga.* M. inermis; fol. pinnatis, 4-5-jugis: petiol. marginato, articulato. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 183. f. 1.

Merian. Surin. tab. 31. Plum. lc. 25.

In Amer. merid. h.

Arb. non alta, cortice fuscescente. Foliol. op-

posita, sessilia, lanceol. integerr. venosa; infima minima, sensim maiora, suprema maxima. Fl. racemosi, maximi, polyadelphi, polyandri, flaminosi, fimbriati, albi. Legum. molle, carnosum, striatum, emarginatum, futura aculeata, obtusa, 2-3-4-digit. flavum. Officula anomala.

3. *Fagifolia*. M. inermis; fol. pinnatis, sub 2-iugis, petiolo marginato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. tab. 164. edit. 2. p. 2. tab. 247.*

Arbor &c. *Pluk. alm. tab. 141. f. 2.*

In Barbados h.

Arb. 30-pedal. densa, comosa. Truncus sub 10-ped. cortice leucophæo. Foliol. 3-4-pollic. & ultra, subovata, oblonga, satere virid. Spica solitaria, 2-pollic. simplex, densiuscula. Fl. sub 40, albid, & fere inodori, anth. flavescens. Legum. coriaceum, albido-flavescens, pulpa dulci, & albicante. *Fl. Moradelpu, polyandri. Fol. interdum 3-iuga.*

4. *nodosa*. M. inermis; fol. pinnatis, 2-iugis; pinnis inferioribus minoribus: petiolo lineari. *Syst. veg. ed. 14.*

Phaseolus &c. Pluk. alm. tab. 211. f. 5.

In Zeylona h.

Arbor. Fol. 2. superiora magna, ovata, acuminata, glabra. Legum. teres, nodosum.

5. *natans*. M. inermis, procumbens; fol. 2-iugis: capitulis subrotundis; fl. decandris; radicalibus sterilibus, maioribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. In Tranquebar 14.*

Planta terræ adpressa, semiped. Foliol. 8-iuga, parum sensitiva. Petal. 5. pallida. Anth. croceæ.

*** *Fol. bigeminis, tergeminis.*

6. *bigemina*. M. inermis; fol. bigeminis, acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Katou-conna. Hort. mal. 6. tab. 12.

In India h.

Arb. excelsa, ramis patulis, cortice spadiceo. Fol. alterna. Foliol. Lauriformia, lanceol.-ovata, integerr. glabra, supra fusco-nitens, subtus dilutiora, venosa. Petiol. 2-fid in sigulo apice 2. foliol. Fl. axillares, & termina-

les, paniculati, sparsi, monopet. monadelphii, polyandri, albi. Legum. spiralia, contorta, lanuginosa, nervis prominulis.

7. *unguiscuti*. M. spinosa; fol. bigeminis, obrutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Plum. ic. 4.*

Acaciæ &c. *Pluk. phyt. tab. 82. f. 4.*

In Jamaica, Caribæis h.

Caudex orpyal. Foliol. obovata, oblique inserta. Pinnæ 2-iugæ, exteriores ma. lingulæ ex 2 foliol. constantes. Spinæ geminæ, acutæ. Fl. sphericis, longe pedunculati, tubelli, vel albi, monopet. monadelphii, polyandri. Legum. ensiformia, membranac. compressa, glabra, atro-nitentia.

8. *tergemina*. M. inermis: fol. tergeminis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 177. f. 81. ed. 2. pict. tab. 262. f. 69. quoad fl.*

Acacia &c. *Plum. ic. 10. f. 1.*

In America meridion. h.

Petiolus 1-fid. pedicello singulo terminato foliol. 2; sed insuper foliol. 2. opposita, ad divaricationem petioli communis. Fl. capitati, magni, purpurascens. monadelphii, polyandri. Legum. longa, compressa.

*** Fol. coniugatis, simulque pinnatis.

9. *latifolia*. M. inermis; fol. coniugatis; pinnis terminalibus oppositis; lateralibus alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Plum. ic. 9.*

In America h.

Fol. magna, ovat-acumin. integerr. glabra: in petiol. comm. 2-part. pinnæ 10. Fl. ex caul. subtetifol. magni, sphericis, purpurascens. polyandri. Stam. numerosa. Pistil. eminens.

10. *purpurea*. M. inermis; fol. coniugatis, pinnatis; pinnis intimis minoribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Plum. ic. 10. f. 2.*

In America meridion. h.

Foliol. subfessil. obverse ovata, integerrima. Fl. capitati, peduncul. purpurascens. Legum. longa, recta, dependentia, glabra.

11. *reticulata*. M. spinis stipularibus: fol. (plerumque) coniugatis; foliol. 6 iugis; petiolis glandula, aculeoq. terminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Pluk. alm. tab. 123. f. 2.*

Ad cap. b. Spec. h.

Arb. ramis rigidis, flexuosis a gemma ad gemmam. Spinæ geminæ sub singula gemma, horizontal. albicantes. Fol. petiolat. quandoq. 1-inga. Foliol. oblongo-linearia, obtusa, paribus distantibus; inermis minoribus. Fruct. palmar. ovalis, latitudine semipalm. compressus, seminibus magnis, spatis.

12. *viva*. M. inermis: fol. coniugatis, pinnatis: foliol. 4-iugis subrotund. caul. herbac. inermi. *Syst. veg. ed. 14. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 182. f. 7. In Jamaica pratis 24.*

Planta vix 3-pollic. Radic. pl. repentes, late sese diffundentes. Fol. longe petiolat. Foliol. parva, lata, glabra, obscure viridia. Fl. axillar. peduncul. globosi, albi. Legum. brev. compres. nigricantia.

43. *circinalis*. M. aculeata; fol. coniugatis, pinnatis; pinnis æqualibus: stipulis spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Acacia* &c. *Plum. ic. 3. Catesb. car. 2. tab. 97. In Amer. calidiore h.*

Arb. 30-ped. & ultra, cortice purpureo. Spinæ axillar. geminæ, acuminatæ. Foliol. 6 ovata, acuminata, integerr. venosa. Fl. racemosi, sphaerici, longe pedunculati. Legum. contorta, glabra, obscure purpurascens. *Convenit cum M. ungue cati spinis stipularibus; & filiquis longis, spiraliter convolutis. Differt vero omnino foliis.*

14. *cineraria*. M. aculeata; fol. coniugatis, pinnatis; pinnis æqualibus; aculeis incurvis. *Syst. veg. ed. 14. M. maderaspatana* &c. *Pluk. alm. tab. 2. f. 1. In India h.*

Arbor cortice cinereo, spinis aduncis. Fol. parva. Fl. globosi.

15. *casta*. M. aculeata; fol. coniugat. pinnatis; partialibus 3-iugis, subæqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Eschinomene* &c. *Comm. hort. 1. tab. 28. In India h.*

Rad. albicans. Caul. 3-pedal. angulatus, spinis aduncis, ramosus. Foliol. unc. fere longa, semunc. lata, opposita, supra læte viridia, subtus hirsuta, venosa.

16. *sensitiva*. M. aculeata; fol. coniugatis, pinnatis; partiali-

bus 2-iugis; intimis minimis. *Syst. veg. ed.* 14.

M. spinosa &c. *Breyn. cent. tab. 16. Trew. chres. tab. 95.*

In Brasilia h.

Frutex 7-8-ped. ramulos, aculeis parvis, recurvis, luteis. Fol. petiolat. supra glabra, & nitida, subtus glauca, tomentosa. Fl. globosi, pedunculati, rubei. Legum. 8-10. radiata, oblong. compressa, articulata, membranacea. Fl. pentandri, apetal.

17. *pubica*. *M. aculeata*; fol. subdigitatis, pinnatis: caul. hispido. *Syst. veg. ed.* 14.

M. humilis &c. *Plum. ic. 202.*

In Brasilia h. ☉.

Planta procumbens, humilis, fruticoso-herbac. ramosa, hirsuta. Caul. aculeis recurvis. Petiol. communis apice sublinet folia pinnata. Foliol. 10-12-iuga, oblonga, acuta, integerr. glabra, ad tectum sese contrahentia. Fl. globosi, rosei. Cal. infundibulif. 3-fid. Cor. o. Legum. conglomerata, plana, articulata, echinata.

***** *Fol. duplicato-pinnat.*

18. *Entada*. *M. inermis*; fol. 2-pinnat. cirrho terminatis; partialibus sub 3-iugis. *Syst. veg. ed. 14. Hort. mal. 9. tab. 67.*

In utraq. India h.

Planta arborea, arbores ipsa scandit. Truncus diamet. 9-pollic. cortice fusco. Spicæ 2-pollic. erectæ, densæ, sub 30. Pedicelli partiales gemini. Fl. omnium copiosissimi, sub 150. in qualibet spica, parvi, virentes, apetal, decandri.

19. *scandens*. *M. inermis*; fol. coniugatis, cirrho terminatis; foliol. 2-iugis. *Syst. veg. ed. 14.*

Faba marina. *Rumph. amb. 5. tab. 4.*

Perim &c. *Hort. mal. 8. tab. 32. 33. 34.*

Phaseolus &c. *Pluk. phys. 211. f. 6.*

In India h.

Caul. filiform. debilis, teres, lævis. Fol. alterna. Pinnæ oval-oblong. obtusæ, acute emarginatæ, cum rudimento lacinulæ. Fl. lutei, o-

dori, decandri. Legum maximum, 5-6-7-ped. palmum larum, rectum, vel toruosum, perfecte carinatum.

20. *plena*. M. inermis; fol. 2-pinnat. spicis pentandris; inferioribus plenis. *Syst. veg. ed. 14.*

In vera Cruce (7).

Caul. herbac. decumbens, virgatus. Foliol. partialia 2-3-4-iuga, singula pinnata. Spicæ axill. pedunculatæ, ovatæ, reflexæ. Fl. lutei.

21. *virgata*. M. inermis, erecta, angulata; fol. 2-pinnat. spicis decandris; inferioribus castratis, mascul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 80. Pluk. alm. tab. 307. f. 3.*

In India h.

Frutex ramis senioribus obsolete angulatis, cinereo-fuscis; junioribus vere angulatis, viridibus. Fol. infima ramorum ex pari unico: subsequa ex 2: summa ex 4. reliqua ex paribus 3 quæ divisio non semper constans est. Foliol. numero varia, oblonga, obtusa. Stipul. fetaceæ. Spica subrotundi, nutans. Fl. decandri, lutei; inferiores spicæ anandri, apertali. Legum. plura quasi ex eodem centro, linearia, longitudine digiti. Sem. fusca, nitida.

22. *punctata*. M. inermis; fol. 2-pinnat. spicis erectis: fl. decandris; inferioribus castratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Æschin. mene &c. Comm. hort. 1. tab. 31.

In America h.

Caul. punctis vagis, callosis. Fol. alterna, 4-iuga, glandula depressa inter primum p r. Foliol. 20-iuga. Peduncul. ex summis ramulis, digital. & ultra, bract. 2 alternis, dimidiato-cordat. Spicæ oblong. Fl. dilute flavescent. decandri. Legum. 3-4. sesunc. longa, plana, fusca.

23. *pernambucana*. M. inermis; fol. 2-pinnatis; spicis cernuis, pentandris; inferioribus castratis: caule decumbente. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 119. 120.*

In America h.

Facies M. plena. Caul. pl. 1-2-ped. virgati. Rami breves, alterni, horizontal. Fol. partialia 2-3-iuga. Foliol. plurima, ovali-oblonga, æqualia, viridia, odore subgravi. Spicæ axill.

peduncul. cylindricæ. Legum. linearia, plana, sæpe quina in apice peduncolor. glabra.

24. *arborea*. M. inermis: fol. 2-pinnatis; pinnis dimidiatis, acutis: caule arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*

M. Julibrizin. *Scop. Delic. Insul. Fasc. 1. Sinon. Pluk. & Sloan. huc non pertinent. Juss. Encyclopædie.*

In Amer. septentr. h.

Arb. 30-ped. Fol. magna, sesquipalmaria, 6-8. pollic. lata. Pinn. 8-12. Pinnul. 14-iugæ. Spica ovata. Fl. fere stamin. purpur. Stam. longissima, carnea. Legum. 4 pollic. longum, 7. lin. latum, utrimq. acuminat. Sem. lphærica, atro-nitentia. *Var. glabra, foliol. 12-14. pinnis 27.*

25. *Lebeck*. M. inermis: fol. 2-pinnat. 4-iugis; pinnis ovali-oblongis: fl. fasciculat. monadelphis: caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*

M. *arborea*. *Gmel. it. 3. tab. 40?*

Acacia &c. *Pluk. mnt. 2. p. 331. f. 1.*

In Egypto superiore h.

Arb. ramis copiosis, *Cerasi* magnitudine. Fol. eglandulata, petiol. brevissim. lucide virid. subtus pallidiora. Pinnæ 12-20. pollic. Fl. ampli, fasciculati. Cal. & cor. albido subflavescent. Legum. spitham. oblongi, parum lata, compressa.

26. *odoratissima*. M. inermis; fol. 2-pinnat. 3-4-iugis, multi-iugis; foliol. oblong. obtusis: paniculis virgatis: spiculis globosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. phyt. tab. 351. f. 4.*

In Zeylona h.

Arb. alta. Fol. magna. Foliola supra glaberrima, subtus cœna. Panicul. axill. 3. magnæ, diffusæ. Fl. albi, fragr. nullo. Legum. plana, coriacea, simit. M. *lasiique*, sed angustiora, & minus undulata.

27. *speciosa*. M. inermis; fol. 2-pinnatis, sub 4-iugis; pinnis sub 9-iugis, oblongis, glabris; glandula supra costæ basin. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. vol. 3.*

Habitat . . .

28. *vaga*. M. inermis; fol. 2-pinnat. pinnis exterioribus ma. incurvatis, pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor &c. *Bryon. cent. 1. tab. 15?*

Guabi-pocaca-biba. *Marogr. bras. 111. Pis. bras. 170.*

In India h.

Arb. elegans, valde ramosa. Foliol. læviuscula. Petioli pubescent. Fol. 4 iuga; partialia 4-iuga. Fl. umbellati, polyand. luteo-rufi, odori, calyc. tomentoso. Legum. 4 5. digitos longa, parvæ compressa.

29. *latifolia*. M. inermis; fol. 2-pinnat. partialibus 5-iugis; ramis flexuosis; gemmis globosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Plum. Burm. amer. tab. 6.*

In America caldiore.

Fol. abrupte pinnat. Foliol. oblonga, æqualia, glaberrima. Bract. latissimæ, dimidiato-concavæ. Pedunc. terni. Fl. capitati, albi. Gemmæ 2-v. ly. foliol. 2. subrotundis, concavis, seu hemisphæricis. Legum. plana, lata, acuminata, glabra.

30. *polystachya*. M. inermis; fol. 2-pinnat. partialibus, pinnisque 6-iugis, oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 183. f. 53. ed. 2. pld. tab. 262. f. 67. quoad fructificat.*

Acacia &c. *Plum. ic. 12.*

In sylvis Martinicæ h.

Planta scandens. Truncus diamet. 9-pollic. Cirrhi validissimi. Spicæ sub 30. simul, 2-pollic. erectæ, dentæ. Fl. parvi, virent. Legum. lata. propriis 13-15-iugis, obtusis; caul. muricato. *Syst. veg. ed. 14.*

31. *muricata*. M. inermis; fol. 2-pinnatis; partialibus 5-iugis; propriis 13-15-iugis, obtusis; caul. muricato. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Plum. ic. 11.*

In America h.

Caul. tuberculatus, scaber. Foliol. subeffil. ovat-oblonga, emarginata, venosa. Pedunc. longi, polylochi. Fl. longe spicati, pusilli, albi. Legum. multa, erecta, longa, acuminata, sinuosa. Sem. subrotunda, umbilicata, glabra.

32. *peregrina*. M. inermis; fol. 2-pinnat. partialibus 16-iugis; propriis sub 40-iugis, glandula bateos penulari. *Syst. veg. ed. 14.*

In America h.

Foliol. opposita. Legum. longitudine digiti, ovat-oblong. obtusa, plana.

33. *glauca*. M. inermis; fol. 2-pinnat. partialibus 6-iugis; pinnis plurimis; glandula inter infima. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Mill. dict. tab. 4. Trew. chres. tab. 36. Catesb. car. 2. tab. 42.*

In America h.

Arbuse. 12-ped. Foliol. rotundiora, subtus glauca. Spicæ magnæ, globosæ, pedunculatæ. Fl. decandri, albid. Legum. longa, lata, compressa.

34. *cinerea*. M. spinis solitar. fol. 2-pinnat. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Burm. Zeyl. tab. 2. bona. Pluk. alm. tab. 121. f. 5.*

In India h.

Arb. ramosa, lævis, cortice cinereo. Spinæ vel terminal. vel axillar. longæ, rectæ, albican-tes. Fol. 10-iuga. Foliol. 22-iuga, lanceolat. tenuissima, pinnae avium æmulantia. Spicæ axillar. solitar. pedunculatæ, oblong. ovatæ, aut cylindricæ. Fl. inferne rubelli, superne luteo-albi. Legum. contortum, articulatum.

35. *cornigera*. M. spinis stipularibus, geminis, connatis, divaricatis, compressis, apice subulatis; fol. 2-pinnat. foliol. 12-20 iugis; spicis axillaribus, elongatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. *Seb. thes. 1. tab. 70. f. 13. Pluk. alm. tab. 122. f. 1.*

Acaciæ &c. *Comm. hort. 1. tab. 107.*

In Mexico, Cuba h.

Arb. 12-ped. ramuscul. pyramidatis. Spinæ usque 3-pollic. cornua bovina referentes, sub-axillar. cavæ, fuscae, nitidæ. Foliol. exigua. Spica sesquiped. cylindrica, tenuis, densa. Fl. flavi, parvi, inodori. Legum. coriaceum, fuscum, pulpa butyracea plenum. Sem. tere-
tis.

36. *Catechu*. M. spinis stipularibus; fol. 2-pinnat. multiugis; glandulis partialium singulis; spicis axillar. geminis-ternis, pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Kerr. medical. Obs. 3. tab. 4. bona.*

In India orient. h.

Frutex lævis, spinis geminatis, recurvis, distinctis. Fol. alterna. Foliol. ad 30, linearia, lævia. Pedunc. axillar. 2-4. Spicæ cylindricæ, luteæ.

Ex hac arb. terra Catechu Offic. parantur, quæ quondam falso putata ab Arca Catechu.

37. *horrida*. M. spinis stipularibus, longitudine folior. fol. 2-pinnat., partialibus 6-iugis; ramis lævibus. *Syst. veg. ed. 24.*

Acacia &c. *Pluk. alm. tab. 121. f. 4.*

In Indis h.

Cortex cinereus. Foliol. parva. Americanæ capitula globosa, pedunculata, ut in *M. tortuosa*, sed in medio bractea bivalvi, minora.

38. *eburnea*. M. spinis stipularibus, connatis, teretibus, subulatis, divaricatis: fol. 2-pinnat: foliol. 6-iugis: spicis pl. axillar. globosis, pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In India h.

Arbustula horridis suis spinis singulari. Spinæ longiores, quæ tantum in apice rami ad fl. ubi rami carent fol. sunt 2-pollic. basi connatæ, rectissimæ, teretes, compressæ, ut in *M. cornigera*, nitidæ, quasi offeæ, albidæ, apice rubro; sed in inferiore parte caulis brevissimæ sunt. Fol. 4-igæ. Foliol. minora, cinerea. Pedunc. in axill. spinarum 4-8. Fl. globuli minores, lutei.

39. *latronum*. M. spinis stipularibus, connatis, divaricatis, teretibus, subulatis: fol. 2-pinnat; foliol. 4-iugis: spicis axillar. subgeminat. elongatis, pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Intra montem Tripuliti frequens h.

Frutex horridiss. ramosissim. depressus. Rami invicem implexi, flexuosi, punctis albicantibus. Fol. minima. Spinæ axillar. plerumq. binæ, raro solitarie, nitidæ, lacteæ. Fl. albi. Legum. semilucorum, compressum.

40. *tortuosa*. M. spinis stipularibus: fol. 2-pinnat. 4-iugis, glandula inter infima, pinnis 16-iugis: spicis globosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica h.

Simil. M. horrida, sed spinæ paulo breviores. Rami pubescent. Pinnæ venosæ. Peduncul. sub fl. sub-

sub ætatus. Spinæ geminæ, rectæ. Fol. tenuissima. Legum. crassa.

41. *farnesiana*. M. spinis stipularibus, distinctis; fol. 2 pinnat. partialibus 8-iugis: spicis globosis, sessilibus. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 345.

In Domingo h.

Arbuse. ramis longis. Fol. alterna. Spinæ albidæ. Fl. polyandri, crocei, odori. Legum. numero varia, cylindrica, contorta, nigricantia.

42. *nilotica*. M. spinis stipularibus, latentibus; fol. 2-pinnat. partialibus extimis glandula interstinctis: spicis globosis, pedunculat. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 377.

Acacia vera. Bauh. hist. 1. p. 429. Vcel. Ægypt. tab. 8. bona.

Acacia Ægyptiaca. Hern. mex. tab. 866. Pluk. al. tab. 123. f. 1.

In Ægypto, Arabia h.

Habitus prioris, & Senegalis: differt a priore ramis absque punctis caliosis, ut ab hac, cortice minime albo, sed purpurascens, nec sp. nas habet terans ut Senegal, sed binas, easque longiores, quam Farnesiana. Arb. grandis, ramosissima, gummosa. Rami læves, purpurascens. Fol. partialia sub 5-iuga; inter 2. paria partialium exteriorum glandula petiolo comm. inserta est. Fl. capitati, pedunculati, lutei, polyandri. Legum. moniliform. compressa, fusca, articulis rhombeo-subrotundis.

Gummi Arabicum Offic.

43. *pigra*. M. aculeata, lævis: fol. 2-pinnat. oppositae aculeatis: spina erecta inter singula partialia. Syst. veg. ed. 14.

In America h.

Caul. adspersi aculeis geminis, recurvis. Fol. sub 6-iuga: partialia multiuga. Capitula globosa. Legum. membranac. compressa, articulata, scabra.

44. *asperata*. M. aculeata, hirta: fol. 2-pinnat. oppositae aculeatis: spina erecta inter singula partialia. Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. f. 3? at excludit fol. foetam intermedium.

Æschinomene &c. Breyn. cent. tab. 19. Comm. hort. 1. tab. 30.

Tom. VI.

D

In Jamaica, Vera Cruce h.

Planta tota hirta, exceptis pinnis. Caul. fruticosus. Fol. sensitiva, sæpe 14-iuga; foliol. multiugis. Aculei 2. robusti, recurvati, solitarii, oppositi, breviores, inter omnia paria partialium. Fl. capitati. Legum. 4. unc. longa, semuncem lata, compressa, fusca, adspersa pilis rigidulis, helvulis.

45. *senegal.* M. spinis ternis; intermedia reflexa: fol. 2-pinnatis; fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia. Alp. æg. tab. 15. Pluk. alm. 3. p. 251. f. 1.

Arbor &c. Catesb. ear. 2. tab. 44.

In Arabia h.

Primo intuitu distinguitur hæc arb. cortice albo. Spinae ad fol. exortum 3. nec 2. ut in M. nitida.

Arb. 8-10-ped. ramosa. Fol. opposita. Pinnæ 3-iugæ. Foliol. 5-6 iuga, brevissima, linearia, obtusa. Fl. globosi, penduli, sericei, polyandri, odori. Legum. pollic. basi pedicellata, elliptica, compressa, sub 2-sperin. c. viridiviolac.

46. *casta.* M. aculeata; fol. 2-pinnatis; pinnis ovali-oblongis, oblique acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. Pluk. mant. 1. tab. 330. f. 3.

In India h.

Aculei recurvi. Fol. 5-7-iuga, lata, obtusa, subrus casta. Fl. globosi, lutei.

47. *pennata.* M. aculeata; fol. 2-pinnat. numerosissim: linearis-acerosis; panicula aculeata; capitul. globosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. Burm. Zeyl. tab. 1.

In Zeylona h.

Sensitiva. Frutex angulosus, ramosus. Aculei parvi, fusci, sparsi per caulem, & paniculam. Foliol. fere capillaria, Fl. lutei.

48. *insita.* M. aculeata; fol. 2-pinnat; pinnis incurvis, obtusis; caul. angulato; stipulis aculeo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. Pluk. alm. tab. 122. f. 2. Hort. mal. 8. tab. 4.

In India h.

Aculei recurvi, sparsi secundum angulos caulis: horum rudimenta inter foliol. partialia. Fol.

4-5-6-iugis; partialia 12-iuga. Fl. pedunculati, candidi, odori. Legum. longa, utrimq. acumin. plana.

49. *semispinosa*. M. aculeata; fol. 2-pinnat. articulis caulinis superne aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In America h.

Parum sensitiva.

50. *quadriavalvis*. M. aculeata; fol. 2-pinnatis: caul. 4-angulo, aculeis recurvis; leguminibus 4-valvibus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 181. f. 1. Houst. MSS. fig. bona.*

In Vera Cruce 24.

Herbacea, & procumbens. Aculei sparsi in caul. petiolis, pedunculis. Fol. partialia utrimq. terna, foliol. plurimis. Pedunc. axillares. Fl. globosi, purpur. Legum. linearia, subulata, angulata, aculeata.

51. *tenuifolia*. M. aculata; fol. 2-pinnat. partialibus 20-iugis; pinnis multiugis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Zeylona h.

Planta repens. Fol. minimæ.

52. *ceratonia*. M. aculeata; fol. 2-pinnat. 5-iugis; partialibus 3-iugis: pinnis trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. Plum. ic. 8.

In Amer. meridion. h.

Aculei recurvi in caul. & petiolis. Foliol. lata, obverse-ovata. Pedunc. laterales, conferti, capitati. Fl. globosi, albi. Legum. obtusa, sutura aculeata. Sem. oblonga.

53. *tamarindi-folia*. M. aculeata; fol. 2-pinnat. sub 5-iugis; partialibus 10-12-iugis; petiol. communibus inermibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Acacia &c. Plum. ic. 7.

In America.

Caul. aculeatus. Rami aculeis paucis, recurvis. Fol. abrupte 2-pinn. Glandula inter infima partialia. Foliol. oblonga, sed infima carent suo opposito interiore. Petiol. comm. aculeis 2. remotis, tubrus inter singula partialia. Stipul. latæ, acuminatæ, purpur. Fl. globosi, albi. Legum. latissima, acumin. plana.

- Guianensis*. M. arborescens, inermis: fl. spicatis, albis: legum. compresso. *Aubl. Guian. tab. 357.*

In Caienna, & Guiana h.

- Arb. 30-40-ped. superne ramosa, ramis rectis, & declinatis, undiq. sparsis. Fol. alterna, duplicato-pinnata; 9-10-iuga. Foliol. costæ intermediæ petiolo adnexa. Foliol. opposita, sessilia, ovata, acuta, integerrima. Stipul. 2. lanceol. deciduæ. Fl. axillar. dense spicati. Cal. tubulosus, 5-part. Cor. exigua, 5-fid. alba. Legum. oblong. membranac.
- Bourgoni.* M. fol. 2-iugis; petiol. 2-glandulosus, non marginatis; legum. exsucco. *Aubl. Guian. tab. 388.*
In Guiana h.
 Arb. 30-40-ped. superne ramosa, ramis erectis, undiq. sparsis. Foliol. opposita, sessilia, costæ alatæ adnata, breviter petiol. oblong. acuta, obtusa, integerr. glabra. Stipul. 2. oppositæ, deciduæ. Fl. axill. terminal. spicati. Cor. alba. Legum. longum, compressum, viride.
- finemariensis.* M. siliqua longissima. *Few. Perou. tab. 19. f. 2.*
In Guiana h.
 Arb. alta, ramis corpus subrotundum efformantibus. Fol. alterna, costæ alata. Foliol. 4-iuga, acuta; superiora maiora. Fl. axillar. spicati, pedunculati. Stam. alba, apicibus luteis. Legum. 1-2-pedal. lata, ut in *Ceratonia siliqua*.
- Pasey.* M. siliqua 4-gona. *Frazier. it. tab. 156.*
In Guiana h.
 Arb. foliol. 4-iuga, superiora ma. Fl. ut in *M. Inga*. Legum. 4-pollic. vel pedale, 4-gon. intus oleum crystallizatum, album. Sem. ut in *Faba*.
- Ouyratama.* M. arborea, cortice cinereo: spica globosa: siliqua interne rubente: seminibus sphaericis, atro-nitentibus. *Sonn. Jam. 2. tab. 182. f. 12. Pluk. phyt. tab. 251. f. 2.*
In Guiana h.
 Arbor grandis, non spinosa. Foliol. lata, basi in metæ formam fustigiata. Fl. albi. Legum. contorta, ventricosa, elegantissima.
- corillis.* M. leguminibus contorto glomeratis. *Forsk. Æg. In Arabia.*
 Fol. 2-pinnat. Pinnæ 3-iugæ, extimis squamula

interstinctis. Foliol. 7-9-iuga, brevissima, oblong. Fl. capitati, albi. Legum. cochleariformia.

flava. M. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Primæ pinnæ 3-5-iugæ: foliol. 7-10. semiunguem longa, linearia, obtusa. Cor. pallide flava.

Ajak. M. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Frutex. Spinæ stipulares, 2-3. patentes, recurvæ. Fol. ex ala bina, 2-pinn. Pinnæ 3-iugæ. Squama nulla. Foliol. 6-iuga, oval-oblonga, medio longiore.

Orfuta. M. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Fol. gemina, 2-pinnat. Pinnæ 4-5-iugæ, ultimæ squama distinctæ. Foliol. 6-9-iuga, ovali-linearia, basi obliqua, semiunguem longa. Spinæ 2. sub singula axilla, stipularum loco, patentissimæ, longitudine foliol. Legum. compressum, inarticulat. basi adnatum.

stellata. M. fol. geminis, pinnatis, fol. 9-iugis: spinis stellatis, ternis, 2. apice recurvis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

glomerata. M. fol. 2-pinnat: leguminibus contorto-glomeratis, nigris. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

sejal. M. fol. 2-pinnat. solitar. pinnis 3-iugis, inferioribus squama unica; extimis squama duplici distinctis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Caul. fruticosus. Foliol. 14-iuga, ungue breviora, ovali-linear. media longiora. Spinæ nullæ.

siangensis. M. spinis stipularibus, distinctis: fol. 2-pinnat. partialibus 5-iugis, propriis 16-iugis, glandula supra fol. basin. Jacq. *amer. ed. 2. p. 18. tab. 26. f. 70.*

In Carthago b.

Arb. erecta, 20-ped. ramis horizontalibus. Spinæ subaxillar. 5-linear. subulatæ, acuminatæ, fortes. Fol. axillar: pinnæ partiales pollicares: foliol. propria vix 3-linear. oblong. obtusa.

- Spicæ axillar. solitar. globosæ, pedunculat. sursum versæ. Fl. albi.
- retusa.* M. aculeata; fol. 2-pinnat. apice, & supra basin glandula retusa. Jacq. amer. p. 267.
In *Carehagena* h.
- Arb. erecta. Aculei recurvi in ramis, & pinnis fol. Fol. partialia 6-iuga; propria sub 16-iuga; foliol. 4-linear. oblong. acutis. Legum. oblong. obtusa cum acumine, plana, sicca, membranacea, 1-locular. Sem. ovat. compresso-plana.
- biglobosa.* M. spicis biglobosis, densissimis. Jacq. amer. tab. 179. f. 87. ed. 2. *pid. tab.* 262. f. 68.
In *Martinica*.
Arb. fl. rubris.

DIOECIA.

- 1384. GLEDITIA.** *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. 4-petal. Stam. 6. Pist. 1. Legum.
- Mus.* Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet. Stam. 6.
Fem. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. Pist. 1. Legum.
- 1. triacanthos.** G. caul. spinis triplicibus, axillar. *Syst. veg. ed.* 14. *Duham. arb.* 1. tab. 105.
Acacia &c. *Pluk. mant. tab.* 352. f. 1.
b. Acacia &c. *Catesb. car.* 1. tab. 43.
In *Virginia* h.
Arbor. Fol. primum pinnata, dein 2-pinnat. Spinæ 3-uncial. ramoæ, durissimæ, tusconitidæ; caulinae sparsæ. Legum. lata, fusca. In macula arbore Cor. o. Nect. o. Stam. 6.
b. Arbor procera, & vassa. Foliol. alterna, parva, acuminata.
- 2. inermis.** G. caul. inermi. *Syst. veg. ed.* 14. *Duham. arb.* 1. p. 266.
In *Java* h.
Fol. 2-pinnat., partialia 4. infimis minoribus. Pinnæ acutæ, nitidæ, glabræ: Petiol. communis terminatus spina miti.
- 1385. FRAXINUS.** *Hermaphr.* Cal. o-4-part. Cor. o-4-petal.

Stam. 2. Pist. 1. Fruct. linguiformis, membranac.

Fem. Fruct. ut in hermaphrod.

1. *excelsior*. F. foliol. serratis (ovatis, impari maiore): fl. apetalis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 328. Dod. pempt. 771. Math.*

In Europæ sepibus h.

Arbor procera. Fl. ante fol. quæ impari pinna foliol. ovato-lanceol. dilute virid. Petioli marginati. Gemmæ laterales racemosæ; terminalis fol. promit. Petal. albida. Sem. pendula.

2. *Ornus*. F. foliol. serratis (lanceolatis): fl. corollatis. *Syst. veg. ed. 14. Ort. Angl. tab. 9.*

F. *tenuiore* &c. *Bauh. hist. 1. p. 177.*

In Europæ australi h.

Foliola angustiora, acutiora, & tenuiora priore. Petioli huius æquales. Foliol. æqualia. Petal. 4. alba.

3. *americana*. F. foliol. integerrim. petiolis teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 1. tab. 80.*

In Carolina, Virginia h.

Arb. mediocris magnitudinis. Foliol. utrimq. acuminata. Fruct. ut in F. *exce flore*, sed longe minor. angusti.

1386. DIOS- *Hermaphr.* Cal. 4-fid. Cor. urceolata, 4-fid.
PYROS. Stam. 8. Styl. 4-fid. Bacca 8-
sperm.

Maf. Cal. cor. Stam. prioris.

1. *Lotus*. D. folior. paginis discoloribus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 116.*

Pseudo-Lotus. Cam. epic. 156. 157. bona.

In Mauritania, Italia &c. h.

Arb. procera. Fol. alterna, breviter petiolat. ovalia, supra atro-virente splendens, subius nitida. Fl. axillar. conferti, minimi. Cal. radiatus. Bacca nigra.

2. *virginiana*. D. folior. paginis concoloribus. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 126.*

Guianana &c. Catesb. car. 1. tab. 76. Pluk. alm. tab. 244. f. 5.

In Amer. septentr. h.

Fl. virides. Fruct. maiores, luteo--purpur. tandem nigri.

3. *Kaki*. D. peduncul. 3-partit. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap. Kauph. am. tab. 86.*

In Japonia h.

Var. 1. Arb. mediocris, ramosissima. Rami, & ramuli patentes, alterni, apice tomentosi, punctati. Fol. 1-3-pollic. pollicem, & ultra lata, alterna, petiolat. patentia, ovata, acumin. integerr. reticulato-nervosa, subtus pallidiora, vix manifeste villosa, supra glabra. Petioli unguicular. subtomentosi. Fl. axill. pedunculati. Cor. laciniis reflexis. Bacca subglobosa, obsolete 4-gona, b-si truncata, magnitudine *Pomi* mediocris, matura flava, sapore fere *Pruni* albi, dulcis.

Var. 2. Fol. digitalia, alterna, petiolat. oblongovata, acuta, patentia, integerr. nervosa, glabra, supra virid. subtus pallida. Petiol. unguicul. canaliculati. Fl. in ramulis adproximati, alterni, subsessil. Bacca magnitudine ovi columbini, ovata, obtusiss. glabra, flava, carne molli, aurantiaca, adstringente.

4. *hirfuta*. D. ramis, foliisq. subtus villosis: fol. ellipticis, obtusis: fl. axillar. congestis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Zeylona.

Differt a priore, fl. pl. sessilibus: fol. utrimq. obtusis, nec acuminatis.

5. *Ebenum*. D. glaberrima; fol. oblongis, utrimq. glaberrimis, coriaceis, venoso-reticulatis: fl. axillar. solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In vastis sylvis Zeylonæ h.

Valde simil. D. Loto, nisi illius fol. magis ovata, & subtus magis cana. Arb. maxima, durissima. Ramuli cinerei, foliiferi, nigrescentes. Fol. alterna, breviter petiolat. supra nitida, sæpe maculata, subtus venalis rugosa, quasi parum cana. Bacca sessil. ovata, compressiuscul. nigra.

Hoc est verum Lignum Ebenum, grave, compressum, durum, versus corticem albidum, sed versus centrum nigerrimum.

- inconsans*. D. fl. monoicis. *Jacq. amer. tab. 174. f. 67. ed. 2. pict. tab. 263. f. 87.*

In Carthagena fruticosus h.

Arbust. 10-ped. erecta, ramosa. Fol. 5-pollic. alterna, petiolat. disticha, oblong. obtusa,

vel acuta, superne lateſcentia, ſubcoriac. integerrima, nitida. Pedunc. axillar. breves, ſolitar. retrorſum flexi, 3-multifl. Fl. magnitudine varii. Cor. 3-fin. flaveſcens. Bacca forſide lutea.

1387. NYSSA. *Hermaphr.* Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 5. Piſt. 1. Drupa infera.

Maſ. Cal. & cor. prioris. Stam. 10.

1. *aquatica*. N. fol. integerrimis. *Syſt. veg. ed. 14.*

Arbor &c. *Catesb. car. 1. tab. 41.*

Cynoxylon &c. *Pluk. alm. tab. 172. f. 6.*

In Amer. ſeptentr. aquaſis h.

Arb. *aquatica*, alba, & viſta. Fol. petiolat. elliptica. Fl. axillar. longe peduncul. Fruct. oval. nigri. *Var. fol. acute dentatis.*

1388. ANTHOSPERMUM. *Hermaphr.* Cal. 4-part. Cor. o. Stam. 4. Piſt. 2. Germin. inferum.

Maſ. & fem. in eadem, vel diſtincta planta.

1. *aethiopicum*. A. fol. lævibus. *Syſt. veg. ed. 14. Hort. Cluſſ. tab. 27.*

Frutex &c. *Walth. hort. tab. 9. Pluk. alm. tab. 183. f. 1.*

In Æthiopia h.

Planta alia maſ; alia hermaphr. *Frutex* 2-ped. ramis erectis, vel recurvis. Fol. parva, verticillato-ternata, baſi leviffime connexa, intra quæ 6. oriuntur: omnia linearia, acuminata, patentiuſ. apice recurvo, odore aromatico. Fl. axillar. ſeſſil. pallidi.

2. *ciliare*. A. fol. carina, margineq. ciliatis. *Syſt. veg. ed. 14. Pluk. mant. tab. 244. f. 5.*

Ad cap. b. Spei h.

Planta procumbens. Rami pl. ſpitham. vix ramofi. Fol. anguſta, lanceol. Fl. axillar. ſeſſiles. Stam. 4.

3. *herbacum*. A. fol. ſenis, lævibus: caul. herbac. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Facies Galii. Caul. diſſuſi, teretiſculi, rubri; ramis oppoſitis. Fol. ſeſſil. lanceol. uninervia. Fl. axillar.

1389. STILBE. *Hermaphr.* Cal. exter. 3-phyll. inter. 5-dent. cartilagin. Cor. infundibuliſ. 5-fid.

Stam. 4. Sem. 1. calyce interiore calyptratum.

Maf. Similis. Cal. interior o. Fruct. o. (*In atfinda planta sexus*).

1. *pinastra*. *S.* spicis hirsutis: fol. senis, linearibus. *Syst. veg. ed.* 14.

S. vestita. *Berg. Fl. cap. tab. 4. f. 6.*

Valeriana &c. *Comm. hort. 2. tab. 110.*

Ad cap. b. Spei rivulos &c.

Frutex ramis alternis, strictis, basibus fol. elevatis scaber. Fol. confertim verticillata, unguicular. breviter petiolat. disticha, incurva, glabra. Fl. capitula terminalia, magnitudine vix *Cerasi*, solitar. sessil. ovalia. Bract. longitudine fl. Cor. utrimq. lanata.

2. *Ericoides*. *S.* spicis lævibus: fol. quaternis, lanceolatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Ad cap. b. Spei &c.

Simil. priori, sed omnibus suis partibus minor. Statuta Ericæ. Fol. subtus convexiora, quasi bicarinata, carinis remotis, obtulis. Capitula terminale, ovatum, sessile. Cor. lævis. Stam. cor. longiora.

3. *cernua*. *S.* spicis cernuis: fol. quaternis. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. S. pinastræ, sed ramuli cum capitulo nutantes.

1390. *ARCTOPUS*. *Maf.* Umbella composita. Involucra 3-phylla. Cor. 3-petal. Stam. 3. Pist. 2. abortientia.

Androg. Umbella simpl. Involuc. 4-part. spinosum, maximum, continens floscul. maximos, in disco plurimos: Feminæ 4. in radio.

Maf. Petal. 3. Stam. 3.

Fem. Petal. 3. Styl. 2. Sem. 1. 2-locul. inferum.

1. *echinatus*. *A.* *Syst. veg. ed.* 14.

Valerianoides &c. *Pluk. mant. tab. 271. f. 3.*

♂. *A. folius* &c. *Burm. asie. tab. 1.*

In Æthiopia &c.

Rad. longa. Fol. ovata, incisa, margine setoso, quæ setæ ad sinus fol. spinæ evadunt. Petioli longi, lati. Caul. brevissim. involucro

patulo, spinosissimo, 2. fl. compositos sustentans.

♂. Rad. longa, nigricans. Caul. simpl. crassus, scaber. Fol. quasi in orbem disposita, vaginantia, lata, plana, ciliata, crassa, laciniata, venosa, apice spinis flavis, stelliformibus, acutis. Fl. ex centro caulis supremi, longe pedunculati, umbellati.

1391. PISONIA. *Hermaphr.* Cal. vix ullus. Cor campanul. 5-fid. Stam. 5-6. Pist. 1. Caps. 3-valv. 1-locul. 1-sperm.

Mas, & fem. nunc in eadem, nunc in diversa planta.

1. *aculeata*. P. spinis axillaribus, patentissimis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 227. f. 1.*

Rhamnus &c. Pluk. alm. tab. 108. f. 2.

Paliuro &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 167.

In Amer. merid. 1.

Frutex 8-10-ped. sarmentosus, ramis oppositis, reclinatis. Spinæ oppositæ, breves, apicibus recurvis. Fol. opposita, periolat. ovalia, acuta, integerr. crassa, glabra, decidua. Stipul. 2. spinosæ, recurvæ. Fl. axillar. corymbosi, ramosi; in fructibus valde elongati. Cor. parva, e luteo-virescens. Bacca glutinosa, sicca, lappacea.

2. *inermis*. P. caul. inermi. *Syst. veg. ed. 14.*

Katu-Kava vvali. Mart. mal. 7. tab. 17.

In India 1.

Arbuse. 10-12-ped. inermis, erecta, comosa. Fol. ut in priore, sed oval-oblonga, acuminata. Racemi ut supra, sed non elongati; ut rubentes in fructibus. Fl. parvi, luteo-virentes, odore lævi. Bacca mollis, nigricans, pulpa albicante.

1392. PANAX. *Hermaphr.* Umbella. Cal. 5-dent. superus. Cor. 5-petal. Stam. 5. Styl. 2. Bacca 2-sperm.

Mas. Umbella. Cal. integer. Cor. 5-petal. Stam. 5.

1. *quinquefolium*. P. fol. ternis, quinatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 513.*

Aureliana &c. Last. ginf. tab. 1. Catesb. car. 3. tab. 16.

Araliastrum &c. *Trew. chret. tab. 6. f. 1.*

In Amer. septentr. 24.

Radix ramosa. Caul. teres, purpurascens. Fol. terminalia, opposita, petiolat. Foliol. petiolul. lata, ovat-acuta, tenuia, serrata, supra obscure viridia, subtus diluioia, venola. Pedunc. interfoliacei. Fl. subcapitati, minuti, albi. Fruct. parvi, rotundi, pulchre rubentes, carne alba. Sem. producunt fol. ternatum absque cotyledonibus, uti monocotyledones.

Radix sanguinem depurat, & stomachum roborat.

2. *trifolium*. P. fol. ternis, ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Araliastrum &c. *Trew. chret. tab. 6. f. 2.*

Nasturtium &c. *Pluk. mant. tab. 435. f. 7.*

In Virginia 24.

Simil. priori, & forsan ejus mas, sed longe minus. Fol. utrimq. acuminata, crenata.

3. *spinosa*. P. fol. quinatis, alternis, spinis infiarameis solitariis: umbellis lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Japonia 6.

Spinæ rectissimæ, patentes, robustæ, loco folii, infra propagines abbreviatas ramulorum. Propagines consistant ex 3-4. fol. absque ramulo, & inter hæc fol. est peduncul. filiformis cum simplici umbella; fl. parvis, albis. Fol. cuneiform. apice producta, serrata; inferiora breviora.

4. *arborca*. P. fol. septenatis: umbellis compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In nova Zeelandia 6.

Fol. petiolat. digitata. Foliol. variz magnitudinis, oblonga, serrata, glaberr. nitida. Umbella magna, radiis elongatis; non simplex ut in prima specie.

5. *fruticosum*. P. fol. supradecompositis, dentato-ciliatis: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Scutellaria tertia. Rumph. amb. 4. tab. 33.

In Fern. teis 6.

Arbustulæ fol. 2-3-pinnat. foliol. lanceolat. inæqualibus, serrato-ciliatis, lævibus. Pedunculus inordinate ramosus, seu dichotomus, aut brachiatus. Umbellulæ subnudæ. Sem. nonnihil compressa, sulcata. *Misc. ludit in fol.*

morotoni. P. fol. digitatis; foliol. lanceolatis, undulatis, subtus ferrugineis. *Aubl. Guian. tab. 360.*

In Caribais h.

Arb. 100-pedal. superne ramosa, ramis erectis, sparsis. Fol. ampla, alterna. Foliol. 8. erecta, inæqualia, ovar-oblong. integerr. rigida, supra glabra, viridia, subius subtomentosa, basi plicata, pedicellis in orbem dispositis, ad apicem petiol. longissim. cylindrac. inferne membranacei, coriacei, amplexicaul. Fl. axill. & terminal. paniculati; panicula ex axilla vaginæ latæ, membranaceæ egrediens. Involucr. minimum. Umbel. 7-8-fl. Bacca subrotund. compressa, 2-3-lacrim. 4. lacin. calyc. & 2. stylis coronata. Sem. plana, semiorbicular.

Folia, Lignum, & fructus aromatici.

1393. **CHRYSIPTRIX.** *Hermaphr.* Guma 2-valv. Cor. ex paleis numerosis, sericeis. Stam. multa, intra singulas paleas singula.

Masf. ut in priore. Pist. o.

x. capensis. C. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. h. Spei 24.

Statura Sisyriachi. Fol. palmaria, seu pedalia, ensiformia, equitantia. Scapus fol. similis, compresso-membranaceus, terminatus spatha. Spatha 2-valv. valvula altera erecta, quasi e scapo continuata; valvula altera inferiore desiccante, ovata. Flos e scapi margine altero supremo, quasi fasciculus fastigiatus searum aurearum, coarctatus periant. cartilagineo.

T R I O E C I A.

1394. **CERATONIA.** *Hermaphr.* C. 1. 3-part. Cor. o. Stam. 5. Styl. filiform. Legum. coriaceum, polysperm. magnum, compressum, nitidum, pulposum.

Dioica. Mas, & fem. distincta.

1. *Siliquea*. C. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 209. Knorr. flor.*
2. *tab. 5. 7. Zorn. io. plant. medic. cent. 1.*
tab. 59.
Siliquea. Cam. epit. 139. Matth.
In Apulia, Sicilia, Cypro &c. b.
Caul. fruticosus. Fol. alterna, abrupte pinnat.
foliol. 5-inga, subseffil. suborbiculata, integerr.
crassa, firma. Fl. axillar. racemosi, sessiles.
Siliquea obscure rubra.
1395. *FICUS*. Fructificationes in cavo pomi carnosae, si-
ve calys. communi contentae, cuius umbi-
licus aliquot squamis clauditur.
Matf. Cal. 3-part. Cor. o. Stam. 3.
Fem. Cal. 5-part. Cor. o. Pili. 1. Sem. 1.
1. *Carica*. F. fol. palmatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab.*
125. Ludw. ed. tab. 109. Knorr. del. hort. 1.
tab. F. Dod. pempt. 812.
- ♂. *Caprificus. Bauh. hist. 1. p. 134.*
Fico. Matth.
In Europa australi, Asia h.
Arb. humilis, latefcens. Fol. petiolat. 5-lobat.
obtusula, aspera, hirsuta, subtus albida. Fruct.
sessil.
2. *Sycamorus*. F. fol. cordatis, subrotundis, integerrim. subtus
tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. 178.*
f. 3.
F. cypria. Rauw. it. tab. 57. Bauh. hist. 1. p.
124 f. 1, 2. Cam. Math. 103. f. 3.
In Aegypto h.
Arbor latissima, ramosa. Fol. repanda, quandoq.
subangul. opposita, petiolat. Fruct. dulcis,
paupis aromaticus.
3. *nymphalis*. F. fol. cordatis, subrotund. integerrimis, subtus
tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*
In India h.
Caul. fruticosus, pedal. laevis, cinereus, stig-
matibus folior. praedius. Rami ramosi, viri-
des, cicatricibus albis. Fol. in hoc genere
maxima, *Nymphaeae luteae* paria, quasi pelata,
subundata, pendula, plana, crassa, glabra,
subtus albo-glauca, venis transversalibus. Pe-
tioli paruli. *Fol. bis in anno decidunt.*
4. *religiosa*. F. fol. late cordat. oblongis, acuminatissimis, in-
tegrim. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab.*
178. f. 2.

Areolu. Hort. mal. 1. tab. 27.

In India h.

Arb. procera. Fol. spitham. longe petiolat. rigida, glabra, supra fuscovirent. nitida, subtus dilutiora, nervosa. Fruct. axillar. bini, trifolles, rotundi, glabri, subruori. Cal. inferus 3-phyll.

3. *benjamina*. F. fol. ovatis, acuminat. transverse striatis, margine lævi. Syst. veg. ed. 14. Pluk. phys. 243. tab. 4.

Itty-alu. Hort. mal. 2. tab. 26.

Veringa &c. Rumph. amb. 3. tab. 90.

In India h.

Arb. procera, ramis tenuibus. Fol. facie Pyri, cæteris speciebus minora, breviter petiolata, exacte ovata, transverse tenerrime striata, margine distincto, lævi, perennis, satore viridia, utrimq. nitida. Fruct. 1-2-3. parvi, rotundi, flavo-rubescunt.

6. *bengkalensis*. F. fol. ovatis, obtusis, integerrim. caul. inferne radicato. Syst. veg. ed. 14. Syst. 2. tab. 16. f. 2. Trew. chrest. 30. Pluk. phys. 173. f. 1. Comm. hort. 1. tab. 62.

Peralu. Hort. mal. 1. tab. 28.

In India h.

Arb. cæteris speciebus procerior. Fol. maiora, & crassiora, utrimq. tomentosa, petiolis subpilosis, venosa. Fruct. axillar. gemini, globosi, unilobati, glabri, dilute rubescent.

7. *indica*. F. fol. lanceolat. integerrim. petiolatis; peduncul. adgregatis; ramis radicanibus. Syst. veg. ed. 14. Tahern. hist. 1370.

Katou-aiou. Hort. mal. 3. tab. 57. fol. iusto latiora.

8. *Sloan*. Jam. hist. 2. tab. 223. Pluk. alm. tab. 178. f. 4.

F. citri &c. Catesb. eur. 3. tab. 18.

Veringa latifolia. Rumph. amb. 3. tab. 84.

Thiela. Hort. mal. 3. tab. 63.

In India h.

Arb. vassilif. Rami longi, nutantes. Fol. Salicina, adspersa punctis albis. Fruct. axillar. gemini, Pijo maiores. Fl. rubri.

9. Fol. valde acumin. fore ut in *Fico religiosa*.

8. *racemosa*. F. fol. ovatis, acutis, integerrim. impresso-punctatis; caul. a. boreo. *Syst. veg. ed. 14 Rumph. amb. 3. t. b. 87. 83.*

Ally-alu. Hort. mal. t. tab. 25.

In India h.

Arb. procera. Fol. petiolat. punctis albidis ad-
aspera, glabra, mollia, satore virentia, niri-
da, subius dilutiora. Fruct. aggregati, plano-
rotundi, umblicati, subpilosi, semines nostris
Europaeis, rubicundi.

9. *perforata*. F. fol. ovatis, glabris; calycibus 2-fid. baccis
globosis, foramine umbilicatis. *Syst. veg. ed.
14. Lin. Suppl. lum. ic. 132. f. 2.*

In Surinamo h.

Arbustula. Fol. acuminata. Fruct. magnitudine
baccae *Ribes rubri*, copiosi, sparsi, pedicel-
lati.

10. *retusa*. F. fol. obovat. oblong. obtusissim. ramis angula-
tis; fructibus sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In India h.

Fol. petiolat. cuneiformi-obovata, integerr. co-
riacea, laevia. Fruct. ramorum sparsi; calyc.
3-phyll. adproximato.

11. *pumila*. F. fol. oblong-ov. acutis, integerrim. subius
reticulatis; caule repente, articulado. *Syst.
veg. ed. 14.*

F. sylvestris &c. Kamoh. am. tab. 804.

Vaiinga repens. Rumph. amb. 3. tab. 85.

In China, Japonia &c.

Frutex scandens. Rami breves, curvi, vagi,
cortice subrufo. Fol. inordinata, 3-unc. lon-
gi, petiolat. plana, rigida, dura, crassa, sub-
tus dilute viridia. Ramuli ad folia cincti stria
elevata. Pedunc. axillar. filiform. solitar. Cal.
inferus, 3-phyll. Fruct. *Juglandis tunisanae* ma-
gnitudine, & figura, quandoq. pyriform. du-
riusculi, superficie f. reticulata, rorulenta,
quandoq. purpurasc. plerumq. herbacea, pun-
ctis candidis distincta; carne fungosa, alba,
lactescente.

12. *toxicaria*. F. fol. cordat-ovatis, subdenticulatis, subius to-
mentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sumatra agro Pudano h.

Fol. pedal. magnitudine *F. Benghalensis*. Fruct.
rotund. villosus. *Venenata fersur.*

13. *ma-*

13. *maculata*. F. fol. oblongis, acuminat. serratis: *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 131. f. 1.*

In America h.

Planta arborea. Fol. petiolat. lata, parallela venosa. Racemus terminal. Fruct. globoli, punctati.

14. *erigona*. F. fol. ellipticis; calycibus 2-fidis: b. cels. umbilico triangulari. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Plum. ic. t. b. 131. f. 1.*

In urugua h.

Arbor superne foliosa. Fol. alterna, petiolat. glabra, subtus magis ciliata. Fl. axillar. pl. globoli, magnitudine Ribesii *Grossularia*. Pedunc. brevissimi, 1-fl.

15. *hispida*. F. fol. oblong. acutis, petiolatis: fructibus strigoso hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Java.

Tota pilis minutissimis, sparsis, raris vestita. Fol. longe petiolat. Pedunc. axillar. filiform. Fruct. globosi.

16. *heterophylla*. F. fol. oblong. indivisis, trilobis, sinuat. sq. scabris. caul. hispido: fructu pedunculato, glabro. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In India orient.

Valde singularis fol. diversis in eodem caule.

Caul. subflexuosus, gracilis, hispidus. Fol. inferiora integra; super. divisa, ut in *F. Ceylonica*.

17. *microcarpa*. F. fol. oblong. breviter petiolat. trinerviis, venosis, glaberrimis: fructu parvo, globoso, sessili. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Java.

- vasta*. F. fol. cordato ovalibus, obtusis, integris, glabris, nitidis, subcoriaceis. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Arbor valissima, mira, & grata visu. Truncus veluti ex pl. constans. Fol. alterna, propinqua, spinum: villosi. Fructus magni, duplo nucæ *Avellanae*, & ultra, diametr. semipollic.

- marifolia*. F. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Fol. semispitham. alterna, cordat-ovata, acuta, serrata, utrimq. scabra. Stipul. 2. membranac.

Tom. VI.

K

- erectæ, lineari-lanceol. Fruct. edulis, sed ingratus.
- palmata*. F. f l. cordat-acutis, palmatisque, serrato crenatis, flexilibus, scabris. *Syst. veg. ed. 14. Forsk. Æg.*
In Arabia h.
- serrata*. F. fol. ovali-acutis, palmatisque, connato-repandis, scabris. *Forsk. Æg.*
In Arabia h.
Fol. simplicia, integra, & lobata in eadem planta. Fruct. nucis Juglandis magnitudine, non edulis.
- religiosa Forskali*. F. *Forsk. Æg.*
In Arabia h.
Diversa a F. religiosa Lin. Fol. late cordata, acuta, integerr. glabra, nitida, rigida, spitham. Pedunc. axil. gemini, fructu duplo longiores, vix pollic. basi incrassati, apice magis, squamis biris-ternis, obtusis, basin fructus amplectentibus. Fruct. glaber.
- sur*. F. fol. oblong-acutis, vâd: repandis, glaberrimis, basi subcordatis. *Forsk. Æg.*
In Arabia h.
Arb. *Sycomoro* similis. Fruct. prope truncum conferti, ovi columbini magnitudine, edules.
- polycarpus*. F. fol. lanceol-oblong. obtusis, integerrim: peduncul. aggregatis: caul. arboreo; ramorum radicibus nullis. *Ja q. Obs. P. II. p. 29.*
In Curacao h.
- Caribæa*. F. fol. cordat-ovat. acuminat. integerr. peduncul. simplicibus. *Jacq. Obs. P. II. p. 30.*
In insulis Caribæis h.
Planta parasitica.
- japtea*. F. caul. erecto: fol. ovatis, acuminat. integerrim: fructu solitario. *Burm. Ind. Rumph. amb. 3. tab. 96.*
In India.
- pyrifolia*. F. fol. ovatis, acuminat. margine ciliatis. *Burm. Ind.*
In Japonia h.
- Ampelos*. F. fol. ovat-oblong. integerrim. scabris: fructu parvo, uvæformi. *Burm. Ind.*
Folium &c. *Rumph. amb. 4. tab. 63.*
In India.

POLYGAMIA TRIOECIA .

67

- montana* . F. fol. oblong-repando-ferratis: fructu minimo.
F. *Burm. Ind.*
In *Ind. a* .
- Tsjukela* . f. l. ovatis, oblong. integerrim. & crenatis.
Burm. *Ind. Hort. mal.* 3. sub. 64.
In *India* .
- grossularioides* . F. fol. petiolat. ovatis, basi integris, apice
ferratis, subius e luteo-albicantibus. *Burm.*
Ind.
b. Valii teregam. *Hort. mal.* 3. sub. 61. quæ dif-
fert petiol. brevissimis.
In *India* .
- Chanas* . F. *sycomorioides*; fol. scabris. *Forsk. Suppl.*
Æg.
In *Arabia* .
Simil. *sycomoro* . Fruct. edulis.
- Foka* . F. fol. distichis, alternis, petiolat. ovat-acutis,
scabris. *Forsk. Suppl. Æg.*
In *Arabia* .
- Tand* . F. fol. conjugat. petiolatis, 4-pollic. ovatis, in-
tegris. *Forsk. Suppl. Æg.*
In *Arabia* .
F. fol. ovat acutis, integerr. fructu in ala foli-
tario. *Plum. ic. tab.* 131. f. 3.
In *Guiana* b .
Fol. alterna, petiolat. venosa. Fruct. globosi,
globri, virides.
F. Lauri effigie: fructu minimo. *Plum. MSS.*
vol. 7. tab. 112.
In *Guiana* .

NOVA GENERA.

SCHIMA.

- G**luma 2-valv. lineari-lanceol. 2-fl. cor.
longior; exterior apice bifeta, inermis; inte-
rior arista ex apice glumis longiore.
Flos exter. *masculus*; cor. 2-valv. intus villosa,
pellucida, lineari-mutica. Stam. 3.
Flos intes. *hermaphrod.* cor. 2-valv. inermi, api-
E ij

ce fissio, e fissura emittente aristam spicula longiorem, basi fuscam, apice albam: ante fl. explicat. s. intra spicam superiorem spiraler recondiram. Styli 2. plumosi. Stam. 3. Spicul. pedicellatæ. Cal. 2-valv. 2-fl. cor. maior, ciliatus, lineari lanceolat. muticus: gluma exterior longior. Flos uterque mascul. Cor. 2-valv. mutica.

Differt ab Ischemo, spicul. pedicellatis, mere mascul. est 2-fl.

Ischemoides. S. fici simplici: spicul. coniugatis, 2-fl. fl. masculino mutico, hermaphrod. aristato. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Culmi cubital. raro ramosi, filiform. Fol. longa, vagrantia, linearia, plana, striata, scabra, basi hirsuta. Spica terminal. spicam. coarctata. Spicul. geminatæ, altera sessili, altera pedicellatæ.

THEMEDA.

Cal. 1-valv. 1-fl. Cor. 2-valv. Styli, & arista nullæ. In medio capituli surgit pedicellus brevis, in quo spicul. 2 masculæ, pedicellatæ, una hermaphrod. sessilis, cal. 1-valv. cor. 2-valvi.

triandra. *T. Forsk. Æg.*

In Arabia.

Culmi racemosi: vaginæ compressæ, latæ, ensiform. includentes ramos, & capitula ante exlicationem. Spicul. veluti ex spatha capitatæ; exteriores verticillatæ, masculæ.

POSSIRA,

Cal. Periant. 4-phyll. lacin. ovatis, concavis, deciduis.

Cor. Peral. 1. latum, subrotund. erectum, fimbriatum, ungue receptaculi cal. inferum.

Stem. Filan. plurima, 25-26. cor. longiora; 6-7. breviora, sterilia, petalo opposita. Anth. ovaræ, nutantes, 2-locul.

Pist. Germ. oblong. compressum, pedicellat. incurvum. Styl. brevis. Stigm. obtusum.

POLYGAMIA.

69

Peric. Legum. oblong. latum, ventricosum, compressum, gibbrum, 1-locul. 2-valv.
Sem. 3-4 compressa, angulata, margini valvular. adfixa.

arborescens. *P. Aubl. Guian. tab. 355.*

In Guiana h.

Arb. 8-ped. superne ramosa ramis hinc inde sp. rtis. Fol. alterna, digitata. Foliol. 3. testif. costæ marginatæ adoxa; foliol. impar. ovato-oblong. acutum, integerr. glabrum: foliol. inferior. ovata, acuta, minora. Stipul. 2. exiguae, deciduae. Fl. axillar. corymbosi, bracteati. Cor. flava. Legum. subvirid.

COUBLANDIA.

Cal. Periant. 1-phyll. tubulosum, 4-dent. denticul. acutis.

Cor. 1-petal. rubro oblong. limbo 4-fid. lacin. parvis, acutis.

Stam. Filam. 25. basi coalita. Anth. oblong. 2-locul.

Pistil. Germ. oblong. Styl. longitudine flaminum. Stigm. obrusum.

Peric. Legum. nodosum, nodulis interruptis, orbiculat.

Sem. 1. sphaeric. in quolibet nodulo.

frutescens. *C. Aubl. Guian. tab. 356.*

In Guiana h.

Frutex 5-6-ped. ramis erectis, sparsis. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. quina, duorum parium, & per paria opposita, petiolat. ovata, obtusa, acuta, integerr. glabra. Stipul. 2. deciduae. Fl. axillar. & terminal. spicati. Cor. alba. Legum. & sem. viridia.

P E R E B E A.

Fl. femin.

Involuc. 1-phyll. carnosum, ad oras dentatum, subrus squamosum, multifi.

Cal. Periant. tubulosum, ad apicem ventricosum, 4-part.

iii

POLYGAMIA.

Pist. Germ. subrotund. Styl. oblong. crassus, hirsutus. Stigm. 2-lobum.

Peric. Cal. succulentus, hirsutus, denticul. 4. coronatus.

Sem. 2. angularum.

Fl. masculi desiderantur.

1. *Guianensis*. P. Aubl. *Guian.* tab. 361.

In Caribæis h.

Arbut. caulibus pl. flexilibus. Fol. ampla, alternata, subsessil. ovat-oblong. acuta, ad oras remote dent. punctis translucidis quasi pertusa, glabra. Stipula ampla, longa, semiamplexicaul. Fl. multi in eodem involucro, viscescent. Fruct. coccin.

COUSSAPOA.

Cal. Cor. Stam. Pist. desiderantur.

Peric. Bacca sphaerica.

Sem. Plurima, minima, pulpa involuta, in capitulum collectis, placentæ comm. adfixæ.

1. *latifolia*. C. Aubl. *Guian.* tab. 362.

In Guiana h.

Arb. 60 ped. & ultra, apice ramosa. Fol. petiolat. ovata, obtusa, integerr. glabra, supra viridia, subtus rufescentia. Stipul. amplexicaul. 1-phylla, oppositifol. oblong. conica. Fl. axillar. corymbosi. Fruct. lutescent constant ex pl. seminibus pulpa involutis, & in capitulum rotundum collectis.

Elicitur succus lutescens.

2. *angustifolia*. C. fol. ovat-oblong. subtus ferrugineis: fruct. solitario, globoso, pedunculat. nigro. Aubl. *Guian.* tab. 363.

In Caribæis h.

Differt fol. minoribus, ovat-oblong. obtusis: fructu ma: axillar. foliatar. pedunculato.

TAVOMYTA.

Cal. Periant. 2-phyll. foliol. subrotund. concavis.

Cor. Petal. 4. ovata, acuta, concava.

POLYGAMIA:

77

Stam. Filam. multa, 20-25. erecta, disco inserta. Anth. 2-valv. 2-locul.

Pist. Germ. subrotund. 4-fulcatum: Stigm. 4-subrotunda.

Peris.

Sem.

Guianensis. T. Aubl. *Guian.* tab. 364.

In Caribæis h.

Arb. 10-ped. superne ramosa. Fol. opposita, petiolat. amplexicaul. ovata, acuta, supra virid. subtus albicantia, venis rubris notata. Fl. terminal. corymbosi. Petal. virid.

Elicitor succus luteus, evadens resina.

THRYOPHALON.

Fl. hermaphrod. in spicula 3-4 fl.

Cal. 1-valv. Gluma oblong. acuta, compressa.

Cor. o.

Stam. Filam. 3-capillaria. Anth. oblong.

Pist. Germ. subrotund. Syl. 2. filiform. basi infima coaliti. Stigm. simplicia.

Peric. o.

Sem. solitar subrotund. compressum, liberum.

Flos femin. sessil. ad basin, & ex opposito spicul. hermaphroditar.

Fl. fem.

Cal. gluma 1-valv. sessil. oblonga, acuta, compressa.

Cor. o.

Stam. o.

Pist.

Peris. ut in hermaphr.

Sem.

Y. nemorale. T. Forst. gen.

In insulis maris austral.

APORETICA.

Fl. hermaphr.

Cal. Periant. 4 phyll. foliol. subrotund. 2. exterioribus magis concavis.

E iv

POLYGAMIA.

Cor. Petal. 4. oblonga, concava, longitud. ca-
lycis.

Nectar. brevissim. 4-fid. *Stam.* cingens, lacinu-
lis emarginatis.

Stam. Filam. 8 subulata, lateraliter e receptac.
orta. *Anth.* subrotund.

Pist. Germ. 2. globosa, subdistincta, pedicellata.
receptac. cylindrico. *Styl.* 2 divaricati. *Stig-*
mat. simplica.

Peric. *Matura nobis non visa.* Germ. 1-locul.

Sem. 1-sperm. evalvia erant.

Fl. mascul.

Cal.

Cor.

Nect.

Stam

} *Ut in hermaphr.*

x. ternata.

A. Forst. gen.

In insulis maris austral.

PENNANTIA.

Fl. hermaphr.

Cal. o.

Cor. Petal. 5-lanceol. acuta, patentissima.

Stam. Filam. 5. capillaria, longitudine petal.

Anth. oblong. incumbentes.

Pist. Germ. superum, obtuse 3-gonum. *Styl.* o.

Stigm. peltatum, planum, subtrilob.

Peric. Germ. triquetrum, 2 locul. loculis 1-sperm.
altero plerumq. abortiente.

Sem. solitar. subtriquetra.

Fl. masc.

Cal. *Ut in hermaphr.*

Co-

Stam. Filam. 5. capillaria, petalis duplo longio-
ra. *Anth.* ovata, incumbentes.

x. corymbosa. *F. Forst. gen.*

In insulis maris austral.

ACIPHYLLA.

Fl. hermaphr.

Cal. Involucra utraque (si adfunt) 5-phyll. foliol. brevibus, subulat. ad latus exterius umbilicæ.

Umbel. general rad. paucis, inæqualibus; exterioribus duplo longioribus.

Partial. convexi, radiis pl. tenuibus, aequalibus.

Periant. proprium minutum. 5-phyll. superum, foliol. erectis, obtusiuscul.

Cor. General. æqual. convexa, floscul. cernibus hermaphr. Propria. Petal. 5. ovata, acuta, utrinq. adtenuata, conniventia.

Stam. Filam. 5. filiform. apice incurva. longitudine petal. Anth. oblong. didymæ, deflexæ.

Pist. Germ. inferum oblongum. Styl. 2. breves, cylindrici, divaricati. Stigm. simplicia.

Peric. Fruct. oblong. 5-gon. 2-partibil: calycinis foliol. coronatus.

Sem. 2. oblong. hinc plana, inde sub 3-gona.

Fl. masc.

Cal. Involuc. utraque

Umbel.

Periant. } *Ut in hermaphr.*

Cor.

Stam. Filam. 5. filiformia, petal. duplo longiora. Anth. erectæ, ovatæ.

C. squarrosa. A. Forst. gen.

In insulis maris austral.

COPROSMA.

Fl. hermaphr.

Cal. Periant. brevissim. inferum, persistens, denticul. 5 acutis, distantibus.

Cor. 1 petal. turbinato campanulata, 5-7-fida, laciniis erectis, subulatis, acutis.

Stam. Filam. 5. quandoq. 6-7 capillaria. Anth. erectæ, oblongo linear. acumin. lasi 2-fid.

Pist. Germ. oblong. Styl. 2. filiform. basi sub-

POLYGAMIA.

cohærentes, extra cor. divaricati. Stigm. simplic.

Pert. Bacca ovato-globosa, 2-sperm.

Sem. 2. ovata, hinc plana, inde convexa.

Fl. masc.

Cal.

Cor. Ut in hermaphr.

Stam.

1. *foetidissima*. C. fl. solitariis. *Forst. gen.*

In insulis maris austral.

2. *lucida*. C. peduncul. compositis. *Forst. gen.*

In insulis maris austral.

SCOPOLIA.

Fl. hermaphrod.

Cal. Periant. minutum, superum, 5-dent.

Cor. Jam decidua.

Stam.

Pist. Germ. oblong inferum. Styl. 3. cylindrici, brevissimi. Stigmat. simplic.

Peric.

Sem.

Fl. mascul.

Cal. ut in hermaphr.

Cor. Petal. 5. lanceol. horizontaliter patentia.

Stam. Filam. 5. subulata. Anth. subrotunda.

1. *lucida*. S. *Forst. gen.*

In insulis maris austral.

CEODES.

Fl. masc.

Cal. o.

Cor. 1-petal. tubo brevi, turbinato; limbo 5-fid. lacin. subrotund. revolutis.

Stam. Filam. 10, subulata, longitudine petal. alterna min. laciniiis cor. opposita. Anth. subrotund.

Pist. Germ. o. Styl. filiform longitud. flaminum. Stigm. dilatatum, obtusum.

POLYGAMIA.

75

Fl. hermaphr. . . .

1. umbellifera C. Forst. gen.
In insulis maris austral.

MELISTAURUM.

Fl. masc.

Cal. o. nist cor. dicas.

Cor. minuta, 5 part. lacin. subrotund. concavis, patentibus. Nectar. campanulat. truncatum, cor. insertum, margine staminiferum.

Stam. Filam. 20 margini nectar. inserta, quorum alterna subulata, fertilia, alterna exstiora, apice pilosa, castrata, Anth. (fertilibus) subrotund.

Pist. Germ. crassiuscul. in centro fl. Styl. cylindric. brevis. Stigm. obtusum.

Peric. . . .

Sem. . . .

Fl. hermaphr.

BREYNIA.

Fl. hermaphr.

Cal. Periant. 1-phyll. turbinat. laciniatum, sibi dispar: floris minutum, lacin. 6. obtusis, arcte conniventibus, apice plano depressis, ut foraminulo tantum pervium sit: fructus (postea excrescens) patentissim. triplo maius, lacin. subæqualibus, orbiculatis.

Cor. o.

Stam. Filam. o. Anth. 5 lineares, stylo longitudinaliter adnatæ, approximatae.

Pist. Germ. minimum. Styl. cylindric. longitudine calyc. Stigm. obtusum.

Peric. Bacca globosa, sicca, 3-locul. locul. 2-sperm.

Sem. 2, dorso convexa, lateribus duobus planis.

Fl. masc.

Cal. Perian. 5-part. lacin. subrotund. concavis, subæqualibus.

POLYGAMIA.

Cor. o. Nect. glandulæ 5. subpedicell. cum staminibus alternæ.

Stam. Filam. 5. brevissima. Anth. subrotund. longitudine calyc.

Fl. fem.

Cal. Ut in mascul.

Cor.

Pist. Germ. globosum. Styl. o. Stigm. 3, obcordat. petaloidea.

Peric. Caps. 5. locul.

Sem. solitar. subtriquetra.

1. *disicha.*

B. Forst. gen.

In insulis maris Austral.

TAMBOURISSA.

Fructificatio media inter *Ficum*, & *Dorsteniam*.

Receptac. comm., ante expansionem, habet fig. sem. uvarum; inde 4 f. riam scinditur. Cavit. interna staminibus repleta est, & cæteris partibus fructificationis. Post ead. brevescentiam Receptacul. subclauditur, & augetur, ac veluti pomum evadit, nunquam perfecte clausum. Nucleus forma *Amygdali* parvæ, cuti lutea testus.

2. *quadrifida.* T. Sonnerat. Voyag. 2. tab. 134.

In Madagascar b.

Arb. ligno albo, valde metalloso. Fol. opposita, petiolat. elliptica, fere obrusa, integerr. coriacea, glabra, subtus nervosa. Fruct. penduncul. crasso, brevi innixus.



CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.



FILICES.

* *Fructificationes spicatae.*

1396. *Equisetum*. Spica sparsa, ovali-oblonga. Fructificationes peltatae, basi dehiscentes, multivalves. Caulis, & fol. plerumq. teretia, oxydatis articulata.
1397. *Cycas*. Mas. Amentum strobiliforme, squamis subtus undiq. testis polline.
Fem. Spadix ensiformis. Styl. 1. Drupa nucleo lignoso.
1398. *Zamia*. Mas. Amentum strobiliforme, squamis subtus testis polline.
Fem. Ament. strobiliforme, squamis utroq. margine. Bacca solitaria.
1399. *Onoclea*. Spica ramosa, disticha. Fructificationes 5-valv.
1400. *Ophioglossum*. Spica articulata, disticha, pedunculata, ligulata; articulis transversim dehiscentibus.
1401. *Osunda*. Spica racemosa. Fructificationes globosae, 2-valv.
** *Fructificationes frondosae, in pagina inferiore.*
1402. *Aërosticum*. Fructificationes discum totum frondis tēgentes.
1403. *Polypodium*. Fructific. in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis.
1405. *Hemionitis*. Fructific. in lineis decussatis disci.
1407. *Asplenium*. Fructific. in lineolis disci frondis sparsis.
1404. *Blechnum*. Fructific. in lineis duabus collae frondis approximatis, parallelis.

1406. *Lorchitis*. Fructific. in lineolis sub frondis sinibus.
 1403. *Pteris*. Fructific. in lineis marginalibus.
 1404. *Adiantum*. Fructific. in maculis terminalibus sub replicato margine frondis.
 1410. *Trichomanes*. Fructific. solitariae, stylo fetaceo terminatae, margini ipsi frondis insertae.
 *** *Fructificationes radicales*.
 1411. *Marsilea*. Fl. masculi supra frondem.
 Fructific. Femin. ad radicem, subrotunda, 4-capsular.
 1412. *Pilularia*. Fl. masculi ad latus frondis in linea pulverulenta.
 Fructific. ad radicem, globosa, 4-locul. polysper.
 1413. *Isoetes*. Fl. masculi Anthera, intra basin frondis.
 Fl. femin. Caps. 2-locul. intra basin frondis.

MUSCI.

* *Acalyptrati*.

1414. *Lycopodium*. Caps. subrotund. vel reniformes, nudae, vel in alis folior sessiles, vel pedunculatae in spicam congestae, destitutae calyptrae, ciliis, & operculo, 2 valv. elastice dissilientes, & pollinem inflammabilem emittentes.
 1415. *Porcia*. Anth. multilocular. ferminosa, non operculata. Calyptra nulla.
 1416. *Sphagnum*. Anth. operculata, ore laevi. Calyptr. nulla.

** *Calyptrati, dilini*.

1410. *Splachnum*. Caps. seu Anth. apophysi, convexae, planae, vel ampullatae, maximae, coloratae infidens; calyptra laevi, caduca testata; oris dent culis 8 distincte.
 Fem. in distincta planta stertam enormans.
 1421. *Polytrichum*. Anth. operculata, apophysi minimae infidens. Calyptra viosa. Stetla femio. in distincto individuo.
 1422. *Mnium*. Setae inferne subrotundae, nudae, idest nullo perichatio, sive involucro squa-

moso, *Hypnis* proprio; nulla vagina foliacea tubulosa, *Polytrich* competente, instructa. Capf. per maturitatem inclinatae.

*** *Calyptrati*, *monoclini*.

1417. *Phascum*. Anth. operculata, ore ciliato. Calyptra minuta, oblonga, obliqua, fugax.
Differt a Sphagno ora ciliata operculo acuminato tecta.
1423. *Bryum*. Anth. operculata. Calyptra laevis. Filam. e tuberculo terminali, sive nodo oblongo, in plerisque colorato, ortum.
1424. *Hypnum*. Anth. operculata. Calyptra laevis, obliqua. Filamentum laterale, ortum e perichætio.
Differt igitur a Mnio, & Bryo, in frudificatione, axillari.
1418. *Fontinalis*. Capf. sessilis, aut breviter pedunculata; operculo, & calyptra conica tecta: perichætio squamoso, membranaceo inclusa.
1419. *Buxbaumia*. Anth. operculata, hinc membranacea. Calyptra caduca; inter operculum sacculus pollinis.

A L G Æ.

* *Terrestres*.

1426. *Marchantia*. Fl. calyci comm. peltato, subtus florido.
Subjuncta firma, coriacea. Fol. lanellata, subarticulata, vegetabilibus, aut mineralibus adherentia.
1424. *Jungermannia*. Ex vagina membranacea nunc simplici, nunc bivalvi, nunc multifida surgit pedunculus sphaerulam nudam sublineos, 4-valv. Sem. subrotunda. *Planta repens. Fol. simplicia in furculos disposita.*
1425. *Targionia*. Cal. 2-valv. includens globum. Anth. campanul. sessilis, in fundo calycis.
1428. *Anthoceros*. Cal. cylindricus, integer. Anth. subulata, longissima, 2-valv. *Frons coriacea, plantula.*
1426. *Blasia*. Fr. cylindrica, tubulosa.

1427. *Riccia*. Fl. granulis frondi innatis. *Frons coriacea, repens, pulposa, Jungermanniis acanthibus, vel Marchantiis similis.*
1429. *Lichen*. Fr. receptaculo subrotundo, planiusculo, lævi, nitido. *Substantia filamentosa, solidi, aut rigida, ramulosa, vel foliacea, crustacea: vegetabilis, aut lapideus adhaerens; orbiculos, acetabula, vel tubercula sublinens.*
1434. *Bryas*. Substantia lanuginosa, vel pulverulenta.
- ** *Aquaticæ.*
1430. *Tremella*. A. gelatinosa.
1432. *Uva*. A. membranacea.
1431. *Fusus*. A. coriacea.
1433. *Conserua*. A. capillaris.

F U N G I.

* *Pileati.*

1435. *Agaricus*. Pileus subtus lamellatus.
1436. *Boletus*. Pileus subtus porosus.
1437. *Hydnum*. Pileus subtus echinatus.
1438. *Phallus*. Pileus subtus lævis.

** *Pileo destituti.*

1439. *Clathrus*. F. cancellatus.
1440. *Helvelia*. F. turbinatus.
1441. *Peziza*. F. campanulatus.
1442. *Clavaria*. F. oblongus, lævis.
1443. *Lycoperdon*. F. globosus.
1444. *Mutinus*. F. vesicularis, stipitatus.

F I L I C E S.

1436. **EQUISETUM.** Fructific. in spicam sparsam, ovato-oblong. digita C. ut. & fol. plerumq. terrena, p. xidolim articulata.
1. *sylvaticum*. E. caul. spicato; frondibus (plerumq.) compositis.

tis. *Syst. veg. ed. 14. Tabern. hist. 362. Bauh. hist. 3. p. 730.*

In Europæ septentr. pratis sylvaticis *¶*.

Habitus caudæ equinæ. Caul. cubital. sulcatus.

Fol. tenuissima, ultra 12. Quodq. folium iterum 8-10-verticill. 5. fol. edit adeo vaginosa, ut spinosa adpareant. In summo caule spica petiolata, longa, variegata. Vaginæ omnium maximæ, laxæ, flavæ. *Frondes quandoq. simplic.*

2. *arvense.* E. scapo fructificante nudo; caul. sterili frondoso (radiatorum 12). *Syst. veg. ed. 14.*

E. minus. *Fuchsi. hist. 323.*

Scapus caudæ equinæ. *Black. tab. 217 f. 3.*

In Europæ, & Orient. agris, pratis, & ad vias, locis humentibus *¶*.

Dignoscitur caulis asperitate, limæ simili. Caul. ped. exasperatus. Folior. verticilli 12. & ultra, etiam ramosi, vaginis caulinis amplis. Asparagi, seu turiones minores, & humiliores.

3. *palustre.* E. caul. angulato: frondibus simplicibus: (ramis multiss.). *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 795.*

b. *Rati. angl. 3. tab. 5. f. 3.*

In Europæ aquis, & pratis spongiosis *¶*.

Caul. ped. asperi. Fol. longa, 4-5-sulcata. Vaginæ caulinae foliose, nigre, ora alba. Verticilli remoti, paucifeti. Spica parva.

Terrest. caulem habet angustiore, 4-gon. sulcatum.

Aquat. caulem habet multo latiore, & numerosis sulcis distinctum.

4. *fluvatile.* E. caule florifero nudo, striato; sterili verticillis densissimis; radiatorum sub 40.

E. caul. striato: frondibus subimplicibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Cauda equina. *Black. tab. 277. f. 2.*

Hippuris. *Lob. ic. p. 793.*

In Europæ, ad ripas lacuum, fluviorum *¶*.

Caul. 2-cubit. non sulcatus, sed solum striatus, cavus, pallidus, per ætatem niger: junior asparagi turio adparet, ped. 2-cubit. Fol. crebriora, 30-40. scabra, 4-gona, internodiis frequentibus.

3. *limosum*. E. caul. subnudo, lævi. *Syst. veg. ed. 14. Rail. angl. 3. tab. 5. f. 2.*

In Europæ paludibus profundis 24.

An var. E. palustris? Frondes digiti auricularis non raro crassiores. In planta iuniore caules nudi, sulcis profundis. Multi rami spica florali terminati.

6. *hyemale*. E. caul. subnudo, aspero, basi subramoso. *Syst. veg. ed. 14. Cam. epit. 270. f. A.*

In Europæ sylvis asperis, uliginosis, & secus fluvios 24.

Onium est asperissimum. Caul. altior, teres, sulcis obtusis, asperis, glaucus, vaginis pallidis, brevissimis, apicibus nigris, non vero ferratis, neque ciliatis. Rami dentibus ciliatis.

Var. fol. nuda.

fol. aliqua proferens.

7. *giganteum*. E. caul. striato, atborecente: frondibus simplicibus, strictis, spiciferis. *Syst. veg. ed. 14.*

E. altissimum &c. Plum. ic. 125. f. 2.

In America.

Planta alta, aphylla, ramosa. Caul. genicular. verticillatus. Verticilli longiss. striati, nodosi, simplic. ad apicem florentes.

1397. *CYCAS*. Mas. Ament. strobiliform. squamis subtus undiq. tectis polline.

Fem. Spadix ensiform. germinibus angulo immersis, solitar. Styl. 1. Drupa nucleo ligneo.

1. *circinalis*. C. frondibus pinnatis; foliol. linearibus, planis. *Syst. veg. ed. 14. Syst. 1. tab. 2. f. 3. 4.*

Arbor &c. Seb. thes. 1. tab. 25. f. 1.

Olus &c. Rumph. amb. 1. tab. 22. 23.

Todda-pana. Hort. mal. 3. tab. 13. 21.

In India B.

Arb. 30-ped. ad cujus radicem propagines nonnullæ emergunt, quæ tempore singulares quocque caudices formando, in altum adfurgunt. Fol. 2-cubit. & ultra. Foliola in medio longiora, spinulis minutiss. quasi ferrata. E supremo trunci apice, media inter fol. floridi quidam dilute purpur. calyces, instar *Brassicæ cauliferæ*, racematim congesti propullulanti, qui in fructus abeunt *Pineæ* compactæ similes, longe pedunculati. Dum infusa fol. maiora tabe-

scunt, pulla iugiter fol. e fastigio emergunt, donec incrementi sui terminum adeptæ sit arbor.

2. *revoluta*. C. frondibus pinnatis; foliol. margine revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Sotios. *Kæmph. aman. Fasc. V. p. 897. Rumph. amb. 1. tab. 24.*

In India h.

Caudex orgyal. & ultra, ramosus, a casu folior. ferrugineo-hirsutus. Fol. stipite inferne spinoso. Foliol. subopposita, linearia, versus interiora subfalcata, spina simplici terminata, glabra, 2. lin. lata, erecto-patentia. Drupa sequipollic. ovata, comressa, rubra, edulis.

1398. ZAMIA. *Musf.* Amentum strobilifer. Squamis lubris re-
ctis polline.

Fem. Ament. ut supra, sed squamis utroq. margine. Bacca solitaria.

1. *pumila*. Z. frondibus pinnatis; foliol. suboppositis, linearibus, obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*

Palma &c. *Cumm. hort. 1. tab. 58. Pluk. phyt. 103. f. 2. & 309. f. 5. Herm. par. tab. 210.*

Palmifolia &c. *Trew. ehret. 5. tab. 26.*

In America merid. h.

Truncus crassius. Fol. 7-8. e radice prodeunt, spithamam longa. Foliol. rigida, nitida, apice serrulata, 5-6-7-iuga. Fructus *Jujubæ* forma, suaverubent. collecti. Spadix more fructus *Cum-pressæ* divisus in strobilos.

2. *Cycadis*. Z. frondibus pinnatis; foliol. lanceolat. acuto-spinosis. *S. fl. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

C. *infra. Ad. Upsal. vol. 2. tab. 5.*

Ad cap. b. *Spei.*

Caul. quasi bulbosus supra terram, imbricatus, tomentosus. Fol. radical. seu bulbi tenuissima *Cycadis*, sed nec circinalia, nec spinis infimis spinescentibus. Fl. masculi ut in *C. circinali*, sed fem. similes masculis, & sub singula squama bractæ 2. ut in priore.

1399. ONOCLEA. Spica disticha; fructificationibus 3-5-valvibus.

1. *sensibilis*. O. frondibus pinnatis, apice subracemosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Pluk. mant. tab. 404. f. 2.*

Polypodium &c. *Morif. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 10.*

Filix &c. *Mentz. pug. 6. tab. 10.*

In Virginia 24.

Frondes iuniores fusca lanugine præditæ, tenues, icbis oppositis, fatis latis, sinuatis, integris.

2. *polyedictes*. O. frondibus 2 pinnatis; fructificationibus 3-valvibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei; in fissuris rupium summorum montis Tabularis.

Stipes reptans, filiform. nitidus, rufus, radicans. Frons compolita. Foliol. opposita, patentia. Pinnæ remotæ, suboppositæ, lineares, pinnatifid. utque ad costam, obtusiusculæ.

1400. *OPHIOGLOSSUM*. Spica articulata, disticha, articulis transversim debiscentibus.

1. *vulgatum*. O. fronde ovata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 147. Black. tab. 416. Knorr. del. hort. 2. tab. O. 3. Plum. fil. XXXVI. tab. B. f. 5. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 1. Cam. epit. 364.*

In Europæ pratis sylvaticis, & subhumidis collum 24.

Frons unica, erecta, amplexicaul. integerr. carinosa, glabra, sine costâ, & nervis. Scapus fronde longior, ad basin ipsius. Capf. iuniores, distichæ, compressæ, maturæ 2-fidæ, & quasi ferratæ. Var. 1.^a fol. angulosis: 2.^a fol. min. subrotund. 3.^a bi-trilinguis.

2. *nudicaule*. O. frondibus ovatis: scapo aphylo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Planta minima, pollicem transversum lata. Rad. fasciculata, filiform. Foliol. nonnulla, radicalia, petiolat. integerr. Scap. filiform. Spica longitudine scapi, paulo crassior.

3. *lusitanicum*. O. fronde lanceolata. *Syst. veg. ed. 14.*
O. angustifol. &c. *Barr. rar. tab. 252. f. 2.*
In Lusitania.

4. *reticulatum*. O. fronde cordata. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 164.*

O. *vulgari facie*. *Pet. fil. tab. 10. f. 4.*

In America meridion.

Frons palmaris, bullulis reticulatis excavata. A

medio petioli extollitur peduncul. erectus, in lingulam cuspidatam delinens, fere digitum longam, angustam.

5. *palmatum*. O. fronde palmata, basi spiciflora. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 163. Pet. fil. tab. 11. f. 2. In Amer. meridion.*

Rad. tuberosa, alba, super arbores adhærens.

Fol. 3-4. manum expansam referunt, petiolat. pulchre viridia, venulis reticulata, sine nervo. Ad latera baseos folior. alternatim pl. spicæ oriuntur.

6. *pendulum*. O. frondibus linearibus, longissimis, indivisis. *Syst. veg. ed. 14.*

Scolopendria *ma.* Rumph. *amb. 6. tab. 37. f. 3.*

In India arboribus parasiticum, pendulum.

7. *scandens*. O. caul. flexuoso, tereti: frondibus coniugatis, pinnatis: foliol. utrimq. spiciferis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Breyn. *cent. tab. 96.*

Lonchitis &c. Moris. *hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 15.*

Adiantum &c. Rumph. *amb. 6. tab. 32. f. 2.*

Tsieru-valli-panna. Hort. *mal. 12. tab. 33.*

In India h.

Frondes non oppositæ, sed coniugatæ ad tubercula ramorum. Pinnæ cordato-hastatæ, seu hastato-lanceol.

8. *flexuosum*. O. caul. flexuoso, tereti: frondibus oppositis, petiolat. palmatis; pinnis lanceolat. integerrimis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Adiantum &c. Rumph. *amb. 6. tab. 32.*

Valli-panna. Hort. *mal. 12. tab. 32.*

In India h.

Priori nimis adfines. Frond. suboppositæ.

9. *japonicum*. O. caul. flexuoso, angulato, frondibus supradecompositis; pinnulis alternis, incilis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Caul. scandens, filiformis, glaber. Frondes alternæ, inferior. 3 part. lobus medius lanceolat. incilo-ferratus: laterales min. 2-fidi, serrati: superne 2-pinn. pinnul. incilis: supremæ floriferæ, pinnulis linearibus, æqualibus, integris.

Differt ab O. flexuoso, fronde supradecomposita, pinnis alternis, nec oppositis; pinnulis alternis,

inseis-pinnatifid. incisuris serratis: pinnulis floriferis linearibus.

Ab O. scandente, pinna maxima, non elongata, nec basi auriculata: fronde decomposita, pinnis subternis.

pedatum. O. caul. flexuoso, anguloso: fronde pedata.
Burm. Ind. tab. 66. f. 1.

In Java.

circinnatum. O. caul. flexuoso, tereti; frondibus 3-4-phyl-
lis; pinnis lanceolat. glaberrimis, striatis.
Burm. Ind. Rumph. amb. 6. tab. 32.

In Amboina, & Java.

*Var. frondibus infimis geminis, 2-3 part. mediis
pinnis 2-angis, absque impuri; summis cum im-
puri.*

1401. OSMUNDA. Spica ramosa. Fructificat. globosæ.

* *Scapis indentibus cauli, ad basin frondis.*

g. trylanica. O. scapo caulino solitar: frondibus verticillatis,
lanceolat. indivitis. *Syst. veg. ed. 14.*

*Ophioglossum laciniatum. Rumph. amb. 6. tab.
68. f. 3.*

In Zeylona, Amboina.

Stipes pedalis nudus, in cuius apice fol. sæpe in
orbem disposita, erecta, petiolat. inter quæ
spica cylindrica, pedunculata.

g. Lunaria. O. scapo caulino solitario, fronde pinnata, so-
litaria (pinnul. flabelliformibus, lanceatis). *Syst.
veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 18. f. 1. Black tab.
420. Knorr. del. hort. 2. tab. O. 3. Zorn. ic.
pl. medic. cent. 1. tab. 65. Gard. Aix. tab.
75.*

Lunaria minor. Cam. epit. 631. 644.

y. Lunaria &c. Fl. Dan. tab. 18. f. 3.

In Europe alpinis saxosis 24.

Stipes floralis, unicus, ramosus. Pinnulæ fron-
dis utrimq. 8-9. imæ sub-3-lobæ. Spica fron-
de longior, paucifl.

g. virginica. O. scapo caulino solitar: fronde supradecomposi-
ta. *Syst. veg. ed. 14.*

*O. asphodeli &c. Plum. fl. tab. 159. Pet. fl.
tab. 9. f. 2.*

In America.

Rad. tuberculosa. Frons 1-2. ped. & semis al-

ta. A medietate 4-5. pinnæ oppositæ, sicuti pinnule. Fol. 2. pollic. longa, ad basin pollic. lata, acuminata. Ex stipite oritur peduncul. longus.

4. *ternata*. O. scapo caulino solitario; fronde 3-part. supracomposita. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 32.*

In Japonia.

Rad. fasciculata, fibrosa. Stipes pollic. inferne simplex, mox bifariam divisus, frondem idest, & scapum floriferum. Frons solitaria, petiolat. glabra. Petiolus digital. inferne ternatus, nudus; superne frondosus, 2-pinnat. Pinnæ, & pinnulæ alternæ, incisæ, tenuissime serratæ. Scapus e basi petioli frondis, erectus, fronde duplo longior, nudus, glaber, apice cernuus, floriferus. Spiculæ alternæ.

5. *phyllitidis*. O. scapis caulinis geminis: fronde pinnata: caul. lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

O. *lanceolata* &c. *Plum. fil. tab. 156.*

O. *racemifera*. *Pet. fil. tab. 8. f. 15.*

In America merid.

Frondes 7-8. bipedal. Foliol. 8-iuga, impari extremo lanceolato; acuminata, leviter serrata, ampliora 5. pollic. longa, 2. lata. Scapi ex alis inferioribus orientur, pedal. racemis terminalibus, ut in O. *vulgari*.

6. *hirta*. O. scapis caulinis geminis: fronde pinnata: caule hirta. *Syst. veg. ed. 14.*

O. *spicis geminis*. *Pet. fil. tab. 14. f. 5.*

O. *hirsuta* &c. *Plum. fil. tab. 157.*

Lonchitis &c. *Plum. amer. tab. 26.*

In Martinica.

Frondes 7-8. subped. fragiles, superne fulcatæ; pilis brevibus, fulcis hirtæ; in quorum medio fol. opposita, vel alterna, infima sescunc. longa, semunc. lata, *Lonchitis vulg.* forma, crenata, hilari viridi: utrimq. pilis albescentibus oblita, subtus nervis parvis. Peduncul. lanuginosi, racemo terminali, pyramidali, 2-pedal.

7. *hirsuta*. O. scapis caulinis geminis: fronde 2-pinn. hirsuta. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 8. f. 16. Plum. fil. tab. 162.*

Lonchitis &c. *Plum. amer. tab. 26.*

Lunaria &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 25. f. 6.*
In Amer. merid. rupibus.

Altitudo ped. Pinnæ longiores, angustiores sequenti, ad mediam utque costam non incisæ, pallide virent. Spicæ elatiores.

8. *adianthifolia*. O. scapis caulinis geminis: fronde supradecomposita. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 9. f. 1.*

O. *filicula* &c. *Plum. fil. tab. 158.*

Adiantum &c. *Plum. amer. tab. 43.*

In Dominica, Jamaica rupibus.

Refert *Asplenium Adiantum nigrum*, maior tamen, pallidius virens, asperior, & rugosior.

** *Scapis nudis, e radice enatis.*

9. *verticillata*. O. scapis radicatis: racemis verticillat. fronde supradecomposita. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 160. Pet. fil. tab. 12. f. 4.*

In Amer. merid.

Stipites plusquam 10. bipedal. canaliculati, tuberculosi. Fol. subfemied. longa. Pinnæ alternæ: pinnulæ oppositæ, aut alternæ, subrotundo-acuminatæ, impari cuspidato.

10. *cervina*. O. scapo radicato: frond. pinnata: pinnulis integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 154.*

O. *racemifera* &c. *Pet. fil. tab. 8. f. 3.*

In Amer. meridian.

Altitudo 3-ped. Fol. opposita, vel alterna, pinnis lanceolaris, *Linguae cervinae* similibus, sed basi angustatis, supra læte viridia. Peduncul. altior, racemis e castaneo-nigricantibus, nitidis, compositis.

11. *bipinnata*. O. scapo radicato: fronde pinnata: pinnis pinnatis. *Syst. veg. ed. 14.*

O. *latis* &c. *Plum. fil. tab. 155.*

In Amer. meridian.

Altitudo 7-8 ped. Frondes totæ foliosæ. Pinnul. longiuscul. angustæ, acuminatæ, e viridi-lutescent. leviter sulcatæ, crenis latis, acutis. Pedunc. altiores, racemis compositis a medio usque ad apicem, castanei col. ut in O. *vulgaris*.

12. *filiculifolia*. O. scapo radicato, paniculato: fronde supra-

decomposita. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 161.*

O. cicutæ &c. Pet. fil. tab. 9. f. 3.

In Amer. meridion.

Rad. *Polypodi*. Frondes e rad. 4-5. fibroedæ e fusco-virentes. Pinnæ alternæ, acuminatæ, pinnulis obtusis, profunde incisæ, leviter serratis, supra læte virentia, subrus dilutiora. Peduncul. eiusdem altitudinis, racemis compositis racemulis alternis, e castaneo-aurei, nitidi.

*** *Fronde ipsa fructificationes ferente.*

13. *regalis*. *O.* frondibus bipinnat: apice racemiferis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 217. Black. tab. 324. Plum. fil. tab. B. f. 4.*

Filix &c. Dod. pempt. 473. Pluk. alm. tab. 181. f. 4.

In Europa, Virginia, ad fluvios, & loca umbrorsa.

Caul. 2-cubit. apice in ramos oppositos divisus. Pinnul. oppositæ, sessiles, læceol-acuminatæ, nervosæ.

14. *claytoniana*. *O.* frondibus pinnatis; pinnis pinnatifid. apice coarctato-fructificantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

Pinnæ oppositæ. Pinnul. oppositæ, decurrentes, integerr.

**** *Frondibus aliis foliaceis; aliis fructificantibus.*

15. *capensis*. *O.* frondibus pinnatis: pinnis cordato-lanceolat. crenulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad montes cap. b. Sp-i.

Frons foliacea, plusquam pedat. stirpe paleaceo. Pinnæ sessil. ensiformes, adproximatæ, transversim striatæ, amplexicaul. læves. Scapus e fronde fructificante. Pinnulæ remotæ, alternæ, digitales, crassitie pennæ aserinae, lineares, margine revolutæ, tegentes primum fructificationem, dein discum marginibus interiectum, ut in *Acrostichis*.

16. *cinnamomea*. *O.* frondibus pinnatis; pinnis pinnatifid. scapis hirsutis: racemis oppositis, compositis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Marilandia.

Frons dodrantal. angusta. Pedunc. racemis uncial.

17. *Struthiopteris*. O. frondibus pinnatis; pinnis pinnatifidis: scapo fructificante disticho. *Syst. veg. ed. 14. Gunn. norv. 1. tab. 1. f. 1. 2. 3. Fl. Dan. tab. 169. Filicastrum &c. Ad. petr. 10. tab. 18.*

In Helvetia, Svecia &c., secus flumina montium 24.

Frons 2-cubit. & ultra. Pinnæ mediæ longissimæ.

18. *spioant*. O. frondibus lanceolat. pinnatifidis: laciniis confluentibus, parallelis, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 99.*

Lonchitis &c. Cam. epit. 665.

In Europæ montibus 24.

Fol. *Polypodii officin.* similia, ad terram reclinata, in orbem disposita, pinnis mediis maximis. Fol. floralia longiora, & strictiora, fusca. Frondes foliaceæ fructiferis breviores: fructiferæ ad basin rubentes.

19. *crispa*. O. frondibus supradecompositis (sterilibus obtusis, dentatis: floralibus ovatis, integerrimis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 496.*

Ruta &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 53. f. 2.

Adiantum &c. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 23. adultior. Bauh. hist. 3. p. 743. Pluk. alm. tab. 3. f. 2.

Filix &c. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 4. f. 4.

In Helvetia, Anglia &c., scopulosis alpium 24.

Ad Pteridis genus spectat.

Rutæ murariæ pinnis accedit. Stipites ramosi; primis pinnis, & primis pinnulis nondum foliatis, sed pinnular. pinnis, aut pinnul. secundis. Primæ pinnæ petiolat. semipinn: extremis pinnis in retusum, & rhomboideum finem confluentibus, obtuse ferratis.

20. *japonica*. O. fronde bipinnata; pinnis cordat.-lanceolat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Dsjemmai. Kæmph. aman. Fosc. V. p. 891.

In Japonia.

Frons impari 2-pinn. Pinnæ oppositæ, & alternæ basi obliquæ, sesquipollic. margine reflexo,

serrulatæ, lineatæ, glabræ, supra virid. subtus pallidæ. Frond. fructificant. distinctæ, 2-pinn. pinnæ oppositæ, & alternæ, lineari-lanceol. Simil. *O. regali*, sed differt frondibus fructificantibus distinctis.

11. *lancea*. *O.* fronde 2-pinnata; pinnis cordato-lanceol. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Frondes fructificant. distinctæ. Pinnæ suboppositæ; superiores oppositæ: pinnul. alternæ, raro suboppositæ, lanceolat. tenuissime ferratæ, utrinq. adtenuatæ, glabræ, 1-fesquipollic.

- scandens*. *O.* caul. scandente: fol. oppositis, pinnatis; pinnis suboppositis, oblong. acutis. *Aubl. Guian. Hort. mal. 12. tab. 34. Pet. gar. tab. 34. f. 9.*

In Guiana.

1401. ACROSTICUM. Fructificat. totum frondis discum tegentes.

* *Frond. simplici, indivisa.*

1. *lanecolatum*. *A.* frondibus lineari-lanceolat. acutis: furculo scandente. *Syst. veg. ed. 14.*

Tiri-pinna. Hort. mal. 18. tab. 33.

In India.

Stipes filiform. vestitus squamis imbricatis, ad instar Musci. Frond. solitar. spitham. petiolat. integerr. coriaceæ, subtus tomentosæ. Fructificat. sunt puncta confertissima versus apicem frondis.

2. *citrisolium*. *A.* frondibus lanceolat-ovatis, integerrim. furculo scandente. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. Plum. fil. tab. 116.

In Amer. meridion.

Stipes leucophæus. Fol. *Citri æmula*, alterna, crassiuscula, lævissima, luteo-virescentia, venosa, petiolis carinatis.

3. *heterophyllum*. *A.* frondibus integerrim. glabris, petiolatis; sterilibus subrotundis; fertilibus linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Amæn. acad. tab. 2.*

Filix &c. Pet. gar. 3. tab. 33. f. 12.

Maletta &c. Hort. mal. 12. tab. 29.

In Malabar, Africa &c.

Frond. breviter petiolatæ, aveniæ.

4. *crinitum*. A. frondibus ovatis, obtusis, hirsutis, supra crinitis. *Syst. veg. ed. 14.*
Phyllis &c. Pet. fil. tab. 13. f. 14.
Habitat
 Frons latissima.
5. *punctatum*. A. frondibus cordato-lingulatis, acuminat. integerrim. supra punctatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In China.
Simillim. A. scolopendrio facie, statura, figura, magnitudine, consistentia. Frondium pagina superior nuda, adspersa punctis raris, minimis; inferior vero punctis feminalibus, confertis, luteis. Stipes nudus, sub 4 angular. *Chinensis officinalis.*
6. *spicatum*. A. fronde simplici, petiolato-lanceolata, utrimq. adtenuata, integerrima: spica terminali, lineari. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In loco dicto Isle de France.
 Frond. radicales, venosæ, glaberrimæ. Spica quasi fol. & fronde formata, recta, digiti longitudine, fronde angustior, latere anteriore fructificationis, pulverulenta, purpurea, postice plana, nudis, glaberrima.
7. *lingua*. A. frondibus oblongis, obtusis, integris, petiolatis: surculo repente. *Syst. veg. ed. 14.*
Thumb. Jap. tab. 23.
Iwangsjuwa. Kämpf. aman. Fasc. V. p. 891.
In Japonta.
 Rad. repens, ferruginea, imbricato-squamosa. Stipes erectus, pollic-digital. trigonus, villosus. Frons digital. supra viridis, glabra, subtus ferruginea, villosa. *Differt ab A. punctato, fronde oblonga, nec cordata, crassa, fere coracea, obtusa, nec acuminata. Ab A. citrifolio. surculo repente; fronde min. & coriacea.*
8. *hastatum*. A. fronde simplici, hastata. *Syst. veg. ed. 14.*
Thumb. Jap. tab. 34.
In Japonta.
 Rad. repens, crassa, fibrosa. Stipites pl. palm. ante excrecentiam circinnales, adscendentes, 4-goni, sæpe flexuosi, ferrugineo tomentosi. Frons erecta, plana, marginibus involutis, supra nuda, virescens, subrus tomentosa, cinerea: lobus medius digital. lanceolatus; laterales duplo breviores, ovati.

** *Fronde simplici, divisa.*

9. *septentrionale*. A. frondibus linearibus, laciniatis, nudis.

Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 60.

Holosteum &c. *Tabern.* 736.

Filix &c. *Lob. ic.* 47.

In Europæ fissuris rupium 24.

Cespites conferti. Stipes sæpe curvus, sursum latefcens, bis b furcatus.

10. *australe*. A. stipitibus nudis, glaberrimis, apice dichotomo-ramosis, 5 h-radiatis, subulatis, laterifloris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In loco dicto i.e. de France, & Bourbon.

Simil. priori magnitudine, & figura, sed hoc quasi argenteum, magis detrimatè divisum, & margine interiore longitudinaliter fissi, fructificatione purpureis.

11. *pedinatum*. A. nudum, simplicissimum: spica adscendente, lunata, secunda. *Syst. veg. ed. 14. Aman. acad. f. 4.*

Juncus &c. *Pluk. alm. tab. 95. f. 7. Moris. hist. 3. f. 8 tab. 9. f. 50.*

In Æthiopia.

Stipes ped. erectus, triangular. Frons spiciform. superiore margine convexo, inferiore concavo, pinnato-pedinata, pinnis linearibus, sub 16. parallelis, approximatis, integerrimis, glabris, latere interiore rectis lana, & fructificationibus.

12. *dichotomum*. A. nudum, dichotomum: spicis adscendentibus, secundis, reflexis, compressis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Pet. gaz. tab. 70. f. 12.*

In China.

Refert priorem caul. & spica: at caulis est pluries dichotomus totidem spicis. Fol. pollic. linearia, dichotoma.

13. *digitatum*. A. stipitibus nudis, triquetris: fronde digitata, lineari, integerr. æquali. *Syst. veg. ed. 14. Aman. acad. tab. 4. f. 1.*

In Zeylona.

Sine fructificatione Fucum refert. Frondes plurimæ in fasciculum enatæ, stipite pedali, lineari. Foliol. 9.

14. *ferrugineum*. A. frondibus pinnatifidis: pinnis linearibus, acutis, patentibus, integerrim. connatis: stipite lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

Filicis &c. *Pluk. phyt. 89. f. 9.*

In America.

Pinnæ raro 10-12. ped. excedunt.

15. *polypodioides*. A. frondibus pinnatifid. pinnis linearibus, obtusis, integerrim. patentibus, connatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Polypodium &c. *Morif. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 5.*

Filix &c. *Pluk. alm. tab. 289. f. 1.*

In Virginia, Jamaica.

Facies Polypodii offic. Frondes alternæ, oblong. alternatim pinnato-sinuatæ, subtus cineræ, lobis oblong. obtusis, integerrim.

*** *Fronda pinnata.*

16. *aureum*. A. fronde pinnata; pinnis (plerumq.) alternis, linguiformibus, obtusiusculis, integerr. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 8. f. 5.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 104.*

Filix &c. *Plum. amer. tab. 7. Pluk. alm. tab. 288. f. 2.*

In Jamaica, Dominicae humensibus.

Stipites 9 ped. rubro-nigricant. nitidi, glabri.

Pinnul. sub 20. f. squiped. subpetiol. 2-pollic.

latæ, obtusæ, sed brevi veluti mucrone acuminatæ, membranac. firmulæ, crassiuscul. læves, venosæ, pulchre virentes.

17. *rufum*. A. frondibus pinnatis; pinnis oblong-ovatis, integerrim. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Stoan. Jam. hist. 1. tab. 45. f. 1.*

In America.

Pinnul. breviter petiolat. sinuatæ, supra virides, subtus lana fulva obitæ.

18. *punctatum*. A. fronde pinnata, pinnis alternis, lanceolat. integerrim: infimis auricularis; supremis decurrentibus, supra punctatis, glabris. *Syst. v. g. ed. 14. Lin. Suppl.*

In loco dicto Isle de Bourbon.

Simile priori; at pinnul. longiores, utrimq. adscissæ, nudæ, punctatæ.

19. *forbifolium*, A. frondibus pinnat. pinnis oblong-ovat. acutis, integris, serratis: stipulibus squamosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lonchitis &c. *Pet. fil. tab. 9. f. 8.*
Filix &c. *Plum. amer. tab. 12. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 38. Pluk. alm. tab. 286. f. 3.*
In Jamaica, Domingo.
 Stipites scandentes, sature rufi. Rami pedal. e viridi-canefcent. Pinnul. 14 15-iug. membranac. firmæ, supra læves, subtus veluti rugosæ, utrimq. sature virides.
20. *areolatum*, A. frondibus pinnat. pinnis alternis, linearibus, apice serratis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia, Marylandia.
 Areolæ fructificantes nervo longitudinali fol. distinguatur in 2. phalanges: & transversim quoque ad singulum latus disponuntur in pl. partes.
21. *marginatum*, A. frondibus pinnatis; pinnis oblong. acuminatis, undulatis, integerrimis: stipite nudo. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 40.*
In Jamaica.
 Frons erecta. Pinnul. angustæ.
22. *sandum*, A. frondibus pinnatis, lanceolat: pinnis linearilanceolat. inciso-serratis; ferraturis infimis maioribus. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Pluk. alm. tab. 281.*
Filicula &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 47. f. 2.*
In Jamaica.
 Frons minima, erecta. Pinnul. raræ.
23. *platyneuros*, A. frondibus pinnatis; pinnis alternis, ovatis, crenatis, sessilibus, sursum arcuatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Pluk. alm. tab. 289. f. 2.*
Polypodium &c. *Morif. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 5.*
In Virginia.
 Facies *Polypodii officinal.* Stipites palmares, & ultra, nudi, alterni. Pinnul. subtus albo pulvere ferrugineo.
24. *trifoliatum*, A. frondibus pinnatis: pinnis ternatis, linearilanceolat. (subsessilibus) intermedio longiore. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. *Stoan. Jam. hist. 1. tab. 45. f. 2.*

Pet. fil. tab. 8. f. 9.

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 144.*

In Jamaica.

Planta ped. & altior, stipite rufo-nigricante. Frondes oblongæ, alternatim pinnatæ. Pinnul. superior. binæ; summæ folitariae, subtus polline aureo obductæ.

*** *Fronde subbipinnata.*

25. *filiquifum*. A. frondibus pinnatis; pinnis alternis, sursum pinnulatis, linearibus; inferioribus 2-part.

Syst. veg. ed. 14. Aman. acad. f. 3.

Millefolium &c. *Rumph. amb. 6. tab. 74. f. 1.*

Planta &c. *Pluk. alm. tab. 215. f. 3.*

In Zeylona aquis.

Stipites pl. ex una rad. Fol. *Peucedani*. Siliquæ in pl. ramulos foliatis diffusæ.

26. *Thalictroides*. A. frondibus pinnatis; pinnis alternis, utrinq. pinnatind. sterilibus latioribus; (fructiferis angustis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Zeyl. tab. 4.*

In Zeylona aquis.

Morines herbacea. Fol. *Thalictri*. Margo reflexus folior. tegit fructificationem.

27. *Maranta*. A. frondibus subbipinnatis, pinnis opposito-coadunatis, subtus hirsutissim. basi subdentatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lonchitis &c. *Barr. ic. 858. 857. Cam. epit. 666.*

Filicula &c. *Pluk. alm. tab. 281. f. 4.*

In Europa australi.

Stipites spithim. atro-purpur. Frons lanceol. subtus squamis croceis. Foliol. fere pinnata. Pinnul. ut in *Ceterach* ovatae, obtusæ, integerrimæ, crassæ.

28. *ilvense*. A. frondibus subbipinnat. pinnis opposito-coadunatis, obtusis, subtus hirsutis. basi integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 391.*

Polypodium &c. *Pluk. alm. tab. 89. f. 5.*

Filicula &c. *Morif. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 23.*

In Europa frigidissima rupibus.

Valde adhuc priori, at vix digito longius, nec spumam. stipite virescente, nec atropurpur. Proximum Polypodio ob puncta fructificationis, sed valde conferta.

29. *ebe-*

29. *ebenum*. A. frondibus pinnatis; pinnis sessilibus, oblongis
sinuatis; summis brevissimis, integerrimis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Filix &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 57. f. 1.*

In Jamaica sepibus humidiusculis.

Stipites atro-rubentes, nitidi, trianguli. Frondes
1-2-ped. Pinnul. alternæ, supra virid. subtus
niveæ.

30. *furcatum*. A. dichotomum; foliolis pinnatis; pinnis lanceo-
latis, parallelis, approximatis, integerrimis.
Syst. veg. ed. 14.

Filix &c. *Plum. amer. tab. 20. fl. tab. 28. Pet.*
fil. tab. 5. f. 4.

In Jamaica.

Stipites 2-3. subnigri, 2-pedal. leviter squamosi,
in 2. ramos divaricati, & iterum dividuntur
in 2. alteros longiores: hi pariter in alios
bimos 6-ped. bifurcantur, sed minus distantes.
Præter hos ad summum cuiuslibet stipitis, circa
medietatem alii 2. erascuntur sibi invicem op-
positi, qui pariter in alios ramos dividuntur
ut priores. Flor. dum raro reperitur.

***** Fronde bipinnata.

31. *aculeatum*. A. frondibus supradecompositis: pinnis 2-fid. sti-
pitibus aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 61.*

In Jamaica.

Pinnul. rotundatæ, profunde laciniatæ.

32. *cruciatum*. A. frondibus bipinnat. foliol. oppositis, lanceo-
latis; infimis cruciatim appendiculatis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Filix &c. *Plum. amer. tab. 29. f. B. fil. tab. 38.*

Adiantum &c. *Pet. fil. tab. 9. f. 10.*

In Amer. merid.

Stipes flavescens, lævis. Pinnulæ obtuse dent.
fessiles; infimæ breviores.

33. *barbarum*. A. frondibus bipinnatis; foliol. oppositis; pinnu-
lis lanceolatis, obtusis, serratis, sessilibus, al-
ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Pluk. alm. tab. 181. f. 5.*

In Africa.

Stipites 2-3-ped. erecti, glabri.

34. *calomela-* A. frondibus bipinnat. pinnis alternis, lanceola-
nos. tis, acuminatis, pinnatifidis. *Syst. veg. ed. 14.*

Tom. VI.

G

Filix &c. *Sloan. Jam. hist.* 1. tab. 30. f. 2. *Plum. fil. tab.* 40. *Pet. fil. tab.* 9. f. 11.

Asiantum &c. *Plum. am. tab.* 44.

In Amer. merid.

Stipes 1-2 ped. ramulis oppositis, ater, nitens. Frondes subtus niveæ.

35. *viviparum*. A. frondibus bipinnatis, viviparis: pinnis binatis, unilateralibus: pinnul. pinnatifid. furcatis, subulatis; margine interiore fructificantibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*

In loco dicto Isle de France, & Bourbon.

Frons ovato-oblonga, stipite angulato. Pinnulæ supremæ simpliciss. subulatæ. Fructificatio erumpit e margine interiori lacinarum, per maculam oblong. quæ tandem dilatatur per superficiem.

- longifolium*. A. frondibus lanceolat. obtusiuscul. integerrimis: furculo reptante. *Burm. Ind. Pet. gar. tab.* 61. f. 2-4.

In Java.

Simil. A. steruoso.

- filare*. A. fronde 2-pinnat. stipite piloso; pinnis alternis; primariis remotis; pinnatis; secundariis erectis, confluentibus, linearibus, apice undidentatis. *Forst. Æg.*

In Arabia.

Frons ped. Rachis pilis puniceis. Pinnæ primariæ sesquipollic. lanceol. patentes, penulatæ. Secundariæ semipollic. lineari-concertæ, dentibus filiformibus: inferiores interdum divisæ in lobos parallelos, lineares, inæquales.

1403. *PTERIS*. Fructificatio in lineis marginalibus.

* *Frondibus simplicissimis.*

1. *pilosella-ides*. P. frondibus sterilibus, obovatis: fertilibus lanceolatis, longioribus: furculis repentibus. *Syst. veg. ed.* 14.

In India orient.

Stipites filiform. hispidi. Frond. petiolat. integerrimæ: fertiles duplo longiores. *Affinis A-crostico heterophyllo; sed frond. ovales, magis oblong.*

2. *lanceolata*. P. frondibus simplicibus, lanceolatis, subangula-

tis, glabris: apice fructificante. *Syst. veg. ed.*

14.

Lingua &c. *Plum. amer. tab. 40. fil. tab. 132.*

Pet. fil. tab. 6. f. 5.

In Domingo.

Rad. *Polypodii*. Planta pedal. Stipites 7-8. ex eadem radice, breves: Frondes angustæ, acutæ, ad oras summitatum pulverulentæ, costa nigra.

3. *lineata*. P. frondibus simplicibus, linearibus, integerrim. longitudinaliter fructificantibus. *Syst. veg. ed.*

14.

Lingua &c. *Plum. amer. tab. 41. fil. tab. 143.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 14. f. 3.*

In Domingo.

Frond. longiss. 3-pedal. oris inflexis, apicibus acuminatis.

4. *triseupida-* P. frondibus simplicibus, linearibus: apice 3-fido.
ta. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 140.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 10. f. 6.*

In Domingo.

Frond. ex eadem radice 7-8, subpedal. inferior angustiss. dein pollicem latæ.

5. *fureata*. P. frondibus simplicibus, dichotomis, subtus hispidis; apicibus fructificantibus. *Syst. veg. ed.*

14.

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 141.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 6. f. 6.*

In Amer. merid.

Frond. ex eadem radice 10-12 subpedal. pollic. (ubi latissimæ) latæ, membrana tenui contextæ, supra pulchre virent. subtus diluiores; stipite nigro, nudo. Ad 3. am frondis altitudinem dividitur ac dein subdividitur.

6. *quadrifolia-* P. fronde quaternata, subrotunda, integerr. sur-
ta. culis repentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix. *Pluk. phyt. 401. f. 5.*

In Amer. merid.

** *Frondibus simpliciter pinnatis, seu compositis.*

7. *arboresc.* P. frondibus pinnatis; foliol. pinnatifid. caudice arboresco, aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat . . .

G ij.

8. *grandifolia*. P. frondibus pinnat. pinnis oppositis, ovato-lanceol. acuminatis, integerrim. *Syst. veg. ed. 14.*
Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 6. f. 15.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 106.*

Filix &c. *Plum. amer. tab. 8.*

In Dominica, Martinica uliginosis.

Planta 5-ped. Stipites canaliculati, subnigri.
Pinnæ magnæ, 2-ped. 3-pollic. latæ, margine membranac. albido, veluti undulato, e viridiluteo col. venulis reticulatæ, nervo longitudinali.

9. *nervosa*. P. frondibus pinnatis; pinnis lanceolat. parallelonervosis, integris; infimis binatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Stipes angulatus, sulcatus, glaber, sesquipedal.
Frons tota glabra. Pinnæ digitales.

10. *longifolia*. P. frondibus pinnat. pinnis (longissimis) linearibus, repandis, basi cordatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lonchitis &c. *Pet. fil. tab. 6. f. 12. Plum. fil. tab. 69.*

- Filix &c. *Plum. amer. tab. 18. Pluk. phyt. tab. 402. f. 1.*

In Dominica sylvis iuxta rivulos.

- Planta 4-5-ped. Stipites ex eadem radice 9-10-fusci. Pinnæ adproximatæ, oppositæ, subsemped. 3-4. unc. latæ, pallidæ virentes, nervo medio excurrente, apice acutissimo.

11. *vittata*. P. frondibus pinnatis; pinnis linearibus, rectis, basi rotundatis. *Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. 4.*

Lonchitis &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 34.*

Filix &c. *Pet. ger. tab. 63. f. 10.*

In China, Jamaica.

Planta odorata, pinnis longis. *Similis prior.*

12. *stipularis*. P. frondibus pinnatis; pinnis linearibus, sessilibus & stipul. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Plum. amer. tab. 19. fil. tab. 70. Pet. fil. tab. 12. f. 1.*

In Amer. merid.

Simillima P. longifolia, sed pinnulæ angustiores.

13. *trichomanoides*. P. frondibus pinnatis; pinnis subovatis, obtusis, repandis, subtus hirtutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Trichomanes &c. *Plum. fil. tab. 75. Pet. fil. tab. 9. f. 16. Sloan. Jam. hysl. 1. tab. 35. f. 1.*

Filix &c. *Pluk. alm. tab. 281. f. 4.*

In Jamaica, Dominica rupibus.

Stipites pl. nigri, pedat. 6-pollic. pilis breviss. rufescentibus. Pinnulae alternæ, fere contiguæ, 15. unc. circiter longæ, ac latæ, supra læves, læte virentes, nitidæ.

14. *crucica.* P. frondibus pinnat. pinnis oppositis, lanceolat. ferrulatis, basi angustatis; infimis sub 3-partit. *Syst. veg. ed. 14.*

P. *semiserrata*, Forsk. *Æg. moneta Vahl.*

Phyllitis &c. *Alp. exot. tab. 66.*

Lingua &c. *Tourn. inst. tab. 321.*

Filix &c. *Moriz. hist. 3. f. 14. tab. 1. f. 16.*

In Creta, Ilva insula.

Pinnul. supremæ connato-subdecurrentes; infimæ petiolat.

*** *Frondibus subbipinnat. seu ramosis.*

15. *pedata.* P. frondibus quinqueangulis, trifoliatis; pinnis pinnatifid. lateralibus 2-partit. *Syst. veg. ed. 14.*

P. *argentea*. *Ad. petrop. 12. tab. 12. f. 2.*

Hemionitis &c. *Plum. amer. tab. 24. fil. tab. 152.*

Filix &c. *Pet. fil. tab. 8. f. 12. Pluk. alm. tab. 285. f. 5.*

In Jamaica, Dominica, Sibiria rupibus.

Stipites 7-8. diversæ magnitudinis, recti, nigri, nitidi. Frond. diversæ ad instar *Geranii robertiani*, supra glabræ, læte virides; subtus nervis nigris, & lucitis.

Planta Sibirica minor, & subtus nivea, margine ferrugineo.

16. *fructa.* P. frondibus bipinnatifid. pinnulis, sinubusque rotundat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Frons erecta, f-squiped. debilis. Pinnæ vix digital. alternæ, parentes: lacinie suboppositæ, integræ, undulatæ, nervosæ, glabræ.

17. *aquilina.* P. frondibus lupradecompositis; foliol. pinnatis; pinnis lanceolatis; infimis pinnatifid. superiori-bus minoribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Plum. Amer. tab. A. f. 1.*

Filix fœmina. Black. tab. 325. Matth. 291. Fusch. hist. 596. Com. epit. 992.

In Europæ sylvis, præsertim caduis, & pascuis sterilibus 24.

Rad. incisa Crucem refert, quam alii pro *Aquila bicipiti* tenent. Stipites usque 5-ped. glabri, rigidi. Fronds grandes. Pinnulæ sessiles, acuminatæ, obiter crenatæ, nervulis villosis, quæ denuo pillulas foliaceas producunt, obtusas, integerrimas, nervosas. *Var. pinnulis inferioribus sinuatis*.

18. *caudata*. P. frondibus supradecompositis; pinnis linearibus, infimis basi pinnato-dent. (seu auriculatis) terminalibus longissimis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Plum. amer. tab. 22. fil. tab. 29. Pet. fil. tab. 3. f. 12.*

- b. *Filix* &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 63.*

In Jamaica, Dominica saxosis.

Amptior, & ramosior priore. Stipites pl. variae magnitudinis, col. castaneo-rufi. Pinnæ: ma: pedal. suboppositæ. Pinnul. alternæ, rorismarinifol. supra viridi-albicantes, subtus exiguis nervulis transversis corrugatæ.

19. *mutilata*. P. frondibus decompositis; foliol. pinnatis; infimis semipinnatifid., terminalibus, baseosq: longissimis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lonchitis &c. *Plum. amer. tab. 30. f. 51. Pet. fil. tab. 3. f. 10.*

In Jamaica, Dominica.

Planta subped. Frons 2 pinn. Fol. lateralibus infima longiora ad basin: latere tantum inferiore pinnata.

20. *atro-pur-purta*. P. frondibus decompositis, pinnatis; pinnis lanceolatis; terminalibus longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

Stipes sp. thamn. atropurpur. nitidus. Frons pinnata; pinnis lato margine revolutis: quo magis inferius, eo petiolat. inferioribus petiolis uno, alterove pari pinnarum minorum, sellilium auctis.

21. *bisaurita*. P. frondibus pinnatis; pinnis pinnatifid: infima bipartita. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Plum. amer. tab. 14. fil. tab. 15. Pluk. phyt. 401. f. 1. Pet. fil. tab. 3. f. 11.*

In Domingo &c.

Planta 2-ped. Stipit. 5-6. luridi, aut pallide albentes. Pinn. 8-9-iugæ, e viridi pallentes, sub 10-pollic. longæ, acumin.

22. *semipinnata*. P. frondibus sub 2-pinnat. foliol. lateralibus, loboq. infuao semipinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Ob. it. tab. 3. f. 1.*

In China.

Stipes lævis. Frondes lanceol. Pinnul. remotæ, oppositæ, pinnatifid. apicibus terminalibus elongatis: margo pinnular. terram spectans sæpius, & unice pinnatifid. non vero superior; hinc quasi semipinn. Infima demum lacinia pinnarum cæteris longior est, & similiter semipinnatifida; reliquis omnibus integris, obtusis.

23. *ferrulata*. P. frondibus semibipinnatis, linearibus, ferrulatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. phyt. tab. 398. f. 6.*

In China.

Stipes spitham. semiteres, lævis, viridis, inferne purpurascens. Fol. opposita, decurrentia. Foliol. infima inæqualiter 5 part. pianis ensiformibus, una, alterave elongata. Proxima similia decurrentia, sed 3-part. Tertiar., quartar., coniugationis simplicia, paulo minora. Foliolum ultimum pinna impar, longior, ultimis unita. Pinnæ steriles tenuissime serratæ; fertiles vix crenatæ.

- lunulata*. P. fronde pinnata, pinnulis alternis, petiolatis, lunulatis, striatis. *Retz. Obs. fasc. 2. tab. IV. In Bengala.*

Frons simplex, pedal. & ultra. Stipes compressus, nitidus. Pinnæ virides, læves, striis a petiolo ad marginem radiantibus. Margo exterior fructificans, fere semicircularis: interior sterilis, vix curvus. Supremæ vero pinnæ securiformes sunt, & terminalis trigona.

Forma huius exacte convenit cum *Adiantum lunulato* Burm. Ind. præter marginem 5-flor. Verum quandoq. margo finditur in 3-pl. lacinias: sicq. *Adiantum* refert genuina *Fteridis* sp.

G iv

- obliqua*. P. fronde pinnata; pinnis lineari-lanceolat. erectis, integris, basi obliquis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Frons cubitalis: pinnæ alternæ, infimæ maximæ, spithameæ, angustæ, acuminatæ, basi liberæ.
- subciliata*. P. fronde pinnata, pinnis lanceolat. vix serrulato-ciliatis, basi supra latioribus. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Frons pedâl: Pinnæ 3-pollic. oppositæ, basi vix unguem latæ, superne latiores.
- ensiformis*. P. fronde pinnata; pinnis superioribus ensiformibus, subintegerrimis; inferioribus oppositis, ovatis, auriculatis, serratis. *Burm. Ind. Fl. Zool. tab. 87.*
In Zeylona, & Java.
- viridis*. P. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Frondis primæ pinnæ distinctæ; 1-3-supremæ connatæ, integræ; supremæ lanceol. simplices, alternæ, sessiles, dente laterali ad basin. Inferiores sensim longius petiolatæ, magis oppositæ, primum pinnatifidæ, dein pinnatæ, impari-3-iugæ, sessil. oval. a rachi obliquæ, striatæ, terminales. Rachis mar. & min. atropurpur. at pinnæ omnes virid.
- dentata*. P. pinnis primis sessilibus, remotis, decursive pinnatis; pinnis oppositis, linearibus, crenato-dentatis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Frons sesquipollic. Pinnæ magnæ, inferne oppositæ, 3-pollic. Pinnulæ alicula connexæ, obtuse dentat.
- farinosa*. P. pinnis primariis sessilibus, oppositis; supremis concatenatis, inferioribus remotis: secundariis connatis, subtus farinoso-tomentosis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Frons pedâl. Pinnæ omnes oppositæ. Primariæ superiores cum opposita connatæ, & cum proximis concatenatæ, margine solum crenulato-dent. Inferiores sensim remotæ, usque ad 2. pollic. spatium pinnatæ. Secundariæ connatæ cum opposita; & concatenatæ cum proximis: in infimis maximis pinnis interdum per paria

remotæ; exteriores min. omnes obtuse crenato-dent.

- regularis*. P. fronde supradecomposita; pinnis primariis sessilibus; secundariis connatis, lineari-lanceol. integris, patentibus; infimis pinnatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Frondes sesquiped. Pinnæ lineari-lanceol. sensim adtenuatæ; pinnulæ infimæ basi pinnatifid. & totæ pinnatæ, pinnulis in se connexis, & cum proximis.

- decursiva*. P. fronde supradecomposita; pinnis secundariis erecto-recurvis, decurrentibus; infimis decursive pinnatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Frons cubital. Pinnæ secundariæ non patentes, sed in frondis plano sursum spectantes, apice in eodem plano recurvæ; omnes subalternæ, concatenatæ, tota basi rachi adnatæ: superne basis perpendicul. rachi; inferne forma alæ cuneatæ decurrit ad pinnulam proximam. Pinnul. infimæ decursive pinnatæ.

- ferrulata Forsk.* P. fronde supradecomposita; pinnis secundariis concatenatis, lanceolat. ferrulatis; infimis seiunctis, pinnatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Frons 2-ped. Pinnæ supremæ simplic. concatenatæ; reliquæ remotæ, superior. alternæ, pinnatæ; inferior. oppositæ, basi 2-pinn. Pinnul. longe lanceol. ferrulatæ, patentes, cum oppositis, & proximis connatæ; infimæ seiunctæ, pinnatæ. *Differt a cæteris foliol. ferrulatis, acutis.*

- quadripinnata*. P. fronde 4-pinn. pinnis secundariis basi liberis; infimis 2-pinnatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Pinnul. secundariæ patentes, oppositæ, ferrulatæ, non connatæ, sed remotæ, uno puncto rachi adnatæ: infimæ basi 2-pinn.

1404. BLECH-*Frustrific.* in lineis duabus, collæ frondis ad-
NUM: proximatis, parallelis.

1. *occidentale*. B. frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis, (plerumq.) oppositis, basi emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lonchitis &c. *Pet. fil. tab. 3. f. 9. Morif. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 16. Plum. amer. tab. 29. f. B.*

Felix &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 44. f. 2. In Amer. merid.*

Stip. 1-fesquiped. pallidus. Pinnulæ plurimæ; infimæ 2. breviores, quam propinquæ, quæ sensim minuantur excepto impari longiss. Ad costam pinnarum linea angustâ, pulverulenta, ferrugineâ.

3. *orientalis*. B. frondibus pinnatis; pinnis linearibus, alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China.

Frons 3-pedal. Stipite basi antice fœtis griseis magnis vestito; latus anterius stipitis sulcis 3. longitudinaliter excavatum. Pinnæ lineari lanceol. sessil. integerr. glabræ, ad angulum acutum strætæ, digiti longitudine.

3. *australe*. B. frondibus pinnatis: pinnis subsessilibus, cordato-lanceol. integerrimis; infimis oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Stipit. pedal. virides. Pinnæ margine scabræ. Steriles latiores, basi subtruncatæ. Fertiles lanceol. basi cordatæ.

4. *virginicum*. B. frondibus pinnatis: pinnis multifidis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

Statura *Polypodii Filic. maris*. Pinnæ lanceol. sessiles, læves, acutæ, laciniis obtusis, integerrimis.

5. *japonicum*. B. fronde bipinnatifid. pinnulis ovatis, obtusis, ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 35.*

In Japonia.

Inter Filices maiores. Stipes sa. foraceus. Pinnæ glaberrimæ.

6. *radicans*. B. frondibus bipinnatis; pinnis lanceolat. crenulatis: lineolis fructificantibus interruptis. *Syst. veg. ed. 14.*

Felix &c. *Pluk. alm. tab. 179 f. 2.*

In Virginia, & Madagascariæ rupium profundis, argillaceis.

Frons infra apicem radicans: pinnæ sessiles, basi

subconcurrent, tenuissima callositate serratæ, acuminatæ, subtus magis venosæ.

indicum. B. frondibus pinnatis; pinnis alternis, lanceolat-serratis, basi auriculatis. *Burm. Ind.*

In Java.

Differt a B. occidentali, pinnis alternis, brevioribus, inferne auriculatis, superne serratis.

1405. HEMIONITIS. Fructific. in lineis decussatis disci.

1. *lanceolata*. H. frondibus lanceolatis, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. Pet. fil. tab. 6. f. 4.

Lingua &c. Plum. fil. tab. 127. f. 4.

In America meridion.

Frondes pl. e radice erumpunt, variæ magnitudinis, 2. pollic-semipedal. subtus nervosæ: at furculus æque altus est, villis rufis oblitus.

2. *parostica*. H. frondibus ovatis, acuminatis, furculis paleaceis, repentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica.

3. *palmata*. H. frondibus palmatis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Plum. amer. tab. 33. fil. tab. 151. Morif. h. f.

3. f. 14. tab. 1. f. 5.

Filix &c. Pet. fil. tab. 8. f. 11. Pluk. alm. tab. 291. f. 4.

In America meridion.

Ex radice 9-10. frondes exeunt, partim sursum rectæ, partim humifusæ, quæ stipitibus brevioribus: illæ maioribus, rubicundis, & villosis. Frondes palmæ manum amplitudinem vix superant, lobis acuminatis, & rotunde crenatis, supra glabræ, & satore virides, subtus nervis rubris. E sinu loborum quandoq. aliud fol. erumpit.

4. *japonica*. H. frondibus (inferne) bipinnatis: pinnis lanceolatis, integris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Frons tota glabra, stipite sulcato, superne pinnata. Pinnæ, & pinnulæ supra virid. subtus pallidæ.

1406. LONCHITIS. Fructific. in lineolis sub frondis sinubus.

1. *hirsuta*. L. frondibus pinnatifidis, obtusis, integerrimis: furculis ramosis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Plum. fil. tab. 20.*

Adiantum &c. *Pet. fil. tab. 4. f. 5.*

In Amer. merid.

Tota planta villosiss. albo-virens. Rad. *Polypodii vulg.* Stipit. 5-6. ex radice, prælongi, alterni, subflexuosi. Pinnæ alternæ, acuminatæ, 4-5. pollic. longæ, 2. latæ. Pinnul. semipollic. latæ.

2. *aurita.* L. frondibus pinnatis; pinnis infimis bipartitis: surculis indivisis, aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Plum. fil. tab. 17. Pet. fil. tab. 4. f. 4.*

In Amer. merid.

Stipites 5-6. ex radice exeunt, sesquiped. luride virentes, nitidi, spinulis nigris obsiti. Pinnæ oppositæ, pulchre virentes, acuminatæ. Pinnul. amplæ; rotundæ, undulatæ, profunde incisæ, denticulatæ. Pinnæ, saltem inferiores, pedales.

3. *repens.* L. frondibus pinnatis; pinnis alternis, sinuatis: surculis ramosis, aculeatis, repentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Plum. fil. tab. 12. Pet. fil. tab. 4. f. 6.*

In Amer. merid.

Rad. longâ. Stipites 5-6. longiss. spinulis brevibus, nigris, acutis obsiti. Rami etiam longissimi, alterni, spinosi. Pinnæ, & pinnul. alternæ, 6-pollic. longæ, 2. ad basin latæ, acuminatæ, obscure virides.

4. *pedata.* L. frondibus pedatis; pinnis pinnatifid. ferrulatis. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 1. f. 1. 2.*

In Jamaica.

- bipinnata.* L. fronde bipinnata, rachi supra bifurcata; pinnis alternis: pinnulis linearibus, confluentibus; interioribus emarginatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Frons ped. viridis. Pinnæ sesquipollic. patentes, basi pinnatæ, exterius pinnatifid. Pinnulæ lineares, erecto-patentes; interiores magis basi remotæ, apice emarginatæ, quandoq. bilobæ.

1407. ASPLENIUM. Frutic. in lineol. disci frondis sparsus.

* *Fronde simplici.*

1. *rhizophyllum*. A. frondibus cordato-ensiformibus, indivisis: apice filiformi, radicante. *Syst. veg. ed. 14.*
Phyllitis &c. *Pluk. alm. tab. 103. f. 3. Sloan. J.m. hist. 1. tab. 26. f. 1. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 1. f. 14.*
In Jamaica, Virginia &c.
Frondes dodrantal. angustæ.
2. *Hemionitis*. A. frondibus simplicibus, cordat-hastatis, 5-lobis, integerrimis: stipitibus lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Hemionitis vera, Clus. hist. 2. p. 214.
In Italia, Hispania.
Fol. inferius auriculata. Valde adnæ sequenti: at diameter frondis longitudinalis vix superat transversalem.
3. *scolopendrium*. A. frondibus simplicibus, cordato-lingulatis: integerr. (undulatis): stipitibus hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Zorn. ic. plant. medic. 1. tab. 47.*
Lingua &c. Black. tab. 138. Plum. fil. tab. A. f. 4. Kaorr. d. l. 2. tab. L. 8.
Phyllitis, Michx. 831. epit. 579.
P. crispæ. Bauh. hist. 3. p. 757.
P. maximæ &c. Pluk. phyt. 243. f. 1.
Lingua &c. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 1. f. 9.
P. fol. multifido: Pluk. ph. t. 248. f. 2.
In Europæ umbrosis humidis, saxosis ad montium radices 24.
Fol. ped. longe petiolat. glabra, basi inflexa, firmitate coriacea.
4. *nidus*. A. frondibus simplicibus, lanceolatis, integerr. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Phyllitis &c. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 1. f. 15.
Scolopendria &c. Breyn. cent. tab. 99.
In Javæ summis arboribus.
Fol. bipedal. latitudine spitham. robusta, & consistentia, glabra, ad angulum acutum striata. Radix insidet summis arboribus. Fol. in orbem posita ad instar umbellæ, in cuius centro aves, plerumq. nidos conficiunt.
5. *ferratum*. A. frondibus simplicibus, lanceolatis, ferratis, subfessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. amer. tab. 39. fil. tab. 124.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 6. f. 7.*

In Amer. calidiore.

Smil. A. scolopendrio, sed frondes longiores, latiores, in acumen desinentes, longitudine 2-3-ped. latitud. 3-pollic. supra glabra, dilute, sed pulchre virentes, subtus nervosæ.

6. *plantagineum.* A. frondibus simplicibus, ovato-lanceolat. subcrenatis; stipite tetragono. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica.

7. *lanceum.* A. fronde simplici, elliptica, integra, glabra: stipite tereti, squamoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Stipes digital. flexuoso-decumbens. Frons vix spitham. Differt. ab *A. scolopendrio*, fronde lanceol. nec cordata.

8. *bifolium.* A. frondibus binatis; foliol. lanceolat. subsinuatis, connatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 133.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 13. f. 11.*

In Amer. meridion.

Quælibet frons simil. *A. scolopendrio*, margine excepto, crenis latis, & fere rotundis; undulato, & sinuato.

** *Fronde pinnatifida.*

9. *Ceterack.* A. frondibus pinnatifidis; lobis alternis, confluentibus, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 216. Morf. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 1. Plum. fil. XXXIII. tab. B. f. 3. Barr. ic. 1043. 1044. 1051. 604. & forte 605. Bauh. hist. 3. p. 479.*

Asplenio. Matth.

In Orientis, Italiæ, Galliæ &c. fissuris rupium humidis 14.

Concinna planta cespitem dat folior. Frond. oblongæ, duræ. Pinnæ ultra medietatem incisæ, supra læte virentes, subtus, adeo squamosæ, seu pulvere aureo adpersæ, ut fructificationes non conspiciantur.

10. *obtusifolium.* A. frondibus subpinnatis; pinnis obtusis, sinuatis, decurrentibus, alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Adiantum &c. *Pet. fil. tab. 2. f. 4.*

In America.

*** *Fronde pinnata.*

11. *nodosum*. L. frondibus pinnatis: pinnis oppositis, lanceo-
lat. integerrim. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 6. f. 16.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 108.*

Filix &c. *Plum. amer. tab. 6. Sloan. Jam. hist.*

1. tab. 41. f. 1.

In Amer. merid.

Radix crassa, nodosa, ex qua exeunt 4-5. stipi-
tes, 4-ped. ad genicula nodosi. Pinnæ oppo-

sitæ, A. *scolopendrio* similes, sed acutiores,

& nervosiores, ped. undulatæ, infœcundæ.

Ex eodem stipite aliæ frondes, cæteris hu-

miliores, angustiores, subrus pulvisculo præ-

ditæ.

12. *falicifolium*. A. frondibus pinnatis; pinnis falcato-lanceo-
lat. crenatis; basi sursum angulatis. *Syst. veg.*
ed. 14.

Lonchitis &c. *Plum. amer. tab. 17. fil. tab. 60.*

Pet. fil. tab. 3. f. 2.

In Anthyllis.

Cespites densissimi. Stipit. 2-ped. fusco-virent.

globri. Pinnæ alternæ, acutissimæ, quarum

amphiores longitudine 3-pollic. latitudine ad

basin pollicar. sursum spectantes, supra gla-

briæ, hinc vix id nitidæ.

13. *Trichoma*-A. frondibus pinnatis: pinnis (plerumq.) subro-
tundis, crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.*

tab. 199. Black. tab. 370. Zorn. ic. plant. me-

dic. cent. 1. tab. 95.

Trichomanes &c. *Plum. fil. tab. V. f. 1. Fuchs.*

h. 1. 796. Cam. epit. 925.

- b. *Trichomanes fol. eleganter incis. Tourn. Inst.*

tab. 315. f. 1. G.

Adiantum &c. *Pluk. phyt. 73. f. 6.*

In Europæ fissuris rupium &c.

Stipites cespitosi, semipedal. nigri, nitentes.

Pinnæ petiolat. inferne appendiculatæ.

Var. 1. stipite fisso.

= 2. bifurcato.

= 3. fol. triangularibus.

= 4. fol. semipinnat. cristatis.

14. *dentatum*. A. frondibus pinnar. pinnis cuneiformibus, obtusis, crenato-emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Polytrichum &c. Plum. amer. tab. 50.
Trichomanes &c. Plum. fil. tab. 101. fig. &c.
P. fil. tab. 2. f. 15.
In America meridionali.
 Plures stipites inæquales, a radice exeunt, 3-pollic. semiped nigri. Pinnæ 9-10-iugæ, 9-10. unc. longæ, 5-6. unc. latæ. Pinnulæ membranaceæ, dentatæ, supra late virentes, subtus dilutiores.
15. *marinum*. A. fronde pinnata; pinnis obovatis, serratis, superne gibbis, obtusis; basi cuneatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Charax Filix &c. Morif. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 25. bona.
 b. *Adiantum &c. Pluk. alm. tab. 253. f. 5.*
Lonchitis &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 33. f. 17.
In Anglia, America &c.
 Stipites palmar. nitentes, inferne nudi. Pinnæ alternæ, 20-24. unguis parvi digiti magnitudine, subtus veluti argenteæ.
16. *cultrifolium*. A. frondibus pinnatis; pinnis falcato-lanceolatis, inciso-serratis; basi deorsum angulatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lonchitis &c. Plum. fil. tab. 59.
In Martinica.
 Stipites 5-6. ex radice, 12-15-pollic. nigri, nitidi. Frons unica, cuspidata. Pinnul. utrimq. 6-7 suboppositæ, partim simplices, partim ad basem partem superiorem auriculatæ; ampliores semiped. 2-pollic. latæ, membranaceæ, late virentes.
17. *pygmeum*. A. frondibus pinnatis; pinnis subrotundis, quinis, ternisve. *Syst. veg. ed. 14.*
In Jamaica.
 18. *rhizophorum*. A. frondibus pinnatis, apice radicantibus; pinnis ovatis, repando-subauratis; minimis remotis, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lonchitis &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 29. 30. f. 1.
Adiantum &c. Pluk. alm. tab. 253. f. 4.
In India occident.
19. *monanthum*. A. frondibus pinnatis; pinnis trapeziis, obtusis, superne crenatis; linea fructificationis unica. *Syst.*

Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei.

Facies A. Trichomanis, sed maius. Pinnæ alternæ. Linea fructificans iuxta marginem inferiorem, inferne suffulta margine membranaceo.

20. *Ruta mu- A.* frondibus alternatim decompositis: foliolis
aria. cuneiformibus, crenulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Fl. Dan. tab. 190.

Adiantum &c. Black. tab. 219. Tabern. 796.

Paronychia. Matth. 1041. Epit. 785.

In Europa, ex rupium fissuris &c.

Radices capillares. Stipites breves, prope radicem atro-rubentes. Rami ramosi. Ramuli trifolii, lobulis rhomboideis, firmulis.

21. *alternifo- A.* frondibus simpliciter pinnatis; foliol. alternis,
lium. cuneiformibus, superne incisis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 5. f. 2. Hall. hist. n. 1690.*

In Helvetia &c. &c.

Cespites sæpe magni. Frondes 2-3-pollic. simpl. more gentium spiraliter se evolventes, tum erectæ, tamen versus unam partem quandoq. omnes procumbunt; nudæ, firmæ, nitentes, inferne aphyllæ, atropurpureæ lutescentibus late virentes. Foliol. remotiuscula, alterna, sessil. obovata, seu cuneiform. versus apicem inciso-dent. plana. *Linn. habuit pro var. Rustæ murariæ.*

22. *Adiantum A.* frondibus subtripinnatis; foliol. alternis; pin-
nigrum. nis lanceolatis, inciso-ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 250. Black. tab. 220.*

Adiantum &c. Bauh. hist. 3. p. 737.

Dryopteris nigra. Dod. pempt. 466.

Onopteris &c. Tabern. 796.

In Italia, Gallia &c., locis lapideis in montibus &c.

Habitus Filicum marium, natura dura, firma, plana. Stipites semiped. nigricantes, nitidi. Frondes semidodrant. Filice minores, triangulares, firmiores, sæpe virides, nitidæ. Pinnul. semipinnatæ, ultimæ simplices. Pollen crocei coloris.

23. *Trichoma- A.* frondibus duplicato-pinnatis; pinnis obova-
tes ramosum. tis, crenatis: foliol. inferioribus minoribus. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 755.*

Tom. VI.

H

In Arvernâ rupibus.

24. *marginatum*. A. frondibus pinnat. pinnis oppositis, cordato-lanceolat. submarginatis, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. Pet. fil. tab. 12. f. 2.

In America.

25. *squamosum*. A. frondibus pinnat. pinnis acuminatis, incisis: stipite squamoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Lonchitis &c. Pet. fil. tab. 5. f. 2.

In America.

26. *striatum*. A. frondibus pinnat. pinnis pinnatifid. obtusis, crenatis; terminali acuminata. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Pet. fil. tab. 3. f. 3. 4.

In America.

27. *erosum*. A. frondibus pinnat. pinnis trapezio-oblongis, striatis, erosis, basi auctis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lonchitis &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 33. f. 2.

In India occident.

28. *japonicum*. A. frondibus pinnat. pinnis acutis, inciso-pinnatifid. ferrulatis: stipite squamoso. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Stipes erectus, 2-ped. compressus, sulcatus. Pinnæ oppositæ, sessiles, lanceol. acutæ, incisæ, palmares, pollicem latæ, inferiores longiores, suprema incisa, subtriangulari, acuminata; lobi ovati, obtusi, ferrulati. *Differet ab A. squamoso, pinnis incisis, ferrulatis.*

Conf. A. squamosum. Pet. fil. tab. 5. f. 2.

- Arifolium*. A. frondibus simplicibus, ovatis, auriculatis, sinuosis. *Burm. Ind. Pet. gaz. tab. 50. f. 12.*

In India.

Javanicæ fol. minus auriculata, quam in Petiv. fig.

- lanceolatum*. A. frondibus pinnatis, lanceolat. pinnis oblongis, acutis, incisis, alternis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

- germanicum*. A. frondibus sub 2-pinnatis; pinnulis alternis, lanceolat. apice ferrulatis. *Weis. pl. cryptog.*

A. Breynii. Retz. fasc. 1. Breyn. cent. 1. ic. 97. Hall. helv. n. 1690.

In rimis petrarum.

Stipites multo longiores quam in *A. Ruta muraria*, inferne nigricantes, & quasi adusti, ad aliquot unc. distantiam nudi, in 2-3. ramos scissi: ramulorum pinnæ 2-3-lobatæ, lobis oblongis, irregularibus, serratis, non cuneiformibus, sed inæqualiter incisis, & multo longioribus quam in *Ruta muraria*. Fructificationis lineæ longiores.

1408. POLY-Fructific. in punctis subrotund. sparsis per discum PODIUM. frondis. Dicimus fructificat. *Solitar.* quæ serie longitudinali tantum ab utroque latere disponuntur. *Seriales*, quæ transversim simpl. serie inter singulos nervos transversal. digeruntur. *Sparfas*, quæ inter singulos nervos transversales, duobus, pluribusve ordinibus sunt digestæ.

* *Fronde indivisa.*

1. *lanceolatum*. P. frondibus lanceolat. integerrim. glabris: fructificationibus solitar. furculo nudo. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. tab. 6. f. 2.*

In Amer. merid.

2. *lysopodioides*. P. frondibus lanceolat. integerrim. glabris: fructificationibus solitar. furculo squamoso, repente. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 119.*

Phyllitis &c. *Plum. amer. tab. 42.*

Filix &c. *Pet. fil. tab. 4. f. 15. & an 16? & tab. 15. f. 2? Pluk. atm. tab. 290. f. 3.*

In Martinica, Jamaica &c.

Stipit. multi, longi, ramosissimi, super arbores scandentes, & ibi radicales, pilis rufescentibus. Fol. plurima, inordinata, mox solitaria, mox opposita, mox alterna, linguiformia, acuminata, 4. pollic. longa, 8. unc. lata, læte virentia, subtus nervosa.

3. *piloselloides*. P. frondibus lanceolat. integerrim. hirtis; sterilibus ovatis; fertilibus lanceolatis: fructificationibus solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 718.*

Filix &c. *Pet. fil. tab. 10. f. 5.*

In Amer. meridion.

Radix repens. Spatiatur super saxa musco incrassata; aut super caducarum arborum caudices,

M ij

stipitibus longissimis, ramosissimis, villosis, virentibus, muscositate quadam rufescente cheductis. Fol. ovata pollicaria; lanceolata 3. pollic. longa, ac 6. unc. fere lata, late virentia. Fructificat. lara fulva barbatæ.

4. *heterophyllum*. P. frondibus crenatis, glabris: sterilibus subrotundis, sessilibus fertilibus lanceolat. fructificat. solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 120.*

Filix &c. *Pet. fil. tab. 15. f. 4.*

In Amer. meridion.

Scandit ut antecedens. Stipit. longissimi, ramosissimi, pilis nigricantibus obsiti. Fol. subrotunda, brevis, vix unguicul. undata: lanceolata 5. pollic. longa, semipoll. lata, crenata; læto virore nitida, venosa.

5. *crassifolium*. P. frondibus lanceolat. glabris, integerrim. fructificat. sericibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. 1. tab. 8.*

- b. *Phyllitis* &c. *Pet. fil. 2. tab. 1.*

In Amer. meridion.

Frondes amplissimæ, maculatæ.

- b. Frond. breviores, & crassiores.

6. *phyllitidis*. P. frondibus lanceolat. glabris, integerrimis: fructificationibus sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. amer. tab. 38.*

Phyllitis &c. *Pet. fil. 5. tab. 6. f. 10. An. 7. tab. 6. f. 3. & 4. tab. 6. f. 9?*

In Amer. meridion.

Truncis arborum vetustarum adhæret ad modum *P. vulg.* cuius radicem æmulatur. Frond. 6-7. 2-3-ped. digitum cum dimidio latæ, undatæ, supra pulchre virentes. Stipes brevis, ramosus.

7. *comosum*. P. frondibus lanceolat. glabris, integerrimis; apice multifido: fructificationibus sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lingua &c. *Plum. fil. tab. 131.*

Phyllitis &c. *Plum. fil. tab. 6. f. 11.*

In Amer. meridion.

Radix *P. vulgaris*. Stipes quandoq. in duos ramos dividitur. Frond. longitudine sesquiped. latitudine 2 pollic. h. fi. & apice, antequam biturcetur, angustis. Apex cornua Damæ ramosa, plurimiq. lacinis multoties lacera re-

fert. Frondes obscure virentes, nervulo longitudinali, nigerrimo.

8. *trifurcatum*. P. frondibus lanceolat. glabris, repando sinuatis; apice trilobis. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 15. f. 3.*

Lingua &c. *Plin. fil. tab. 138.*

In Amer. meridior.

Simil. 2. p. ædentibus. Frons quantuq. f. 2. longæ, alias 3-pollic tantum; pinnæ ciliatæ, & amplius latæ. Stipit. longi, nigri.

9. *lineare*. P. frondibus lineari-lanceolat. integris, 2-fidis; fructification. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Rad. minime repens, fibrosa, tomentosa. Frondes pl. aggregatæ, ipitham. erectæ, primum ellipticæ, dein lineari-lanceol. acutæ, raro 2-fid. margine revolutæ. Fructificat. puncta simplici ordine.

10. *pica*. P. fronde simplici, cordata, triloba; lobis lanceolat. subulatis, basi auriculatis; intermed. elongato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In insula Madagascar.

Stipes ater, glaberrimus. Frons refert *Picam volentem*. Lobi integerrimi. Fructificat. puncta sparsa.

* * *Fronde pinnatifida, lobis coadunatis.*

11. *phymatodes*. P. frondibus simplicibus, 3-fid. 5-lobifve, lanceolat. supra fructificationes verrucosis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 86.*

Filix &c. *Pluk. phys. 404. f. 5.*

In Indis orient.

Frondis lobi integerrimi, medio maj. Puncta fructificantia satis magna, sparsa.

12. *hastatum*. P. fronde 3-fido-hastata. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Rad. squamosa, villo brunneo. Stipes palmar. adscendens, filiform. sulcatus, glaber. Frondis lobi laterales minores, intermed. duplo longiore; lanceol. acuti, integerr. glabri. Fructificationes simplici serie, a costa utrimq. æqualiter remotæ. *Differs a P. trifurcato, quod*

hosis nostri sit hastato-3-fida, nec apice trifurca sit frons.

13. *crispatum*. P. frondibus pinnatifid. glabris; lobis semiorbicularis, crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 13. f. 12.*

In Amer. meridion.

14. *suspensum*. P. frondibus pinnatifid. glabris; lobis semiovatis, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 87. Pet. fil. tab. 1. f. 15.*

In Amer. merid. inter rimas arborum vetustarum.

Ob stipitum tenuitatem frondes inclinantur, pedem longæ, pollic. latæ. Stipites nigricantes.

15. *asplenifolium*. P. frondibus pinnatifid. pilosis; lobis semiovatis, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 16. b. Pet. fil. tab. 14. f. 1. Plum. fil. tab. 83.*

In Amer. meridion.

Valde affine priori.

16. *scolopendroides*. P. frondibus pinnatifid. lanceolat. lobis obtrusis, scul. infimis remotis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 91. Pet. fil. tab. 1. f. 14.*

In Jamaica.

17. *vulgare*. P. frondibus pinnatifid. pinnis oblongis, obtusis, subserratis: radice squamata. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 215. Zorn. ic. pl. cent. 1. tab. 46. Plum. fil. tab. A. f. 2. Dod. pempt. 464.*

Filicula &c. Cam. epit. 993.

- b. P. minus. *Dod. pempt. 464.*

In Europæ rimis rupium, in sepibus, & ad radices arborum &c.

Rad. transversa, crassa, tuberosa, squamis fuscis tecta. Frondes semi-raro ped. quandoq. lineares, angustæ, pinnulis alternis, latis, basi confluentibus, ut scapus alatus videatur.

18. *virginianum*. P. frondibus pinnatifid. pinnis oblongis, obtusis, subserratis: radice lævi. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 9. Plum. amer. tab. 36. fil. tab. 77. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 3.*

In Virginia.

Simil. priori, sed minus, & subtus glabrum. Rad. super saxa, & super vetustarum arborum caudices longe repit. Frondes subtrus polline aureo refertæ, ut in *Cetrach*.

19. *Orites*. P. frondibus pinnatifid. lobis lanceolar. obtusis, alternis, distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 1. f. 16.*

In America.

20. *pedunculatum*. P. frondibus pinnatis, lanceolat. lobis adproximatis, ensiformibus, acutis, parallelis, horizontalibus: radice nuda. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 14. Plum. amer. tab. 37.*
In Jamaica.
 Frons pedalis. Pinnæ 2-pollic. sessiles, oppositæ, patentes. Pinnulæ lanceol. angustæ, integre, basi connexæ.
21. *taxifolium*. P. frondibus pinnatis; lobis adproximatis, ensiformibus, acutis, parallelis, adscendentibus: radice hirta. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 14. f. 1. Plum. fil. tab. 89.*
In Amer. meridion.
 Rad. longissima, intra muscosos arborum cortices reptans. Frondes pendulæ, ad instar calami scriptorii incisæ, sub 10-pollic. longæ, 2-pollic. latæ, late virentes. Stipites villosi.
22. *fruticulosus*. P. frondibus pinnatis; lobis adproximatis, ensiformibus, repandis, horizontalibus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 3. f. 8. Plum. fil. tab. 78.*
In America.
 Rad. longiss. punctata, subcœrul. Frond. 2-3. ex radice, *Polypodii vulg.* facie, & divisione, sesquiped. longæ, semiped. latæ, supra glabræ, late virentes, subrus venosæ.
23. *squamatum*. P. frondibus pinnatifid. scabris; pinnis lanceolatis, distantibus, horizontalibus, integerrim. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 11.*
Habitat
24. *loriceum*. P. frondibus pinnatifid. lævibus: pinnis lanceolatis, repandis, distantibus, horizontalibus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 10. 12.*
In America.
 Radix dulcis. Pol. longa.
25. *alatum*. P. frondibus pinnatifid. lævibus: pinnis oblongis, dentatis, distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 13.*
In America.
26. *ellipticum*. P. frondibus pinnatifid. pinnis ellipticis, integris, lævibus furculo repente. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
 Rad. repens, radiculis brunneis, tomentosis. Stipites spitham. erecti, torti, angulati, glabri. Pinnæ remotæ, 4-iugæ, impari maxima.

27. *cambri- cum*. P. frondibus pinnatifidis; pinnis lanceolatis, lacero-pinnatifid. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 132? Moris. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 8. bene.*

Filix &c. *Pluk. alm. tab. 30. f. 1.*

In Anglia, Monspelii.

Frond. subcordatæ. Pinnul. oppositæ; summae lineari-lanceol. dentatæ.

28. *aureum*. P. frondibus pinnatifid. lævibus: pinnis oblong. distantibus: infimis parulis; terminali maxima; fructification. ferialibus. *Syst. veg. ed. 14. Plum. amer. tab. 35. fil. tab. 76.*

P. *maximum*. *Pet. fil. tab. 7. f. 8.*

In America, ad caudices vatustarum arborum.

Rad. pedal. ramosa, nodosa. Stipites nigri, nitidi. Frond. subped. longæ, semiped. latæ, læte virentes, subtus punctis aureis obductæ.

29. *quercifolium*. P. frondibus sterilibus, sessilibus, brevioribus, obtusis, sinuatis; fructificationibus alterno-pinnat. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Hill. anat. tab. 10. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 1. f. 15.*

P. *indicum*. *Clus. exot. tab. 89. Rumph. amb. 6. tab. 86.*

Panna &c. *Hert. mal. 12. tab. 11.*

In India.

Frond. aliæ integræ, latæ, breviores, *Quercus* fig: aliæ multo longiores, laciniatæ in modum *P. vulg.* laciniis longis, acutis, intervallis latioribus distantibus.

*** *Fronde trifoliata: pedunculo foliol. tribus.*

30. *trifoliatum*. P. frondibus ternatis, sinuato-lobatis; intermedi. maiore. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 7. f. 3.*

Hemionitis &c. *Plum. amer. tab. 32. fil. tab. 148.*

Hemionitidi &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 42.*

Filix &c. *Pluk. alm. tab. 291. f. 3.*

An Polypodium &c. *Pet. fil. tab. 7. f. 2. tab. 7.*

f. 5. tab. 7. f. 6. tab. 7. f. 7. tab. 7. f. 4?

In insulis Caribæis.

Stipit. 6-7. ex rad. prodeunt, semiped. nigri, nitidi. Frond. maximæ, cuspidatæ, supra læte virides, nitidæ, glabræ, subtus nervis obliquis, nigrisque donatæ, tuberculosæ.

**** *Fronde pinnata.*

31. *Lonchitis*, P. frondibus pinnatis; pinnis lunulatis, ciliato-ferratis, declinatis: stipitibus strigosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 497. Ad. nidoros. 4. tab. 5. f. 2. 3. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 2. f. 1.*
- b. *Lonchitis* &c. *Barr. ic. 1121.*
In alpinis Italiæ, Helvetiæ, Virginicæ &c., lucis lapidosæ, & umbræ 24.
Hæbitus asper. Stipes pedalis, squamis fuscis oblitus. Pinnul. longæ, æquales, curvulæ, peribus multis, dentat. ciliatæ, appendice triangulari.
Virginica pinnæ habet magis elongatas, & minus incurvas; ferraturis minus ciliato-spinosis.
32. *exaltatum*. P. frondibus pinnatis; pinnis ensiformibus, integris, basi inferiore introsum; superiore sursum gibbis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lonchitis &c. Plum. amer. tab. 28. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 31.
In Americæ.
Stipit. 2-ped. Pinnul. adproximatæ, pollic. cum dimidio longæ, 4. lin. latæ, alternæ, ad apicem dentatæ, supra sature videntes, glabræ, subtus nervosæ.
33. *auriculatum*. P. frondibus pinnatis; pinnis falcato-lanceolat. ferratis; basi truncatis, sursum auritis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. Breyn. sent. tab. 44. f. 2. Pluk. alm. tab. 30. f. 4. Burm. Zeyl. tab. 44. f. 2.
In Indiæ.
Stipites inferne hirsuti, supra glabri. Frond. sesquiped.
34. *nitum*. P. frondibus pinnatis; pinnis ensiformibus, ferratis; ferraturis semiovatis, ovato-nervosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. Pet. mus. tab. 1. f. 55. Burm. Zeyl. tab. 44. f. 1. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 43. Pluk. phyt. 244. f. 1. & 403. f. 1.
In Indiis.
Stipes sulcatus. Pinnulæ alternæ; ultima crassior, brevior, profundius ferrata. Pinnarum laciniæ acutæ, circa margines punctis polliniferis confertis.

35. *triangulare*. P. frondibus pinnatis; pinnis triangularibus, dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Trichomanes &c. *Pet. fil. tab. 1. f. 10.*
In America.
36. *cardifolium*. P. frondibus pinnatis; pinnis cordatis, obtusis, integerrimis, repandis. *Syst. veg. ed. 14.*
Trichomanes &c. *Pet. fil. tab. 1. f. 11.*
In America.
37. *simile*. P. frondibus pinnatis; pinnis lanceolat. integerrimis, distantibus; supremis minoribus: punctis serialibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Lonchitis &c. *Sloan. kist. 1. tab. 32.*
In America.
38. *diffimile*. P. frondibus pinnatis; pinnis lanceolat. subpubescentibus, confluentibus; inferioribus distinctis punctis sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Pluk. alm. tab. 288. f. 1.*
In America.
39. *reticulatum*. P. frondibus pinnat. pinnis oblongis, integerrimis; anastomosis rectangulis; punctis, rectangulis, adproximatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Plum. amer. tab. 9.*
In America.
40. *cicutarium*. P. frondibus ternatis; foliol. 2-pinnatis, basi laciniatis, acuminatis, obtuse inciso-ferratis infimis gibbosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Pluk. alm. tab. 284. f. 1. & tab. 184. f. 1.*
In Virginia, Jamaica.
41. *fontanum*. P. frondibus 2-pinnat. lanceolatis; foliol. subrotund. argute incis (interioribus subpalmatis): stipite lævi. *Syst. veg. ed. 14.*
Adiantum &c. *Lob. ic. 810. Barr. ic. 452. f. 1.*
Filicula &c. *Tavern. 792.*
In Helvetia, Sibiria &c. e rupium fissuris &c.
Planta elegans, habitu singulari. Stipes triantal-femiped. firmus, lævis, sulcatus, planus nervo medio percursus, fol. & pinnis raritate dispositis. Pinnæ 4-5-iugæ, laxè pinnatæ extremis confluentibus. Pinnul. breves, latæ, semilunatæ, etiam 4-dent. dentibus cristatis.
• *Habitus* P. fragilis, et foliol. ardiora, minus profunde subdivisa, punctis floriferis maioribus, prodeuntibus non ex squama subrotund. sed ex rima, seu valvula linear, oblonga, alba.

42. *falcatum*. P. frondibus pinnatis; pinnis cordatis, falcatis, acuminatis, integris: fructificationibus adproximatis, sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Th. mb. Jap. tab. 36.*

In Japonia.

Simil. P. Lonchitidi, sed differt fronde maiore; folioli. petiolulati. magis acuminatis, obtusissime ferratis. Fructification. puncta non per series binas, ut in P. Lonchitide, sed per totam paginam inferiorem dispersa, tamen distantia.

43. *marginale*. P. frondibus pinnatis; pinnis superioribus coalitis; inferioribus entomorphibus, solum auriculatis, incis: stipite villosa. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Frond. inferne pinnatæ; superne pinnatifid.

**** *Fronda subbipinnata, cuius pinnae confluunt basi, ut semipinnata potius, quam perfecte duplicato-pinnata sit.*

44. *Phegopteris*. P. frondibus subbipinnat. folioli. infimis reflexis, paribus pinnula quadrangulari condunatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. Amm. Ad. petrop. 10. tab. 21.

Filix &c. Petit. epist. tab. 50. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 4. f. 17.

In Europa Fagetis, & in Virginia, locis umbratis, montanis &c.

Stipit. pedali. & ultra, erecti, glabri. Frons subtriangular. Pinnæ nervo, & toto sæpe folio, & oris subhirsutæ. Pinnul. ovato lanceol. pinnatifid. integræ. Pinnæ primariæ latissimæ cum scapo confluunt, ut ibi obtuse quadrangulare quadriivium nascatur.

45. *retroflexum*. P. frondibus subbipinnatis; folioli. infimis reflexis: pinnis laceris. *Syst. veg. ed. 14.*

Filicula &c. Pet. fil. tab. 1. f. 9.

In America.

46. *fragrans*. P. frondibus subbipinnat. lanceolat. folioli. confertis; lobis obtusis, ferratis: stipite paleaceo. *Syst. veg. ed. 14.*

In Anglia, Sibiria.

Habitus P. F. maris, at longe minus. Folioli. densius congesta, lobis profundius ferratis.

47. *parasiticum*. P. frondibus semi-bipinnat. lanceol. lobulis rotundatis, integerrim. striatis. *Syst. veg. ed. 14.* Kari-velli-panna. *Hort. mal. 12. tab. 17.*
In India, supra arbores.
 Stipes lævis. Puncti fructificantis sparsa.
48. *varium*. P. frondibus lateralibus bipinnatis; foliol. infimo pinnatifido. *Syst. veg. ed. 14.*
In China.
 Stipes hirtus pilis vagis. Pinnæ omnes sessiles, argute, & tenuissime ferratæ. Pinnul. baseos deorsum spectantes iuxta stipitem, longiores, & semipinnatifid qua nota dignoscitur. Unde frons apice simpliciter pinnata, lateribus 2-pinnat. pinnula baseos elongata, pinnatifid.
49. *eristatum*. P. frondibus subbipinnat. foliol. ovat-oblongis: pinnis obtusiusculis, apice acute ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Müll. Fridr. n. 845. tab. 2. f. 4.*
Filix &c. Mapp. alf. f. 8. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 11. Pluk. ph. t. 181. f. 2.
In Europæ septentrion. sylvis umbrosis, montanis 24.
 Planta magna, firma, & nitida. Stipes squamis fuscis rectus. Pinnæ inferiores sæpe oppositæ. Pinnul. oblongæ, latæ, infer. pinnarum intimæ, subpetiol. quasi cordatæ. Foliol. superiora tantum florent.
50. *Filix mas*. P. frondibus bipinnat. pinnis obtusis, crenulatis: stipite paleaceo. *Syst. veg. ed. 14. Gunn. norv. tab. 1. f. 4. Black. tab. 323. Vaill. paris. tab. 9. f. 2. Fuchf. hist. 594. Tabern. 591.*
Felce maschio. Matth.
In sylvis subhumidis, umbrosis collium &c. 24.
 Cespites circulares. Stipes subtus strigosus. Frons cubitalis, imis pinnis brevioribus, inde maioribus, reliquis triangularibus, decrepcentibus. Pinnular. latera parall. obtuse, aut acute dentata. Fl. reniformes.
51. *Filix femina*. P. frondibus subbipinnat. pinnulis lanceolat. pinnatifid. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 325.*
Filix mas &c. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 8. Pluk. phyt. 180. f. 4.
Felce femina. Matth.
In Europæ frigidioris subhumidis, & sylvis umbrosis 24.

Stipes cum paleolis ferrugineis. Fol. longiora. Pinnæ ad 40. usque paria, semipinn. Pinnul. sub 10-paria, segmentis dentatis, aristatis, acute bifectis. Fl. ovati, subciliati, foliarii.

Var. crenata, pinnul. lanceolat. obtuse crenatis; primis maioribus, subbipinnatifid. *Morif. hist. 3. f. 2. tab. 3. f. 2.*

==== *spinosa*, pinnulis apice denticulat. leviter spinosis terminato. *Müll. Fl. Frid. tab. 2. f. 2.*

52. *Thelyptea*-P. fronde 2-pinnat. pinnis pinnatifid. integerrim. subtus undique polline tectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 760.*

Filix &c. Tabern. hist. 1182. Mapp. alfat. ic. 7. Schmid. ic. tab. 11. f. 13.

In Europæ septentr. paludibus *U.*

Polypod. vulg. parum simile. Rad. repens, multicaulis. Frond. cubital. Simplices, inferne rubiginosæ. Pinnæ oppositæ: pinnul. inferior. sinuato-dent. superior. integræ, in longum mucronatum filum conflunt.

53. *aculeatum*. P. frondibus bipinnat. pinnis lunulatis, ciliato-dentat. stipit. strigoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Morif. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 15 Pluk. alm. 179. f. 6. & 180. f. 1.

In Europa, locis montanis, lapidosis *U.*

Habitus Lonchitidis. Stipes triangular. squamis spadiceis obsitus. Pinnulæ pleræque distinctæ; hinc frons 2-pinnata.

Var. pinnis pluribus confluentibus in unam magnam, lanceolat. pinnam.

==== fol. brevior.

==== pinnis fere omnibus distinctis.

54. *rhaeticum*. P. frondibus bipinnatis; foliol. pinnisque remotis, lanceolatis; serraturis acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Bauh. hist. 3. p. 740.

In Helvetia, Gallia &c., inter saxa in collibus *U.*

Planta etiam cubital. viridi-lutescens. Stipit. tenuissimi, glaberrimi. Pinnæ lineares, profunde serratæ. Pinnul. alternæ, segmentis falcatis, apice incisæ; dentibus argutis spinulis.

55. *novboracense*. P. frondibus bipinnat. pinnis oblong. integerrimis, parallelis: stipit. lævi. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada.

Habitus, & structura omnino *P. Filix maris*; at pinnæ magis adproximatæ, integerrimæ, & pinnis floriferis minimis copiosissimis. Stipes dein lævis est.

56. *pubescens*. *P.* frondibus bipinnat. pilosis; pinnis lanceol-ovatis, acutis, subincilis; extimis confluentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica.

57. *marginale*. *P.* frondibus bipinnatis; pinnis b. h. sinuato-repandis: fructificationibus marginalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada.

Habitus *P. F. maris*, sed pinnæ oblongæ, non crenatæ, at versus basin obtuse serratæ. Manifeste distinguitur pinnis ab utroq. margine subtus punctis 2-3. maioribus distinctis, nec p. in. dico, ut *Filicis maris*.

58. *bulbiferum*. *P.* frondibus bipinnat. foliol. remotis: pinnis oblong. obrutis, serratis, subtus bulbiferis. *S. fl. veg. ed. 14.*

Filix hæcifera. Moris. hist. 3. f. 14. tab. 3. f. 10. In Canada.

59. *fragile*. *P.* frondibus bipinnat. foliol. remotis; pinnis subrotund. incilis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 401.*

Filix &c. Vaill. parif. tab. 9. f. 1.

Adiantum &c. Barr. ic. 432. f. 2.

Filix &c. Pluk. alm. tab. 180. f. 5.

In collibus Europæ frigidioris, inter saxa fetus vias 24.

Stipes semiped. fragilis, basi rubens, laxè pinnatus, pinnis pene oppositis. Pinnul. alternæ, oblongæ, acuminatæ, pinnatifid. incisuris, utrimq. 4-5. apice dentatis. Pinnulæ variant, sæpe tamen profunde incisæ, fere semipinn. Orbiculi feminales flavicantes.

60. *regium*. *P.* frondibus bipinnatis: foliol. suboppositis; pinnis alternis, laciniatis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 9. f. 1.*

In Carniola &c., locis saxosis ad fontium scaturigines 24.

Stipes spitham. ruber. Rami utrimq. ad 16. Pinnæ alternæ, 7-iugæ, 5. lin. longæ, divisæ in lacinias oblongas, 3-4-fid. simplices, obtusiusculas, lineam longas. Ad originem sim-

gulae laciniae insidet orbiculus seminalis, flaves-
cens. *Fruðificat. pulvilli in hoc ma. quam in*
adfinibus.

61. *leptophyl- P. frondibus bipinnat. sterilibus brevissimis: pin-*
lum. nis cuneiformi-lobatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Adiantum &c. Magn. hort. tab. 5. Barr. rar.
tab. 431. optima.

In Hispania, Gallia &c.

Medium inter Acrosticha, Polypodia, Osmundas.

62. *Barometz. P. frondibus bipinnatis; pinnis lanceolat. pinna-*
tifid. radicibus lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China.

Rad. decumbens, crassa, villo denso, flavo ob-
sita. Stipit. 1-fesquiped. virides, læves, ob-
solete angulati. Foliol. oblonga; intima op-
posita, reliqua alterna, axillis patulis.

63. *lacerum. P. frondibus bipinnatis; pinnulis sessilibus; exti-*
mis confluentibus, falcatis, serratis: stipite
squamoso. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Rad. repens, squamis densis, membranaceis,
brunneis, glabris obsita. Stipes erectus, 2-
ped. sulcatus, squamis remotis, laceris. Frond.
glabræ. Pinnæ alternæ. Pinnul. infimæ sub-
auriculatæ. Fruðific. in apice frond.

64. *setosum. P. frondibus bipinnat. pinnulis lanceolat. incisis,*
integris: stipit. setoso. *Syst. veg. ed. 14.*
Thunb. Jap.

In Japonia.

Stipes rufescens, pilis atris, longis, laxis obli-
tus. Pinn. infimæ 2-pin. super. pinnatæ. Fru-
ðific. in media pagina simplici serie.

65. *glaucum. P. fronde 2-part. 2-pinnata, subtus glauca; pin-*
nul. incisis, integris. *Syst. veg. ed. 14. Thunb.*
Jap.

In Japonia.

Stip. spitham. & ultra, semiteres, glaber, apice
2-fid. cum rudimento frondis in dichotomia.
Pinnæ ensiform. pinnatifidæ; lacinii lanceolat.
obtusis, integris, margine reflexo. Fruðific.
simplici serie inter margines laciniarum, mi-
nutæ.

66. *dichoto-* *P. frondibus dichotomis, 2-pinnat. pinnul. linea-*
mum. ribus, integris, paralellis. *Syst. veg. ed. 14.*
Thunb. Jap. tab. 37.

In Japonia.

Surculus repens, flexuosus. Stip. flexuoso erectus, teres, glaber, raro trichotomus. Frons dichotomo-subpedata, supra glabra, subtus glauca. Pinnul. unguicul. coalitæ, acutæ. Fructific. simplici serie, minutæ.

Ufus. Cineres huius cum alumine pulverisato adhibentur contra aphtas, & excoitationes oris.

***** *Spinis sparsis aculeata, aut arborescentia.*

67. *arborescens*. P. frondibus bipinnatis ferratis: caudice arboreo, inermi. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Plum. fil. 1. tab. 1. amer. 1. tab. 1. 2.

Pet. fil. 41. tab. 1. f. 1. 2.

In Amer. meridion. h.

Habitus Palma. Caud. 10-12-ped. simplex, semiped. crassus, squamulosus. Frond. in apice in orbem dispositæ (iuniores convolutæ), 2-ped. Pinnul. adproximæ, alternæ, aut oppositæ, obtusæ, grantiores 7-8-unc. ad b. sin 2. unc. latæ, supra late virentes.

68. *spinosum*. P. frondibus bipinnatis ferratis: caudice arboreo, aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 56. Plum. amer. 3. tab. 3. fil. 3. tab. 3. Pet. fil. 43. tab. 4. f. 1.

In Amer. meridion. h.

Pinnæ acumin. Pinnul. obtusæ.

69. *horridum*. P. frondibus supradecompositis; pinnis semisagittatis basi connexis, apice ferratis: caudice aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Pet. fil. tab. 5. f. 1. Plum. amer. 3. tab. 4.

In Amer. meridion.

Stipites sub 4-ped. pollicem crassi, nigri, nitidi, aculeis nigris. Pinnulæ sature virides. Puncta seminalia sparsa prope marginem.

70. *pyramidalis*. P. frondibus supradecompositis; pinnis terminalibus lanceolatis longissimis ferratis: stipite inferne aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Pet. fil. tab. 4. f. 2.

In America.

71. *asperum*. P. frondibus supradecompositis; pinnis obtusis, apice ferratis; terminalibus aculeatis caudice arboreo, aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix

Filix &c. *Pet. fil. tab. 4. f. 7.*

In America.

72. *muricatum*. P. frondibus bipinnat. pinnis ovatis, denticulato-spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Pet. fil. tab. 1. f. 6.*

In America.

73. *villosum*. P. frondibus bipinnatis, hirsutis; pinnul. oblongis, obtusis; terminalibus acuminatis. *Pet. fil. tab. 4. f. 10. Plum. amer. tab. 23. filic. tab. 27.*

In America.

Tota planta villis tortuosis, & rufescentibus obfita. Stipit. 4-5-6-ped. 2-3. unc. crassi, e castaneo-rufescent. Frond. sesquiped. alternæ, inæquales. Pinnæ alternæ, 3-polic. longæ, 1-poll. latæ, acuminatæ. Pinnul. 3-unc. latæ, crenatæ, supra læte virid. subius dilutiores.

74. *derussatum*. P. frondibus bipinnat. pinnis horizontalibus, integerrim. obtusis; terminalibus lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Pet. fil. tab. 2. f. 3. 6.*

In India.

***** *Fronde supradecomposita.*

75. *Dryopteris*. P. frondibus supradecompositis; foliol. ternis, bipinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 759?*

Thelypteris &c. *Amm. Ad. petrop. tab. 22. f. 2.*

Filix &c. *Morif. hist. 3. f. 14. tab. 4. f. 19. Tabern. p. 799.*

7. Filix *pumila* &c. *Clus. hist. 2. p. 212.*

In Europæ nemoribus saxosis, subalpinis &c.

Habitus duriusculus, & glaber. Stipites glaberrimi, ramis suboppositis. Frons palm-cubital. triangular. Pinnul. lanceol. pinnatifid. lobis ovatis, obtusis, crenatis, lineatis, extremis confluentibus.

76. *Speluncæ*. P. frondibus supradecompositis, pilosis; foliol. lanceolatis, pinnatis; pinnis oppositis, pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. *Pluk. alm. tab. 244. f. 2.*

In India.

77. *sapense*. P. frondibus supradecompositis; fol. bipinnatis;

pinnis basi unilobis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Rami alterne bipinnat. Foliol. alterne pinnat. lanceol. Pinnul. basi adproximatæ, oblongæ, acutiuscul. ferratæ. Fructificatio solitar. ad basin pinnarum.

78. punctatum. P. fronde 3-pinnatifid. pinnul. lanceol. obtusis, pinnatifid. stipit. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Stipes semiteres, sulcatus, subvillosus, purpureo-punctatus. Pinnæ parentes. Fructificat. solitar. iuxta incisuras pinnularum.

feolopendria. P. frondibus lanceolat. integris-3-5 lobis: stipite repente. *Burm. Ind. Fl. Zeyl. tab. 86.*

In Java.

simplex. P. frondibus simplicibus, lanceolat. integerrim. alternis, glabris. *Burm. Ind. Rumph. amb. 6. tab. 30 f. 1.*

In Amboina.

auriculatum. P. pinnis auriculatis. *Plum. fil. tab. 7.*

Adiantoides. *In Guiana.*

repens. P. fronde lanceol. integerr. longissima. *Plum. fil. tab. 134.*

In Guiana 24.

rigidum. P. frondibus integerrim. acutis, glabris. *Plum. fil. tab. 135.*

In Guiana 24.

minimum. P. scandens; fol. subrotund. acutis, crassis. *Sloan. Jam. tab. 28. f. 3.*

In Guiana.

ferratum. P. fronde simplici; pinnis alternis, ferratis. *Sloan. Jam. cat. tab. 33. f. 1.*

In Guiana &c.

ovatum. P. frond. ovata, alterna, petiolat. laciniis oblongis, integerrimis. *Burm. Ind.*

b. Polypodium &c. *Pet. fil. tab. 14. f. 2.*

In Java.

spinulosum. P. caulescens; frondibus petiolatis, pinnatifido-3-fid. apice 2-fid. spinoso. *Burm. Ind. tab. 67. f. 1.*

In India.

- laciniatum*. P. frondibus pinnatifid. laciniis inæqualibus. *Burm.*
Ind. Hort. mal. 12. tab. 20-21.
In Java, & Malabura.
In Javanica folior. foramina non observantur.
 P. pinnis paucis, semipinnat. brevissimis, acute
 serratis. *Hall. hist. n. 1702. Segu. Suppl. tab.*
1. f. 2.
In Helvetia.
 Stipes semiped. Pinn. 7. & ultra, uncial. acute
 serratæ. *Planta non suis æstivata.*
- Asplenoides*. P. *Scop. Fl. Carn. tab. 62. Pluk. phyt. tab. 179.*
f. 4?
In alpihus.
 Frondes molles, digito paulo longiores, squa-
 mulis paucis, ferrugineis adspersæ, semel pin-
 natæ. Pinnæ semunc. longæ quæ medium locum
 occupant. Pinnæ imæ breviter pedicellatæ,
 incisæ, & quasi lobatæ, lobis una, vel
 altera crena notatis. Superior. sessil. crenatæ.
- dentatum*. P. fronde pinnata, dentata, superne nonnisi pin-
 natifida; pinnis crenatis; infimis deflexis.
Forsk. Æg.
In Arabia.
- trapezioides*. P. frondibus pinnatis; pinnis oppositis, ovatis,
 denticularis, glabris; impari lanceolato, lon-
 gissimo. *Burm. Ind. tab. 66. f. 2.*
In Java.
- radicans*. P. fronde pinnata, radicante; pinnis oppositis;
 subovatis, obrusis; super. latere latioribus.
Burm. Ind. tab. 66. f. 3.
In Java.
 Stipit. radicanter, scandentes. Frons sesquipal-
 mar.
- palustre*. P. fronde pinnata; pinnis lanceolat-ensiformibus,
 integris, striatis; setaceo-serratis, alternis.
Lin. Fl. Zey. Burm. Zeyl. tab. 46.
In Indiis.
- glabrum*. P. fronde pinnata; pinnis oppositis, lanceolat.
 striatis, integerr. glabris. *Burm. Ind. Fl. Zeyl.*
100.
In Java.
- Guianense*. P. frondibus pinnatis; pinnis suboppositis, latis,
 crenatis. *Aubl. Guian. Sloan. Cat. tab. 42. f.*
2 Jam. hist. 1. tab. 43. f. 1.
In Guiana &c.

- malle*. P. frondibus subbipinnat. pinnul. lanceolat. obtusiuscul. apice crenulatis. Schreb. Lipsf.-Segu: Suppl. tab. 1. f. 1. Vaill. tab. 9. f. 4.
In nemoribus, ad arborum radices, & fontium scaturigines 24.
- Pinnae alternæ*; pinnul. basi hinc dilatatis, pinnatifid. laciniis basi hinc dilatatis, apice una, alterave crenula; ultimis acutis, integerrimis.
- Incane*. P. fronde pinnis geminis; pinnulis oppositis, basi dilatatis, connatis, linearibus, integerrimis, striatis. Burm. Ind. tab. 69. f. 2.
In Java.
- setiferum*. P. fronde bipinnat. foliol. reniformibus, dentibus setiferis; caule lanato. Forsk. Æg.
In Arabia.
- Adiantoides*. P. fronde 2-pinnat. pinnis ovatis, incisis, denticulatis, glaberrimis, lineatis; inferioribus oppositis; superioribus alternis, decurrentibus. Burm. Ind. Pet. fil. tab. 2. f. 9.
In India.
- prostratum*. P. fronde 2-pinnata; pinnis alternis, horizontalibus; pinnul. lanceolat. obtusis, lineatis, glaberrimis; summis simplicibus. Burm. Ind.
In Java.
Differt a P. decussato, pinnis alternis.
P. pinnis, & pinnulis pinnatis, obtusis, subtus hirsutis. Hall. hist. n. 1700. Pluk. tab. 180. f. 6.
In Helvetia.
Pro P. fragili sumebatur. Plantula humilis, semiped. Stipites squamosi, flavi. Fol. min. duplicato-pinnata, pinnis confluentibus, ovatis, nervis hirsutis; qua nota se distinguit.
- alpinum*. P. pinnis pinnarum pinnatis, laxissime divis; lobulis obtusis, dentatis. Hall. helv. n. 1709.
Filicula &c. Segu. suppl. tab. 1. f. 3.
In editioribus rupibus alpinum 24.
- montanum*. P. triplicato-pinnat. pinnulis tertiis semipinnatis; lobulis bifid. Hall. hist. n. 1710. Pluk. tab. 89. f. 4. pinnis nimis triangulis.
In alpinis Helvetiæ.
Planta tenera, pedal. sed multiplici divisione; stipite gracili, longe nudo. Frons triangularis. Primæ pinnae 3-uncial: tertiæ 6-linear. oblong. quæ semipinnatæ, etiam pinnulæ, quæ

rum lobi quini, bident. Pinnæ, & pinnulæ
ferè conjugatæ, parallellæ. Acervuli florales
albi.

- crispum*. P. frondibus 3-pinnat. plnnis, pinnulisq. remo-
tis, alternis: foliol. obovatis, emarginatis,
apice floriferis. *Gouan. Illustr. Segn. Suppl. 3.*
tab. 1. f. 3. optima.

In Monte Baldo.

Differt ab Osmunda crispa. Stipit. fragiles, ad
originem pinnarum dilatati, complanati. Frond.
ovat-lanceol. Foliol. intima 3-4-loba; cætera
2-loba. Lobi singuli apice latiores, longitudi-
naliter 2-fid.

*Planta media inter Osmundas, Acrostica, & As-
plenia.*

- crenatum*. P. fronde supradecomposita; pinnis alternis; se-
cundariis pinnatis: fol. pinnatifid. crenatis, cili-
atis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Frons ped. Rachis villosa, viridis. Pinnæ se-
cundæ lanceol. sesquipoli. Foliol. ovalia, con-
nexa, plnnatifid. villosa, crenulata, ciliata.

1409. ADI- Fructificat. in maculis terminalibus, sub replicato
ANTUM. margine frondis.

* *Fronda simplicis.*

2. *reniforme*. A. frondibus reniformibus, simplicibus, stipitatis,
multifloris. *Syst. veg. ed. 14.*

Filix &c. Pluk. alm. tab. 287. f. 3.

In Madera.

Radix obliqua, nodosa. Stipit. palmar-dodrant.
Fol. crenatarum segmenta oblongo-quadrata,
ore subreflexo.

3. *philippenst*. P. frondibus reniformibus, simplicibus, alternis;
petiolat. lobatis, multifloris. *Syst. veg. ed. 14.*
Pet. gaz. tab. 4. f. 4.

In Philippinis.

3. *repens*. P. frondibus simplicibus; trapeziformibus, cor-
datis, pinnatifidis; laciniis lanceolat. apice ser-
ratis, floriferis; infimis incisis. *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.

In luso dicto Isle de France.

Caul. repentes, longi, paleacei, Stipites erecti,
paleacei. Frons 2-pollic. Punctum fructificat.
in serraturis.

* * *Fronde composita.*

4. *radiatum*. A. fronde digitata: foliolis pinnatis; pinnis unifloris. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 14. f. 3. Plum. amer. tab. 49.*
 A. *jamaicense* &c. *Pluk. alm. tab. 253. f. 3.*
Lonchitis &c. *Plum. fil. tab. 100.*
Trichomanes &c. *Morif. hist. 3. f. 14. tab. 4. f. 9.*
In Jamaica, Domingo.
 Stipit. pl. semiped. nigri, nitidi. In quorum apice frondes in orbem dispositæ, 6-7; longiores semiped. breviores 3-pollic. Pinnulæ alternæ, aut oppositæ, sibi invicem adhaerentes, ut lobus inferior basin superiorem occultat, pulchre virentes, crenulis rufescentibus, reflexis.
5. *pedatum*. A. frondibus pedatis: foliol. pinnatis: pinnis antice gibbis, incis. fructificantibus. *Syst. veg. ed. 14.*
 A. *fruticosum* &c. *Pluk. alm. tab. 124. f. 2. Morif. hist. 3. f. 14. tab. 5. f. 12.*
 A. *american. Corn. Canad. tab. 6.*
In Canada, Virginia.
 Stipit. cubital ramis in orbem diffusis. Fol. A. *vulgari* similia, sed ampliora.
Infusum Theiforme in tussi, pthysi &c.
6. *lanceum*. A. frondibus pinnatis: pinnis oppositis, oblongis; terminalibus triangulari-hastatis. *Syst. veg. ed. 14. Seb. thes. 2. tab. 64. f. 7. 8.*
Habitat Surinam.
 Stipes lævis. Pinn. sæpe 2-iug. obtusæ, recurvatæ.
7. *hastatum*. A. frondibus pinnatis; pinnis hastato-trilobis, recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Ltn. Suppl.*
Ad cap. 6. Spei.
 Stipes semiped. indivisus, glaber, atro-purpur. Pinnæ subcissil. inferior. oppositæ, obrutæ; superiores alternæ, acutæ, margine crenulato, crenulis recurvatis.
8. *trilobum*. A. frondibus compositis; pinnis tripartitis, obrutis, incis. multiss. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 11. f. 9.*
In America.
 Planta repens.

9. *ferrulatum*. A. frondibus pinnat. pinnis obtusis, obovatis, ferratis, unifloris. *Syst. veg. ed. 14.*
Trichomanes &c. *Sloan. Jam. hijl. 1. tab. 35.*
 f. 2.

In Jamaica.

Stipites nigri.

10. *caudatum*. A. frondibus pinnatis, falcatis, apice caudatis.
Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 5. f. 1.

In Ind. orient.

Frond. in fasciculum dispositæ, more *Asplenii Trichomanis*. Stip. spitham-pedal versus alterum latus curvus, ferrugineus, subpubescens, pinnis versus apicem remotis, minutis, ubi excurrit in filum subnudum, sæpe radicans apice. Pinn. alternæ, subtessil. I tere superiore dilatatæ, & ad medium inciso-multifidæ, obtusæ, striatæ. Fructificat. testæ ab apicibus pinnar. reflexis.

*** *Frond. decomposita.*

11. *stellulatum*. A. frondibus decompositis; pinnis alternis, rhombeis, rotundat. multinfl. stipitibus supra pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *chinense* &c. *Pluk. alm. tab. 4. f. 3.*

In China.

Stipes, rami, & pedicelli supra canaliculati, & ferrugineo-villofi, statura *Asi. pedati*. Rami alterni. Fol. inæqualia, quæ semicirculum octantem, seu quadrantem referunt.

12. *trifoliatum*. A. fronde decomposita; fol. alternis, ternatis, linearibus 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 11. f. 4.*

In America.

13. *chusanum*. A. frondibus decompositis; pinnis alternis, pinnatifidis; lobis inæqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In China.

Frons lanceol. glabra. Foliol. alterna, lanceol. alterne pinnata. Lobi lineari-cuneiform. incis.

14. *Capillus Veneris*. A. frondibus decompositis; foliol. alternis; pinnul. flabelliformibus, lobatis, pedicellatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 367. Cam. epit. 924. Jacq. misc. 2. tab. 7.*

In Europæ puteis, muris humidis &c. 24.

Stipes palmar. ramosus, atro-purpur. Ramorum

peduncul. grandes, trifolii. Pinnæ glabræ, lobis obrufis.

15. *villosum*. A. frondibus bipinnatis; pinnul. rhombeis, antice, extusque fructificantibus: stipite villoso. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. 253. f. 1.*

In Jamaica.

Stipes triangular. niger, pilosus. Pinnæ alternæ, subseffil. glabræ.

16. *pulverulentum*. A. frondibus bipinnat. pinnul. ovalibus, antice truncatis, 1-fl. stipite hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 5. f. 7. Plum. amer. tab. 47. fil. tab. 55.*

In America.

Stipites 3-ped. nigri, pulvisculo denso, rufescente obfiti. Pinnæ alternæ, ped. in pinnulam satis longam, acuminatam, dentatam desinentes. Pinnul. alternæ, contiguæ, glabræ, satore virentes, pollice paulo breviores, margine inferiore incurvæ.

17. *crissatum*. A. frondibus bipinnat. pinnis infimis 2-partit. pinnul. lunatis, superne multifloris. *Syst. veg. ed. 14. Plum. amer. tab. 46. fil. 97. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 55. f. 1.*

In Amer. meridion.

Stipit. 4-5. nigri, 2-3-ped. Pinnæ alternæ, distantes, acutissimæ. Pinnul. per totam longitudinem alternæ, glabræ, unguæ digiti indicis amplitudine, Trapezii figura.

18. *fureatum*. A. fronde bipinnata; pinnis sæpius bipartitis, linearibus; linea fructificationis unica. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Filicula &c. *Pluk. mant. tab. 350. f. 4.*

Ad cap. 6. Spei; & in insula Helena.

Stipes 2-ped. lævis. Foliol. alterna, alterne pinnata, elongata. Pinnæ integerrimæ. Fructific. in laciniis pinnarum ad marginem ipsum superiorem, in cuius medio membranæ, duæ laciniæ quasi finduntur. *An huc spectet?*

19. *cafferum*. A. frondibus bipinnatis; pinnis ovatis, incisedicularis, subtus paleaceis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. 6. Spei.

Frons tota dense oblecta villositate paleacea. Pinnæ argute, & profunde serratæ.

20. *frangrans*, A. frondibus bipinnat. pinnis ovatis, sublobatis, obusis, subtus nudis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Gallia australi.

Statura P. fragilis. Recens siccatum fragrantissimum. Stipes atro-purpur. lævis, versus basin paleis helvolis. Frons palmar. lævis. Pinnæ oppositæ, sessiles, læves.

21. *truncatum*, A. frondibus decompositis: foliolis pinnatis; pinnis alternis, cuneatis, subfalcatis, truncatis, integerrim. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 66. f. 4.*

In India.

Stipes sulcatus, angulosus. Pinnæ sessiles, angulo inferiore mucronato.

*** *Fronde supradecomposita.*

22. *clavatum*, A. frondibus supradecompositis: pinnis alternis; pinnulis cuneiformibus, integerrim. alternis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 14. f. 7. Plum. amer. tab. 30. f. B.*

Filicula &c. *Plum. fil. tab. 101. f. B.*

In Dominica.

Rad. P. vulgaris. Stipit. subsemipedal. e viridipallentes. Pinnul. minimæ, modo integræ, modo 2-fid. pallide virides.

23. *aculeatum*, A. frondibus supradecompositis: pinnis palmatis, multifloris: stipite aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 94. Pet. fil. tab. 11. f. 6.*

Filix &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 61.*

In Jamaica, Dominica &c.

Rad. reptans. Stipit. farmentosi, lignosi, nigri, ramis longissim. oppositis, aut alternis, flexuosis, sicuti ramusculi. Pinnul. A. vulgaris similes, sed minores.

24. *trapeziforme*, A. frondibus supradecompositis; foliol. alternis; pinnulis rhombeis, incis. utrimq. fructificantibus. *Syst. veg. ed. 14. Plum. fil. tab. 95. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 59. bona. Pluk. aim. tab. 254. f. 1.*

In Amer. meridian.

Tota pinnular. facie, & substantia A. vulg. similima hæc species, sed ma. ramosior, & foliosior. Stipit. 3-ped. Rami flexuosi, nigri, nitidi. Pinnul. alternæ, petiol. trapeziform. glabræ, nudæ.

25. *hexagonum*. A. frondibus supradecompositis; pinnul. sexan-
gularibus, emarginatis, integerrimis: utrinq.
unifl. *Syst. veg. ed. 14. Pet. fil. tab. 10. f. 2.*
In America.
26. *pteroides*. A. fronde supradecomposita: pinnul. ovatis, in-
tegris, crenulatis: stipite laevi. *Syst. veg. ed.*
14.
Ad cap. b. Soci.
Stipes spitham. purpur. Pinnul. striis exaratae:
squamulis albis totidem, quot crenulae, fudi-
ficationes aperientes.
27. *æthiopi-
cum*. A. frondibus supradecompositis; pinnulis rotun-
datis, integris, crenulatis; petiolulis capilla-
ribus. *Syst. veg. ed. 14. Fluk. atm. tab. 233.*
f. 2.
Ad cap. b. Spei.
Stipes palmar. fusco-purpur. Petioli capillares.
Pinnul. 2. lin. longae.
-
- sagittatum*. A. frondibus simplicibus, sagittatis, stipitatis.
Aubl. Guian. tab. 366.
In Guiana 24.
Rad. reptans. Frondes 5-6. stipite nigricante,
lucido.
- lunulatum*. A. fronde simplici; pinnis alternis, petiolatis,
lunulatis, striatis, margine 5-fido, multifi-
dis. *Burm. Ind. Pet. gaz. tab. 54. f. 10.*
In Java, & Malabara.
- fuscum*. A. frondibus pedatis: fol. pinnatis; pinnis rhom-
beo-rotundatis, sub 4-fl. *Retz. Obs. fasc. 2.*
tab. 5.
In China.
Filix pulcher, similis *A. pedato*, sed fusco nigri-
cans, margine saepe 4 fid. etiam 5-8 fid.
- incisum*. A. fronde pinnata; pinnis alternis, sessilibus,
semiovatis, superne incisis &c. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
Singulae pinnæ lobi 2. prope rachin, saepe solæ
floriferae; quandoq. reliquæ.
- Guianense*. A. fronde pinnata; pinnis oppositis; pinnul. re-
niformibus. *Aubl. Guian. tab. 365.*
In Guiana 24.
Rad. repens, nigra. Frondes 2-ped. & ultra,
longe petiolat. impari-pinn. pinnis remotis,

suboppositis, subsessilibus, superioribus minoribus.

- chinense*. A. frondibus decompositis; pinnis alternis; pinnul. pinnatifidis; lobis 2 fid. obtusis. *Burm. Ind. Pluk. phyt. tab. 4. f. 1.*

In India.

- denticulatum*. A. frondibus decompositis: pinnis alternis; lobis inferioribus pinnatifid. superioribus lanceolat. denticulatis. *Burm. Ind. Pluk. phyt. tab. 180. f. 4.*

In India.

1410. TRI- Fructificat. solitar. stylo setaceo terminatæ, mar-
CHOMANES. gini ipsi frondis intertæ.

* *Fronde simplici.*

1. *membranaceum*. T. frondibus simplicibus, oblongis, laceris. *Syst. veg. ed. 14.*

Phyllitis &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 27. f. 1.*

Adiantum &c. *Pet. fil. tab. 13. f. 5. Plum. amer. tab. 50.*

Filix &c. *Pluk. phyt. 285. f. 3.*

In America.

Facies Hepaticæ vulgaris. Rad. reptans. Fol. imbricata, totam rupem operiunt, fig. ventilabri extensi, dimidii digiti magnitudine, tenuia, pulchre viridia, denticulis inflexis, veluti *Adianti vulgaris*.

2. *crispum*. T. frondibus pinnatifid. lanceolat. pinnis parallelis, subserratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Polypodium &c. *Plum. fil. tab. 86.*

Darea &c. *Pet. fil. tab. 11. f. 8.*

In Martinica.

Rad. *Polypodii vulg.* Frond. 4-5. *Polyp. vulg.* sed delicatiores, læte virentes, ambitu plicis quibusdam veluti totidem denticulis, rotundis crispo.

3. *polypodioides*. T. frondibus lanceolat. pinnatifid. repandis: fl. terminalibus, solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

In India.

Frons digiti longitudine, & latitud. lobis lanceol. obtuse serratis, apice acutis. Frons pellucida, venis alternis.

** *Fronde composita.*

4. *hirsutum*. T. frondibus pinnatis: pinnis alternis, pinnatifidis pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Filicula &c. *Plum. fil. tab. 50. f. B.*
 Dareæ &c. *Pet. fil. tab. 15. f. 5.*
In America.
 Tota planta densis pilis, brevissimis, hirsuta. Frond. 4 pollic. longæ, 2-latæ. Pinnul. lanceol. obtusiuscul. sensim breviores.
5. *pyxidiferum*. T. frondibus subbipinnat. pinnis alternis, confertis, lobatis, linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
 Filix &c. *Plum. fil. tab. 50. f. E. Ray. Angl. 3. tab. 3. f. 3. 4.*
 Dareæ &c. *Pet. fil. tab. 13. f. 13.*
In America, Anglia.
 Rad. per muscosos cespites longe reptans. Frond. 4-5. pollic. longæ, sesquipoll. latæ, vesiculas pyxidem referentes, inter sinus loborum gestantes.
6. *tumbrigen-
se*. T. frondibus pinnatis; pinnis oblongis, dichotomis, decurrentibus, dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Adiantum &c. *Pluk. alm. tab. 3. f. 5. 6.*
 Muscus &c. *Bocc. mus. 2. tab. 2. f. 1.*
In Anglia, Italia, Jamaica.
 Frond. dimidium palmum longæ, 2-3-raro 4-fid. Globuli seminales inter valvulas duas foliaceas.
7. *adiantoides*. T. frondibus pinnatis: pinnis entiformibus, acuminatis, inciso-ferratis, ferraturis 2-3-fid. *Syst. veg. ed. 14.*
 Adiantum &c. *Pluk. alm. tab. 123. f. 6.*
 Filix &c. *Burm. Zeyl. tab. 43.*
In India, Africa.
 Planta alba, & erecta, stipite simpl. purpurasc. Pinn. longissimæ; infer. oppositæ, crebræ; superior. alternæ, in medio remotæ, in apice denuo crebræ.
8. *frigidum*. T. frondibus bipinnatis: pinnul. rhombeis, serratis, pilosis: fructificationibus solitar. infra ferraturas. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
 Valde affinis Polypolio. Stipes tomentoso-strigosus. Pinnæ entiform. Differt ab Adianto viloso, fructificationibus sparsis, solitariis sub serraturis.

*** *Fronde supradecomposita*.

9. *scandens*. T. frondibus supradecompositis; foliol. alternis; pinnis alternis, oblongis, serratis. *Syst. veg. ed. 14.*
Adiantum &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 58. Plum. fil. tab. 93.*
Darea &c. *Pet. fil. tab. 12. f. 5.*
In America.
 Planta vasta. Stipit. super caudices arborum scandentes, longissimi, nigri, villosi. Rami longissimi, ramosissimi, innumeris pinnulis præditi, quorum singuli alterna ducuntur serie. Pinnæ semiped. & ultra. Pinnul. alternæ, vel oppositæ, pollic. longæ, 4. unc. fere latæ, laciniis angustis, & obrutis.
10. *chinense*. T. fronde supradecomposita; foliol. pinnisq. alternis, lanceolatis; pinnis laciniis cuneiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. 6. Pluk. phyt. tab. 4. f. 1.*
In China.
 Rad. vix villosa. Stipes lævis, antice subcanaliculatus, sed margine obruso, nec marginato, ut in sequenti. Frons ped. lanceol. ex fol. alternis, lanceolatis. Pinnæ alternæ, pinnatifid.
11. *canariense*. T. frondibus supradecompositis, 3-part. foliol. alternis; pinnis alternis, pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*
Filix &c. *Pluk. alm. tab. 2. 291. f. 2.*
b. Filix &c. *Magn. hort. tab. 79.*
In Canariis, Lusitania, ad latera montium.
 Frond. dodrant. & ultra. Stipes niger, rigidus; ramosus. Pinnæ oppositæ, vel alternæ, simil. A. nigro *Offic.* sed obtusiores.
12. *japonicum*. T. frondibus supradecompositis; pinnulis acutis, inciso-trifidis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
 Stipes distortus, sulcatus. Frons glabra. Frons æstificat. solitar. in ultimis laciniis intra margines; membrana tenuissima, alba.
13. *capillaceum*. T. frondibus supradecompositis; pinnis filiformibus, linearibus, unifloris. *Syst. veg. ed. 14.*
Adiantum &c. *Plum. fil. tab. 99. f. D. Pet. fil. tab. 10. f. 7.*
In America.

Frons tota constat capillis tenuissimis, undosis, ramulosis, veluti parvam caudam efformantibus, ad truncos arborum.

nivea. T. fronde simplici; pinnis alternis, ovato-sinuatis, subtus albicantibus. *Burm. Ind. Sloan. Jam. tab. 34. f. 1.*

In Jamaica.

pennifolia. T. frondibus supradecompositis; pinnis inferioribus alternis, pinnatifidis, superioribus oppositis: fol. lanceolat. incis. *Burm. Ind.*

b. Dryopteris &c. Ranaph. amb. 6. tab. 34. f. 2.

In India.

Differt fol. latioribus, & angustioribus.

1411. *MARSILEA*. Fl. masculi supra frondein.

Fructificat. femin. ad radicem, subrot. 4-capsul.

1. natans. M. fol. oppositis, simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Ad. gail. 1762. tab. 29. f. 1. Ad. pal. vol. 3. tab. 21.*

Salvinia &c. Mich. gen. tab. 58.

Lens palustris &c. Bauh. hist. 3. p. 785.

In lœtior siccis paludosis stagnantibus, lente fluentibus; in Amer. meridion. 24.

Rami natantes. Fol. subpetiolata, punctata, bifida, ovata, complicata, læte viridia, adspersa supra glomerulis, e filamentis 4, albis, apice cirrholis: inter radic. globi 3-7. Stylo instructi, polyspermi.

2. quadrifolia. M. fol. quaternis, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lenticula &c. Mapp. alsat. tab. 166.

Lens palustris &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 4.

f. 5. Bauh. hist. 3. p. 789. Cam. epit. 853.

In India, Sibiria, Gallia &c. fossis 24.

Caul. longus, transversus. Petioli floriferi, & foliosi, primum spirales, dein erecti gerunt pedicellos floriferos. Caps. edentulæ.

3. minuta. M. fol. quaternis, denticulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

b. M. cormandelina. Burm. Ind. tab. 62. f. 3.

In India orient.

Simil. priori; a qua differt, caule rigidior, minore, uti tota planta; fol. septuplo minoribus, denticulato-crenulatis; capsul. futura dorsali ad basin bidentatis, compressis, lævibus.

CRYPTOGAMIA FILICES. 143

b. minutissima, fol. integerrim. & nonnullis denticulatis.

auriculata. M. (Salvinia) fol. subrotundis, ad basin auriculatis: peduncul. fl. femin. villosis, erectis, & multilobis. *Aubl. Guian. tab. 367.* +

In Gatana.

Planta natans. Cauliculi radicales, nodosi, pilosi. Fol. opposita, breviter petiolat. margine reflexo, subtus pallide virentia, tomentosa, supra rufescentia, lineis parallelis, leviter incurvis.

1412. PILULARIA. Fl. masc. ad latus frondis in linea pulverulenta.

Frustrific. femin. ad radicem, globosa, 4-locul. polysper.

1. *globulifera*. P. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 223. *Vuill. parif. t. b. 15. f. 6. Dill. musc. tab. 79. f. 1. Juss. Aë. 1739. tab. 11.*

Graminifolia &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 49.*

Gramen &c. *Pet. herb. tab. 19. f. 8.*

Muscus &c. *Pluk. alm. tab. 48. f. 1.*

In Europæ inundatis, & paludosis.

Planta exigua, per terram repens, fol. capillaceis. In als folior. globuli sessiles, granorum *Piperis* magnitudine, seminibus albis referti &

1413. ISOETES. Fl. masc. Anth. intra basin frondis. Fl. fem. Caps. 2-locul. intra basin frondis.

1. *lacustris*. 1. fol. tubulatis, semiteretibus, recurvis. Syst. veg. ed. 14. It. Scan. tab. 419. Fl. Dan. tab. 191.

Calamaria &c. *Dill. musc. tab. 80. f. 2.*

Subularia &c. *Ry. angl. tab. 20.*

In Europæ frigidæ fundis lacuum.

2. *Coromandeliana*. 1. fol. filiformibus, erectis, glabris. Syst. veg. ed. 14.

In Coromandeli locis humidis, tempore pluviæ submersis.

Simil. priori, sed maior. Bulbus constat basibus petiolorum dilatatis, membranaceis. Fol. fere pedalia, non semiteretia.

MUSCI.

414. LYCO-
 PODIUM. **C**aps. subrotund. vel reniform. nudæ; axillar.
 sessil. vel spicaræ, peduncul. acalyptratae, ci-
 liis, & operculo 2-valv. pollinem inflammabi-
 lem emittentes.
1. *linifolium*. L. fol. alternis, remotis, lanceolat. fl. axillari-
 bus. *Syst. veg. ed. 14.*
Selago &c. Dill. musc. tab. 57. f. 5.
Muscus &c. Plum. fil. tab. 166. f. C. B.
In Amer. meridion.
Muscus grandis. Surculus parum ramosus. Fol.
Linaria.
2. *nudum*. L. fol. subnullis: spicis dichotomis: fl. distanti-
 bus. *Syst. veg. ed. 14.*
Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 64. f. 4.
Muscus &c. Plum. fil. tab. 170. f. A. A.
In Indiis.
Caul. erectus, fere lignosus, 4-gonus. Fol. sem-
potius spinulæ, minimæ, acutæ, remotissimæ,
alternæ. Rami terminal. erecti, triquetri. Pe-
dunc. breviss. laterales, alterni, 1-fl. apice
2-dent.
3. *Phlegma-*
ria. L. fol. verticillato-quaternis: spicis terminalibus,
 dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab.*
61. f. 5.
Selago &c. Breyn. cent. tab. 92. Hors. mal. 12.
tab. 14.
In Malaburia, Zeylona.
Surculus altus, dichotomus. Fol. horizontalia,
sessilia, ovata, acuta, rigida. Spinæ longæ,
filiform. imbricatæ.
4. *clavatum*. L. fol. sparsis, filamentosis: spicis teretibus, pe-
 dunculat. geminis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.*
tab. 126. Black. tab. 535. Zorn. ic. pl. cent. I.
tab. 54. Dill. musc. tab. 58. f. 1.
Muscus &c. Pluk. alm. tab. 47. f. 8. Moris. hist.
3. f. 15. tab. 5. f. 2. Pluk. phyt. 47. f. 8.
In Europæ sylvis muscosis, collinis, & montanis
24.
Surculus longe reptans, ramosus. Fol. imbrica-
ta, compressa, lineari-acumin. Camphoratae la-
tiora,

tiora, in longum pilum canescentem terminata, sæpe curva, viridia. Spicæ clavatæ, dense congestæ, per ætatem hispidae.

5. *rupestre*. L. fol. sparsis, filamentosis: spicis terminalibus, 4-gonis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 63. f. 11.*

Muscus &c. *Pluk. alm. tab. 100. f. 2. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 4.*

In Virginia, Canada &c.

Surcul. repens, 2-3-4-unc. rubiginosus. Rami breves, crebri, alterni. Fol. crebra, brevia, angusta, pilo oblongo, incano terminata. Spicæ primo ex incano-glaucæscences, dein ex incano rufescent.

6. *Selagino-ides*. L. fol. sparsis, ciliatis, ovato-lanceolat. spicis solitar. terminalibus, foliosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 70. Hall. helv. n. 1717. tab. 45. f. 1. Dill. musc. tab. 68. f. 1. Dill. it. alp. 1. tab. 6. f. 1.*

In Europæ pascu. muscæst. alpium 24.

Surcul. repens, ramosus. Fol. imbricata, sessilia, infra medium denticulata, glabra, luteo-viridia, nitida; super. mæ: & latiora. Capsul. axillar. frequentes.

7. *alopeuro-ides*. L. fol. sparsis, ciliatis, linearibus: spicis terminalibus, foliosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 62. f. 8.*

Muscus &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 12. In Virginia, Canada.*

Flagellis reptat, quæ palmaria, usque sesquipedal. parum subdivisa, quandoq. erecta. Fol. crebra, acuta, juniperina, viridia. Spicæ crassæ, virescentes. In flagellorum apice radices.

8. *inundatum*. L. fol. sparsis, integerrimis: spicis terminalibus, foliosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 336. Vuill. parif. tab. 16. f. 11. Dill. musc. tab. 62. f. 7.*

In Europæ inundatis.

Surculi teretes, ramis incurvis, toti foliis tecti: Fol. lanceol. gracilia, tenera, pallida; in caule florifero erecta; in sterili ad alterum latus flexa. *Differt a L. officinali defectu pili &c.*

9. *Selago*. L. fol. sparsis, octofariis: caul. fastigiato, erecto, subdichotomo: 8. sparsis. *Syst. veg. ed. 1. Tom. VI.*

14. *Fl. Dan. tab. 104. Dill. musc. tab. 36. f. 1.*

Muscus &c. *Morif. hist. 3. f. 13. tab. 5. f. 9.*

In Europæ borealis sylvis acerosis, montanis, & alpinis 14.

Surcul. semiped. basi procumbens. Fol. lanceolat. acumin. hinc cava, inde dorso eminente: per ætatem laxantur, reflectuntur, & plantæ faciem mutant. Gemmæ axillar. cum capsulis mixtæ.

10. *obscurum*. L. fol. sparsis, decurrentibus: sarmentis repentibus: furculis erectis, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 67.

In Philadelphia.

Sarmenta dichotoma, at non fastigiata, ramis lateralibus, scilicet brevioribus. Fol. rara, rigidiuscula, linearia, acuta.

11. *annotinum*. L. fol. sparsis, quinqueforis, subserratis: furculis annotino-articular. spicis terminalibus, (sessilibus) erectis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 127. Dill. musc. tab. 63. f. 6.*

Muscus &c. *Morif. hist. 3. f. 13. tab. 5. f. 3. Pluk. alm. tab. 205. f. 5.*

In Europæ nemoribus subalpinis 14.

Surculi longi, quandoq. cubital. repentes, ramis erectis. Fol. linear. acuminata, dentata, glabra, demum patula, aut reflexa. Spicæ ovato-lanceolat. imbricatæ, aristatæ, margine dentato.

12. *cernuum*. L. fol. sparsis, curvatis: caule ramosissimo: spicis nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 63. f. 10. Burm. Zeyl. tab. 66.*

Muscus &c. *Pluk. alm. tab. 47. f. 9. Morif. hist. 3. f. 13. tab. 5. f. 6. Pluk. alm. tab. 431. f. 3. Plum. fil. tab. 165.*

Bellon-pathia. Hort. mal. 12. tab. 39.

In Indis.

Planta 1-fesquiped. Surcul. inferne lignosus, fuscus, ramis alternis, inde oppositis, ramuscul. contortis. Fol. creberrima, capillacea, sursum convoluta, ut crispæ adpareant rami. Spicæ breves, sessiles, viridi-sublutæ.

13. *Bryopteris*. L. fol. sparsis, imbricatis: ramulis convolutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. *Dill. musc. tab. 66. f. 11.*

L. imbricatum. *Forsk. Æg. monente Vahl.*

Mucos &c. *Morif. hist. f. 15. tab. 7. f. 51. Pluk. alm. tab. 100. f. 3.*

In India.

Planta pedali, unum tantum, vel alterum ramum apice emittens. Spica fl. densa, terminatis. Sram. purpurascens.

14. *sanguinolentum.* L. fol. quadrifariis, imbricatis: caulibus repentibus, dichotomis: spicis sessilibus, tetragonis. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 2. p. 363. f. 26.*

In Camuschatka.

Surculi diffusi, fature purpurei. Fol. subovata, apice triquetra, margine, & dorso carinata, scabra. Spicæ sessil. oblong. purpureæ.

15. *alpinum.* L. fol. quadrifariam imbricatis, acutis: caulibus erectis, 2-fid. spicis sessilibus, teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 79. Fl. Lapp. tab. 11. f. 6. Dill. musc. tab. 58. f. 2.*

In alpinis Lapponiæ, Helvetiæ &c. 2.

Surculi longe repentes, ramosi, ramis fasciculatis. Fol. crassula, lanceol. subflava, odore grato. Spicæ ovato-lanceol. imbricatæ, ciliatæ.

16. *verticillatum.* L. fol. quadrifariis approximatis, acerosis; ramis dichotomis: fl. axillar. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In sylvis insulæ de Bourbon.

Fol. subpatula, glaberrima. Rami ultimi longi, filiformes. Fl. axillar. *Refert Lycopodia Selaginoides.*

17. *Gnidioides.* L. fol. ternis, imbricat. lanceolat. obtusis, glaberrimis: caule dichotomo; ramis elongatis: fl. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In loco dicto Isle de France.

18. *complanatum.* L. fol. bifariis, connatis; superficialibus solitariis: spicis geminis, peduncularis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 78. Dill. musc. tab. 59. f. 3. an tab. 60. f. 4?*

Savina sylvest. Tragi. 554.

Mucos &c. *Bauh. hist. 3. p. 759.*

Chamæcyparissus. Tabern. 945.

In Europæ, & Amar. septentr. sylvis acerosis, ætatis 24.

Surculi: dichotomus, foliol. laxis, & decurrentibus, squamosis. Ramorum fol. in tres series longitudinaliter ordinata. Peduncul. semel, & hic dichotomus, sustinens totidem spicas.

19. *carolinianum*. L. fol. bifariis, patulis; superficialibus solitar. scapis longissimis, monostachyis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 62. f. 6.*

In Carolina.

Pinnæ utrimq. nervo tenui iunguntur glabræ, subpellucidæ, dilute virides. Fol. breviora, 1-2-unc. Pedunc. longi, palmar. & ultra, ligulis capillaceis, inferne alternis, superne binis, ternis, quaternis. Spica longa.

20. *helveticum*. L. fol. bifariis patulis; superficialibus distichis: spicis (plerumq.) geminis, pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 196.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 64. f. 2.

Muscus &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 34.

In alpinis Helvetiæ &c., pascuis subhumidis &c.

Fol. alia elliptica, furculi filo incumbentia; alia patula, lateraliter. Spicæ sunt ramuli surrecti, foliolis laxioribus, & decurrentibus. Spicæ quandoq. simplices, raro trifidæ.

21. *denticulatum*. L. fol. bifariis; superficialibus imbricatis: furcul. repentibus: fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 66. f. 1. A.

Muscus &c. Clus. hist. 2. p. 249.

In Lusitania, Hispania &c.

Videatur var. prioris. Etiam spicæ iuniores densæ; in adultis laxæ, & in prælongos, raroque furculos dissolutæ. Rubor frequens in utraq. planta.

22. *apodum*. L. fol. bifariis, alternis, minoribus: caul. repente: spicis sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 64. f. 3.

In Carolina, Virginia &c.

Rami breves, simplices, alterni. Fol. rariora, teneriora, pellucida, viridia, oblongo-rotunda, quibus altero latere minus folium adponitur, & hoc semper alternatim. Spicæ breves, & squamis brevioribus, & laxioribus conflatæ, virides, geminæ, quandoq. solitariae.

23. *flabellatum*. L. fol. bifariis; superficialibus distichis: caul. erecto, tereti. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 65. f. 5.

Muscus &c. *Plum. amer. tab. 24. fil. tab. 43.*

In Amer. calidiore.

Surcul. solitarius, rectus, pedal. lignosus, viridis. Fol. creberrima, denticulata; caulina angustiora, & pinnatim disposita, glabra, saturata viridia. Quæ pinnæ committuntur, series folior. minutissimorum. Spicæ acute quadrangulæ.

24. *canaliculatum.* L. fol. bifariis; superficialibus distichis: caul. erecto, canaliculato. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 63. f. 6.

Muscus &c. *Pluck. amalth. app. tab. 453. f. 8.*

In Amboina.

Amplior species hæc priore. Fol. rariora, & angustiora. Spicæ axillar. & terminal.

25. *plumosum.* L. fol. bifariis patentibus; superficialibus semiovatis, ciliatis: furculis erectiuscul. spicis terminalibus, sessilibus 4-gonis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 66. f. 10. ap. f. 8? & f. 9?

Muscus &c. *Plum. amer. tab. 24. fil. tab. 43.*

Planta muscosa &c. *Breyn. cent. 1. tab. 101.*

Habitat . . .

Surcul. albo-flavescens, ramis alternis, ramulosis, dichotomis. Fol. dentata, rigida, viridia, squamæ in caule ma. in ramis minores.

26. *ornithopodioides.* L. fol. bifariis, patentibus; superficialibus distichis: furculis repentibus: spicis sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycopodioides &c. Dill. musc. tab. 66. f. 1. B. In India.

Pinnul. creberrimæ, sed alternæ, planæ, pellucidæ, teneræ. Squamæ parvæ. Spicæ terminales, parvæ, sessiles, quadrangulo-teretes, e squamis rarioribus, carinatis conflatæ.

27. *circinale.* L. fol. bifariis; superficialibus geminis: ramulis convolutis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 67. f. 11.*

Muscus &c. *Pluk. alm. tab. 100. f. 3. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 51.*

In Brasilia.

Planta inter Muscum, & Filicem media, 1-fesquipalm. ramosa. Rami, & ramuli circinales, ut in Filicibus nuper erumpentibus, pinnati. Surculi duri, a foliolis deciduis veluti squamam,

2. unc. a rad. distantia nudi. Rami longiusculi, compressi, mucosis foliolis, supra viridibus, subtus e viridi-aureis, quasi sericeis. Rami inferior. oppositi; super. alterni.
28. *serratum*. L. fol. quaternis, lanceolat. ferratis: fl. axillari-
bus, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 38.*
In Japonia.
Caul. inferne decumbens, apice erectus, dichotomus. Fol. imbricata, recurva, glabra.
29. *japonicum*. L. fol. sexfariis, integris: caul. radicante. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
Caul. repens, vel scandens, ramosus, teres, glaber. Fol. lanceol-subulata, imbricato-patula, glabra.
-
- dichotomum*. L. *Jacq. hort. 3. tab. 45. amer. ed. 2. piñ. tab. 253.*
In editorum montium Martinicensium locis udis.
Planta 1-2-ped. erecta, perfecte dichotoma, ramosa. Fol. linear. longe acumin. patula, vel erecta, integerrima, glabra. Fl. axillar.
- radiatum*. L. *Aubl. Guian. Dill. musc. tab. 65. n. 7.*
In Guiana.
2415. *PORELLA*. Anth. multilocul. foraminosa, non operculata. Calyptra nulla.
1. *pinnata*. P. pinnis obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 68. f. 1.*
In Pennsylvania.
Rami alterni. Fol. alterna, concava, pellucida, viridia. Capf. axillar.
2416. *SPHAGNUM*. Calypt. infra capsulam fugax. Capf. globosa, orificio integro, nudo.
2. *palustre*. S. ramis deflexis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 474. Dill. musc. tab. 32. f. 1. b. f. 2.*
Musci &c. *Pluk. phyt. 101. f. 1. alm. tab. 101. f. 4. f. 1. Vuill. parif. tab. 23. f. 3.*
In Europa paludibus montanis 24.
Magni cespites ex furcul. ramosis, & mollibus, quorum apices terminantur ramulis in orbem aggregatis, & deflexis. Fol. ovata, carinata, reticulato-punctata, glauco-virid. pellucida, caulem totum, ramosque tegentia, imbricata,

sæpe rufescentia. Capicula magna, erecta, ovata, fusca. Anth. dissiliunt cum sono, & crepitu.

2. *alpinum*. S. subramosum, erectum. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 32. f. 3.

In Angliæ summis alpium paludibus.

E denso cespitè arcte stipato nascuntur surculi digital. erecti, simplic: in medio 2-3-fidi. Fol. longa, angusta, cuspidata, recta, rigidiutcula; inferiora, & media col. fusco; super. sat-ure viridia. Caps. ovata.

An Bry species?

3. *arboresum*. S. ramosum, repens; anth. lateralibus, secundis. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 32. f. 6.

In Europa, super truncos arborum.

Cespes ex surcul. repentibus, ramis ramosis. Fol. crebra, brevia, triangula, concava, col. viridi-nitente, Musci serici facie.

- nemoreum*. S. ramis deflexis: peduncul. lateralibus: capsul. campanulat. Scop. Fl. Carn.

Inter saxa, & arbores alpium.

Differt a S. palustri, loco natali, minime paludoso; seta una, vel binis lateralibus; peduncul. sub capsula inerassato: foliol. angustis, lanceolat. acuminatis. Cæterum facies, & color squamarum idem.

1417. PHASCUM. Anth. operculata, ore ciliata. Calypt. minuta. Differt a Sphugno ora ciliata, operculo acuminato testâ.

1. *peduncula-tum*. P. caule; anthera pedunculata. Syst. veg. ed. 14.

Bryum &c. Dill. musc. tab. 44. f. 5.

In Europæ ericetis humidis.

Fol. ovato-lanceol. in rosulam disposita. Setæ unc. firmæ, flavæ. Caps. erectæ, filiform. Cilia magna, patula. Anth. inferne nigricans.

2. *acaulon*. P. acaule; anth. sessili: fol. ovaris, acutis, conniventibus. Syst. veg. ed. 14. Schreb. phasc. tab. 1. f. 1. 2. b. f. 11. 12.

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 27. f. 2.

Sphagnum &c. Dill. musc. tab. 32. f. 11. b. f. 12.

Muscus &c. Pet. gaz. tab. 95. f. 14.

In Europa agris, hortis, & ad fossat.

Cum sit calyptratum, Bryis potest adsociari. Surculi simplic. vel ramosi. Fol. concava, pellucida; iuniora in bulbi speciem disposita; inde exteriora explicantur; interiora porro connivent. In media rosula capsula ovata, col. aurantiaco; operculo superne breviter aristato, non distincto.

h. Mutica differt forma, & nascendi modo, aliisque attributis.

g. subulatum. P. acaule; anth. sessili; fol. subulato-setaceis, patulis. Syst. veg. ed. 14. Neck. Gallob. tab. 1. f. 1. Pollich. pal. c. icone.

Sphagnum &c. Dill. musc. tab. 32. f. 10.

Muscus &c. Vaill. parisi. tab. 29. f. 4.

In Europa ad aggeres, & in agris sub fine hyemis.

Cum sit calyptratum, Bryis potest adsociari. Planta pene omnium minima, gregaria. Surculi 1-2-unc. Fol. linearia, angustiss. in pilum erectum producta. In medio rosulæ caps. cylindrico-ovata, flava, operculo papillari, ac pilis intus circumdato.

h. caulescens. P. caulescens, erectum: fol. lanceolat. alternis. Syst. veg. ed. 14.

Sphagnum &c. Dill. musc. tab. 85. f. 15.

In Pennsylvania.

Surculi semiuncial. Fol. rara, graminea, pellucida, dilute virid. Caps. parva, oblonga.

h. repens. P. caulescens, repens: antheris lateralibus, sessilibus. Syst. veg. ed. 14.

Sphagnum &c. Dill. musc. tab. 85. f. 16.

In arborum truncis.

Planta in varios ramulos divisa, satute viridis. Capitula crebra per ramulorum longitudinem.

Halleri. P. acaule; anthera sessili: fol. interioribus mucronatis. Fl. Frid-isch. Hall. helv. tab. 3. f. 3. Dill. musc. tab. 32. f. 13.

Prope lacus.

Stamen unicum videre licet interiori operculo adfixum, perum extra marginem porrectum, & calyptram manifestam, quæ acu facillime ab operculo separatur.

setatum. P. acaule; fol. ovato-lanceolat. planis, serratis, erectis. Schreb. phasc. tab. 2.

In pratis pinguibus, inundatis.

Minimum fere omnium muscorum. Fol. subinde apice laciniata. Sem. maiora quam in *Polytrichum maximo*.

crispum.

P. foliis stipitiis minutis, diffitis; perichætialibus e lata concava basi longe acuminatis, involuto-contortilibus. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 9.*

In locis pinguibus ad semitas.

Gregatim nascitur. Stip. nunc longior, nunc brevior, & divisus, colore subinde rufo-nigricante. Fl. terminal.

patens.

P. fol. lanceolat. serratis, patentibus: thecæ acumine pellucido. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 10.*

In sylvis umbris.

Gregatim plerumq. nascitur, sed non densis cespitiibus. Stip. valde minutus, dilute viridulus, pellucens. Fol. latiora, & longiora, neque consueto *Phascorum* more, vel theca matura connivent, aut saltem eriguntur, sed patentiuscula. Ductuum fasciculus mediam omnium longitudinem percurrit.

curvicolium.

P. fol. perichætialibus rectis; thecæ pedunculo (plerumq.) incurvato. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 11.*

In nemoribus, & in sabulosis ambulacris horticorum.

Stip. brevissimus, simplex, vel 2-3-4-duplex. Fol. inferiora brevia, ovato-lanceol. fasciculo vasculoso terminali: perichætii lineari-lanceol. fasciculo communiter apicem excedente, obtuso; intima eodem destituta. Peduncul. cæteris speciebus longior. Calyptra exigua, pallida. Theca ovata, matura fusca, maculis profundioribus. Opercul. coloris dilutioris.

1418. FONTINALIS. Capf. sessil. aut breviter pedunculata; operculo, & calyptra conica testâ; perichætio squamoso, membranaceo inclusa.

1. *antipyretica*.

F. fol. complicato-carinatis, trifariis, acutis; anth. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 33. f. 1.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 33. f. 2. Michx. gen. tab. 59. f. 9. Buxb. cent. 3. tab. 69. f. 2. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 32. Læf. pruss. tab. 52.*

In Europæ fluvitis, aquisfrigidis &c.

Surcul. dodrant. ramosi, fluitant. purpur. Fol. alterna, basi latiora, imbricata, extrorsum cava, introrsum convexa, pellucida. Gemmæ foliaceæ, ovatæ. Capf. magna, breviter peduncul. ovato-cylindrica, operculo conico aristato, cilio longo, rubro; calyptra conica.

2. minor.

F. foliis (complicato-carinatis) ovato lanceolat. concavis, trifariis, acutis, passim geminis; anther. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Gunn. norv. tab. 3. f. 2. Dill. musc. tab. 33. f. 2.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 3. f. 5.*

In Europæ fluvitis.

Simil. priori, sed minor. Fol. multo obtusiora, non perinde dense imbricata; in ramis crassiora, gemina. Vagina brevior.

3. squamosa. F. fol. imbricatis, subulato-lanceolat. antheris, lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 33. f. 3. Bauh. hist. 3. p. 778.*

In Helvetia, Gallia &c.

Planta valde strigosa. Surculi minus distiche foliosi. Fol. brevi pilo producta, linea divisa, sature viridia, etiam atra. Gemmæ fol. ovatis. Capf. breviter peduncul. cylindrica. Opercul. aristatum, col. carnei. Calyptra acutissima, corona ciliorum solita, rubella.

4. pennata. F. fol. bifariis, patētibus: antheris lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Hypnum &c. *Hall. helv. tab. 45. f. 2.*

Sphagnum &c. *Dill. musc. tab. 32. f. 9. Hall. helv. tab. 3. f. 2.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 27. f. 4.*

In Helvetia, Germaniæ arboribus, præcipue Quercubus, locis montanis.

Planta pulchra, simil. *Hypno Filicino* fol. compressis. Fol. imbricata, lata, ovata, nitida, lineis transversis. Surculi 3-unc. distichi, ramosi. Gemmæ frequentes, teretes, foliol. ovato-lanceolat. undulatis. Ex his eminent capsulæ sessil. cylindricæ, aurantiacæ.

capillacea. F. fol. confertis, linearibus, canaliculatis. *Lin. Fl. Svec. Scop. Fl. Carn.*

In fluvitis.

Viror obscurus. Fol. inordinata. Setæ cylindro inarticulatæ, tortiles, sulcatæ. Caps. oblong.

1419. BUXBAUMIA. Anih. operculata, hinc membranacea. Calyptra caduca; inter operculum sacculus pollinis. Caps. oval. latere altero oblique plana, orificio denticulato.

1. *aphylla*. B. aphylla; peduncul. elongato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 44. am. acad. 3. tab. 1.*

Musci &c. *Buxb. cent. 2. tab. 4. f. 2. Dill. musc. tab. 68. f. 3.*

In Italia, Germania &c.

Surcul. 2-3. lin. altus, durus, spadiceus, minimis ad basin stipatus setulis. Caps. 3-linear. viridis.

2. *foliosa*. B. acaulis; capsula sessilibi, foliis cincta. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. meth. musc. tab. 1. f. 4. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 14. f. 4.*

Sphagnum maximum. Dill. musc. tab. 32. f. 13. Hall. helv. n. 1723. tab. 46. f. 3.

Habitat in Helvetia &c.

1420. SPLACHNUM. Mares intra stellam diversi individui.

Fem. Caps. cylindrica, erecta, orificio denticulato. Operculum obtusum: receptaculum sub caps. dilatatum, seu gibbum.

1. *rubrum*. S. umbraculo orbiculari, hemisphærico. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 2. tab. 3. f. 2.*

Musci &c. *Pet. musc. tab. 1. f. 10.*

Dill. musc. tab. 83. f. 9. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 10.

In Norvegia, Russia &c.

In planta iuniore umbraculum, seu umbella parva, subviridis, setæ breviores, subter umbellam turgidiusculæ. Deinde caps. ma: & umbellæ ampliores, obscuræ, purpur. setæ, subrubentes. In adulta umbellæ latiores, sat ure rubræ; sicuti setæ. Fol. latiuscula, dilute, & læte viridia, mucronata. Capsul. maturæ ochroleucæ.

2. *luteum*. S. umbracul. orbiculari, plano. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 2. tab. 3. f. 1.*

In Sveciæ paludibus sylvaticis.

Surcul. rectus, longitud. dimidii pollicis. Fol. sparsa; summa dimidiam surculi longitudinem attingentia, obverse ovata cum acumine, in-

tegerima, nitida, pellucida, carinata, patentia, infima quadruplo minora. Anth. ex rubro-fusca; operculo ferrugineo. Umbraculi: primum viride, dein luteum.

- B. sphaericum**. S. receptaculo globoso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. meth. musc. tab. 1. f. 1. Ad. Med. Svec. 1. tab. 14. f. 1.*

Habitat in Lapponia lufensi.

Pedunc. longiss. ex viridi rufus. Caps. minima, operculo obtuso; receptac. viridi.

- B. ampullaceum**. S. umbraculo ampullaceo, obconico. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 822.*

Bryum &c. Dill. musc. tab. 44. f. 3. Vaill. parif. tab. 26. f. 4. Pluk. alm. 246. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 16. f. 10.

In Europæ paludibus cespitosi.

Surculi breves, cespitosi, simplic. Fol. ovato-lanceol. col. *Bryi muralis*. Seta subradicalis. Caps. cylindrica, fig. ampullæ vitreæ. Rosæ foliosæ magnæ. Calypt. brevis, triangular. nitida.

- B. vasculosum**. S. umbraculo ampullaceo, subgloboso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 192. sub nomine S. ampullacei.*

Muscus &c. Buxb. cent. 2. tab. 1. f. 1.

In Sveciæ boreal. paludibus.

- B. angustatum**. S. caulescens: fol. piliferis: peduncul. pilifero, breviss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. meth. musc.*

Habitat in Lapponia.

- 3421. POLYTRICHUM**. *Mares* in stella fol. terminalibus sessili.

Fem. terminalis, & axillaris. Caps. oblonga, orificio dentato. Opercul. gibbum. Calyptra pilosa.

- A. commune**. P. caul. simplici: anth. paralellepipeda. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 375. Dill. musc. tab. 54. f. 1. b. f. 2.*

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 23. f. 8.

b. tab. 23. f. 6.

c. P. pilosum Dill. musc. tab. 54. f. 3.

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 23. f. 7.

In Europæ a uliginosis, & sylvis; b. passuis; c. sterilibus.

Surcul. rectus, 2-unc. ad basin foliosus, superne nudos. Fol. adscendentia, sed facile se convolventia, linearia, ferrata, pilifera, mucrone duro, flavescentia. Calypt. villosa, lacera, inferne alba. Caps. adulta tetragona, vel tetraedra. *Var. furculorum fol. numerosioribus, & rigidioribus.*

- c. *P. pilosum*. Surculus vix semuncem altior. Fol. congesta, in pilum canescentem, & finitatem producta: hi pili, in modula folior. rosula, in pedicillum colliguntur. Seta vix uncial. margine circulari. Rosulae, late coctineae.

2. *magellanicum*. P. caul. simplici: fol. subulatis, canaliculatis, cartilagineo-ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. In frecto Magellanico.*

Simil. priori, sed fol. semper tam in mare, quam in fem. margine cartilagineo serrata.

3. *alpinum*. P. caul. ramosissimo: peduncul. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 296. Dill. musc. tab. 55. f. 4.*

Bryum &c. Hall. helv. tab. 46. f. 6.

In alpidibus Helvetiae, Germaniae &c. sylvis apriciis.

Surculus 1-fesquiunc. ramosus, setis ex summo caule prodeuntibus. Fol. dentata. Vaginae foliosae, virides. Caps. ovata, inclinata.

4. *urnigerum*. P. caul. ramosissimo: peduncul. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 55. f. 5.*

Muscus &c. Vaul. parisi. tab. 28. f. 13.

In Europa, Jamaica, in sylvis alpinis.

Surculi uncial. ramosi. Fol. congesta, acuta; ferrata. Setae axillar. ad originem novorum furculorum. Calyptrae cylindricae, ostio ciliato.

5. *convolutum*. P. caul. folioso: fol. involutis, subulatis, glabris: peduncul. filiformi, brevi; calyptra villosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. meth. musc. tab. 1. f. 3. Ad. Medic. Svec. T. 1, tab. 14. f. 3.*

In insula de Bourbon.

Altitudo dodrantal. Caulis totus foliosus.

- hercynicum*. P. theca erecta, urceolata, calyptra interrupte pilosa, *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 15.*

In Hercynia.

Stip. plerumq. simpl. rubicundus. Fol. e basi latiore membranacea, linearia, carnosia fiunt; infima brevissima, remotiora, pauciora, concava, incurva, apice fornicato, nonnullis margine serrato. Fasciculus ductulorum mediam longitudinem percurrentes, validus, folia sæpe superans; in senio col. fusco-rutilante.

1422. MNIMUM. Anth. operculata. Calyptra lævis, subulata. Fem. capitulum nudum, pulverulentum, remotum.

1. *pellucidum*. M. caul. simplici: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 300. Schmid. ic. 1. tab. 3. optime. Hall. helv. tab. 46. f. 8. Dill. musc. tab. 31. f. 2. Comm. Acad. petrop. 3. tab. 14. f. 2.*

Bryum &c. Hall. helv. ed. pr. tab. 4. f. 2.

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 24. f. 7.

In Europæ pascuis succulentis, umbrosis, subhumidis.

Surculi exigui, super truncum cariosum late sese diffundunt cespitosi. Fol. mucronata, viridia, inde rufescentia, seta pallida. Calypt. bicolor, superne fulva, inferne pallida. Capf. erecta, cylindrica, fulva.

2. *androgynum*. M. androgynum: (cauliculis rosiferis nudis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 299. Dill. musc. tab. 31. f. 1. cat. giff. app. tab. 1. f. A. B. C.*

Muscoides &c. Vaill. parif. tab. 29. f. 6.

Muscus &c. Mich. gen. tab. 59. f. 8. H. K. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 20.

In Europæ sylvis.

Surcul simplic. vel ramosi, surrecti. Fol. non valde crebra, brevia, angusta, acuta, pallide viridia. Capitula pulverulenta primum comparent: altera, quæ sequuntur membranacea, & calyptrata, sed minus obvia. *Var. magnitudine semi-1-2-une.*

3. *ramosum*. M. caul. ramoso, erecto: peduncul. femin. axillaribus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 31. f. 4.*

In Europæ paludibus.

Fol. undiq. multis ordinibus expansa, non disticha, lanceol-subulata. Surculi longi. Ad

fol. passim globuli hirti, subvirides. *Vix differt a priore & palust.*

4. *fontanum*. M. caul. simplici, geniculis inflexo: (erecto; ex vertice multifido). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 298.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 44. f. 2.*

Muscus &c. *Mich. gen. tab. 39. f. 4. Vaill. parif. tab. 24. f. 10. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 8. Pluk. alm. tab. 47. f. 6.*

In Europa, ad fontes paludosos, frigidos.

Planta elegans. Surculi rubiginosi. Fol. ovato-lanceol. patula, laxa, cauli adpressa, aristata, inter quæ inferne rubigo adparet. Pedunc. longi. Capit. magna, inclinata, curva, crassissima, viridis, rufo tincta. Surculi. ubi terminantur rosula folior. luteorum undiq. rigentium.

5. *palustre*. M. caul. dichotomo: fol. subulatis: (capsulis cylindricis, acuminatis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 31. f. 3.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 24. f. 1. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 9. Buxb. cent. 1. tab. 65. f. 1. 2. 3. 4.*

In Europæ paludibus, & ad fontium scaturigenas.

Planta variabil. cespitosa, paludosa, læte virescens. Fol. aut patula, aut rara, aut imbricata, & in conum congesta. Setæ ex divisione surculi, purpureæ. Calyptra striata, flavofusca. Capit. ovata, in senio nutans. Opercul. mamillare, acutum.

6. *hygrometricum*. M. acaule; (fol. ovat-lanceolat. conniventibus) anth. nutante; calypt. reflexa, tetragona. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 648. f. 2.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 52. f. 75. bona.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 16. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 17.*

In Europæ sylvis aprileis, sterilibus; in pascuis ad muros.

Surculus primi anni bulbus est folior. conniventium, rubens: altero anno longius producit, & folia laxantur. Fol. longa, non crispæ, luteo-viridia, nitida, nervo in filum educto, setæ longæ, aurantiacæ. Calyptra inferne lata, superne mucronata,

7. purpureum. M. caul. dichotomo; axillis pedunculiferis; fol. carinatis: anthera erecta. *Syst. veg. ed. 14.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 49. f. 31.*

Muscus &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 16.*

In Europæ pascuis, & sylvis umbrosis.

Cespites virides. Surculi erecti, fol. breviores, apice subramosi; ubi rosula ex fol. lanceolat. sine gracili, filiformi. Setæ ad originem novi rami ruberrimæ. Caps. erectæ, cylindricæ, parum inclinatæ. Opercul. conicum, miniatum, non aristatum. Cilia longa, rubra.

8. setaceum. M. anth. erectis: operculis filiformibus, longitudine antherarum. *Syst. veg. ed. 14. Pollich. pal. 985. cum icone.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 48. f. 44.*

In Europæ muris, aggeribus, sepibus.

Cespitosum. Junius videtur stratus exiguis quasi nodulis, qui totidem sunt rosulæ: adultum, furculi uncial. Aloes similes, fol. lanceolat. repandis. Pedunc. atropurpur. Anth. cylindricæ, lividæ. Opercula, & calyptræ longiores, & angustiores quam in reliquis.

9. cirrhatum. M. fol. arefactione revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 538. f. 4. Pollich. pal. n. 986. cum. ic.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 48. f. 42.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 24. f. 8.*

In Europæ sylvis, & ad sepes.

Cespitosum, minutum, ramosum. Fol. congesta, capillacea, minora priore. Summitates ubi madefit, stellatæ adparent.

10. annotinum. M. fol. ovatis, acuminatis, pellucidis: peduncul. subradicalibus: antheris nutantibus, (dein erectis). *Syst. veg. ed. 14.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 50. f. 68.*

In Europæ humidiusculis.

Surcul. pl. recti, antheriferi. Fol. alterna, incurva. Pedunc. ad basin rubentes.

11. hornum. M. anth. pendulis; pedunc. curvato; furcul. simplici: foliol. (imbricatis, lanceolatis) margine scabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 51. f. 71.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 24. f. 4. 3. Mich. gen. tab. 59. f. 2. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 3. 4.*

In Europæ sylvis, aggeribus, & locis humidis.

Surculi 1-4-unc. ad basin rubicundi, superna foliosi. Fol. pellucida, nervo medio distincto, in brevem mucronem producto. Pedunc. 2-unc. rubri. Caps. magna, inclinata.

12. *capillare*. M. antheris pendulis: fol. ovat-lanceolat. fetiferis carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 50. f. 67.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 24. f. 6. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 19. Magn. hort. tab. 138.*

In Europæ siccis, muris glareosis.

A Bryo æspuitio caute distinguatur. Surcul. 2-unc. ad basin fol. 2-3. cæterum nudi. Fol. punctulata. Pedunc. rubri. Calypt. longa, acuminata.

13. *erudum*. M. anth. pendulis: calypt. recurvata: fol. pellucidis, (intermediis latioribus; summis linearibus). *Syst. veg. ed. 14. Pollich. palat. cum icon.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 51. f. 70.*

In Europæ sylvis, & declivitatibus.

Surcul. semiunc. simplic. punicei. Fol. tenuia, mollia, læte, & pallide viridia.

Ad Bryum referatur.

14. *pyriforme*. M. anth. pendulis, turbinatis: furculo filiformis fl. femineis fetiferis. *Syst. veg. ed. 14.*

Bryum &c. *Hill. helv. tab. 46. f. 7. Dill. musc. tab. 50. f. 60.*

Vebera pyriformis. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 3.

15. *Vebera nutans. Hedw. l. c. tab. 4.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 50. f. 61.*

In Europæ rupibus.

Foliol. longa, capillacea, inplexa, plerumq. dense cespitosa. Seta flava. Caps. cucurbitacea, in medio angustior.

16. *polytrichoides*. M. calyptra villosa. *Syst. veg. ed. 14.*

Polytrichum &c. *Dill. musc. tab. 55. f. 6. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 13.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 15. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 7.*

17. *Polytrichum &c. Dill. musc. tab. 55. f. 7. Hedw.*

Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 14.

Adiantum &c. Vaill. parif. tab. 29. f. 11.

Tom. VI.

L

Muscus &c. *Buxb. cent. 1. tab. 53. f. 1.*

y. *Polytrichum* &c. *Dill. musc. tab. 55. f. 12.*

In Europæ ericetis subadris, & sylvis humidis.

Surcul. semunc. plerumq. simplex. Foliol. inferius sparsa; superius dense collecta, linearia, obtusa, quasi teretia, crassa, rigida, obscure viridia. Seræ luteo-purpur. Calypt. villosa, perula, maior ipsa anih.

Speciat ad Polytrichum hac definitione.

Alloides. P. furculo simplici; seta propria duplo, & triplo brevior.

Surcul. simpl. Fol. juniperina, basi membranaacea, & rufescente caulem ambiunt: rescuta brevis, ad terram sessilis; in adulta stipit. longior. Caps. ovata, ciliata.

16. *serpyllifolium.* M. peduncul. aggregatis: fol. patentibus, pellucidis. *Syst. veg. ed. 14.*

M. punctatum.

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 53. f. 81.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 5. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 39. 40.*

b. *M. cuspidatum.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 53. f. 79.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 18. Pluk. alm. tab. 98. f. 8.*

c. *M. proliferum.*

Bryum stellare &c. *Dill. musc. tab. 52. f. 77.*

Muscus &c. *Buxb. cent. 2. tab. 1. f. 3. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 9.*

d. *M. undulatum.*

Muscus erectus &c. *Buxb. cent. 3. tab. 71. f. 1. & min. f. 2. Vaill. parif. tab. 24. f. 3. Mich. gen. tab. 59. f. 5.*

Bryum &c. *Dill. musc. tab. 52. f. 76.*

In Europa fere ubique, in humidis sylvarum &c.

Surculi ini rubigine obâti: alii prostrati longe repunt, fol. distinctis, ovatis: alii eriguntur breviores, infimis fol. paucis, & exiguis; superioribus magnis, confertis: omnibus pellucidis, viridissimis, subcartilagineis, nitidis, nervo conspicuo, per oras etiam undulatis, non-ferratis. Seræ ex summo furculo pl. erectæ, validæ. Calyptra longa, alba. Caps. ovata, pendulæ. Opercul. longa acu aristatum.

b. Differt præcipue a cæteris var. fol. ovatis, acutis, margine ferratis.

c. Surcul. uncial. nudus. Rosula fol. nitentium, cartilagin. argutissim. oris non ferratis.

Var. min. Dill. musc. tab. 32. f. 78.

d. Differt præcipue surcul. mascul. femin. isq. in distinctis individuis.

17. *triquetrum*. M. fol. tritariis, patulis, subulato-lanceolat. carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Bryum &c. Dill. musc. tab. 51. f. 72.

Meesia longifera. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 21.

b. M. fol. lanceolat. alternis; caps. pyriformibus &c.

Bryum &c. Dill. musc. tab. 15. f. 73. y. f. 74.

Meesia longifera. Hedw. l. c. tab. 22.

In Europæ udis, turficis.

Diagnoscitur frut. prælongis; capsulis pyriformibus, progressu tumentibus. Caul. plurimi. in cespitem congesti, digital. & longiores, tomentosi. Fol. trifaria posita, unde ramuli triquetri, patuli; recentia pallide viridia; antiqua fusca, parva, distantia, acuminata, carinata. Pedunc. terminal. solitar. longiss. purpur. Anth. obtusissimæ, flavæ. Calypt. subulata. Stellæ femin. ramos terminant in eadem planta cum capsula, sed distinctis ramis.

18. *trichomanis*. M. fol. distichis, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 31. f. 5.*

Jungermannia &c. Schiemed. de Junger. f. 1.

In Sveciæ, Angliæ &c. udis.

Tenera planta prostrata, terræ adpressa. Surcul. vix uncial. extremi erecti, & apice nudi subnudent globum pulverulentum. Fol. ovata, subacuta, plana, inferius dense compacta; ad initium furculi minora.

Cum Perichætia frondalis obscondita reperitur ad Jungermanniam spectat.

19. *fissum*. M. fol. distichis, bifidis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 31. f. 6.*

Jungermannia &c. Mich. gen. tab. 5. f. 14.

In Europæ riguis.

Plantula albeticens. Differt a priore fol. bifidis. Ad Jungermanniam spectat. Scop.

20. *Jungermannia*. M. fol. distichis, pinnis subtus auriculatis. *Syst. veg. ed. 14.*

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Jungermannia &c. *Mich. gen. tab. 3. f. 16.*

Lich-nastrum &c. *F. H. musc. tab. 69. f. 1.*

In Europæ subhumidis.

Surcul. filulif. rubri. Fol. subrotunda, concava, deflexa, apice denticulata, non ciliata.

Fol. ol. min. maioribus intermixta.

At Jungermanniam spectat. Scop.

M. (Bryum) fol. lanceolat. laxè imbricatis: capful. cylindric. aristatis. *Hall. helv. n. 1817.*

Dil. 3. lv. tab. 48.

In Helvetia.

Simil. *M. purpureo*, sed fol. laxè disposita, rara, pallida, lanceol. Surcul. nudus: ad ortum nov. rami feta uncia. satore rubra. Capf. erecta, cylindric. basi crassior.

M. (Bryum) fol. lanceolat. laxè imbricatis: capful. cylindric. obliquis; opercul. conicis. *Hall. helv. n. 1818. Dil. tab. 49. f. 2.*

In Helvetia.

Alius priore, unciale; fol. multo longiora: reliqua ut supra.

M. (Bryum) fol. lanceolat. aristatis, stellatis: capful. ovatis, aristatis, refectis. *Hall. helv. n. 1819.*

In rupibus.

Surcul. subnudi, apice stellulam proferunt fol. radicalium, viridium, in capillos exeuntium. St. 2-3 lin. flavescens. Capful. breviores, & crassiores priore.

M. fol. in summo caul. congestis, lanceolat. serratis, crispis: capful. pendul. aristatis. *Hall. helv. n. 1840.*

In Helvetia.

Accedit ad *M. ferrugineol.* sed altius; fol. longis, leviter serratis, per ætatem crispis, maioribus non aristatis; setis longioribus, siccunc. foliariis; calypt. albis, apice viridi; capful. ciliis longis.

Non potest esse M. cuspidatum, cum opercul. non sit acutum.

M. fol. pinnatis, lanceolat. serratis: capful. nutantibus, aristatis. *Hall. Enum. n. 1842. tab. 45. f. 4.*

In montanis.

Surcul. foliosus, fol. continuis, fere pinnat. Fol. etiam crispa. Setæ unica, uncial. inferne purpur. superne pallens. Calyptra conica, alba, mucrone atro. Capf. crassa, recta, dein nutans, ovata, dein cylindric. cinnamomea. Alii furculi fol. rarioribus cincti, erecti gerunt insignes rofulas pulcherrimas, foliolas, patentes, scrobiferas, foliorum ovatorum. Alii furculi longe repunt.

M. fol. lanceolat. aristatis, in apice congestis: capitul. inclinatis; operculo mamillari. *Hall. helv.*

In alpibus.

Surcul. purpur. inter fol. nudus. Fol. tenera, virentia, nitida, non serrata. Setæ ex summo caul. uncial. purpur. cylindr. basi ventricosæ. Capf. virentes, in medio angustiores. Opercul. breve, convexum, album, basi circuli rubro cinctum. Cilia alba. Alii furculi rosas foliosas, aristatas proferunt.

M. fol. ovato-lanceolat. imis patulis; supremis congestis, myosuroides. *Hall. helv.*

In alpium paludosis.

Non reperitur inter Muscos Dillenianos. Proximum M. triquetro. Surculi similes, purpur. inferne rubiginosi. Fol. inferius rara, ovato-lanceol. breviter patula; superne collecta in clavam incurvam, teretem, pilosam.

M. (*Jungermannia*) fol. laceris, multident. sessilibus. *Hall. helv. n. 1861.*

In Helvetia.

Surculi non reptantes, breviss. erecti, lati, stipati. Fol. tridentata, quandoq. lata basi cauli adnexa. In apice furculor. vagina cylindrica, sine lacero, & in ea globulus niger, ex quo in seta argentea, flaccida flos exit niger, 4-fid.

M. (*Jungermannia*) fol. imbricatis, bicuspidat., globuliferis. *Hall. helv. n. 1863. Schwaenck. f. XIV.*

b. *Mich. gen. tab. 5 Q. S. T. &c. globuli farinosi. In humo, & arborum corticibus.*

Surculus prostratus, ramosus, distichus, planus. Fol. tenera, viridissima, profunde excisa, & bifida, semilunari iacitione, utroq. cornu ari-

stato, ad furculum oblique apposita, ut imbricata videantur. In altero minore cornu globulus adest farinosus. Ramuli de medio furculi undiq. erigunt densissim. vaginas laceras, & fetas floriferas.

M. (*Jungermannia*) fol. planis, lanceolat. tridentatis. *Hall. helv. n. 1867. An 66. Mich. gen. f. 14. male depicta?*

In subalpinis.

Surcul. in eodem cum suis ramis plano, *Laures Alexandrinæ* perminutæ similis. Fol. disticha, lanceol. viridia. Ex summis ramis evidentissima in petiolo rosula, sæpe gemina, in qua pollen niger adest.

M. (*Jungermannia*) fol. amplexicaulibus, cristatis. *Hall. helv. n. 1875.*

In Helvetia.

Simile M. *Jungermannia*. Viridissimus, & amplior muscus, furculo ex maximo, primo albo, dein fusco-purpur. Fol. pinnata videntur, in aqua tamen explicata adparent oblique lata basi cauli adnata, ut auriculata videantur. Summi rami in rosulas intumescunt, in quibus vagina ovata, conica sedet; ex qua seta unc. & globuli oblongi, nigri.

1413. BRYUM. Anth. operculata. Calyptra lævis. Filament. & tuberculo terminali ortum.

* *Anth. sessilibus.*

1. *apocarpum*. B. anth. sessilibus, terminalibus; calypt. minima. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 480.*

Sphagnum &c. *Dill. musc. tab. 32. f. 4. b. f. 5.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 27. f. 15. b. f. 18.*

In Europæ saxis, arboribus, locis m. n.avis.

Surcul. cespitosi, subuncial. ramosi. Fol. lanceol. acuta, carinata, hirsuta, viridi fusca, capsulæ circumposita, pilo terminata; alia imberbia; amplexicaulia, triquetra. Opercula coccinea.

2. *striatum*. B. anth. sessilibus, sparsis; calyptris striatis, sursumve pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 537. f. 3. d. tab. 648. f. 1.*

Polytrichum &c. *Dill. musc. tab. 55. f. 8. b. f. 9. c. f. 10. d. f. 11.*

3. *Muscus* &c. *Vaill. parif. tab. 27. f. 10. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 13.*

c. *Vaill. l. c. tab. 26. f. 9.*

In Europæ a. arboribus; b. faxis; c. rupibus; d. sylvis.

Proximum Polytrichis, sed absque apophysi sub anthera. Surcul. vix uncial erecti, ramosi.

Fol. imbricata, ovat-lanceol. striata, glabra, per ætatem crispa. Pedunc. brevissimi.

b. *Calyptra conica, latior, interne lacera, pilis aut nullis, aut paucioribus.*

c. *Surcul. vix unc. ramosi, recti. Fol. imbricata surculos tegunt, ovat-lanceol. glabra, striata, per ætatem crispa. Setæ 2-linear. Caps. junior pyriform. delapso operculo cylindrica. Cilia lata, triangularia, repanda, vergunt in radiorum speciem. Calyptra flava (opercul. aristato), villis conspicuis, sursum rigentibus, longa, cylindrica.*

*** Anth. pedunculat. erectis.*

3. *pomiforme. B. anth. erectis, sphaericis. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 44. f. 1.*

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 24. f. 9. 12. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 6.

In Europæ scopulis humosis, ad muros irriguos.

Surcul. uncial. ramosi, inferne rubicundo tomento obfiti. Fol. conferta, subulata, crispa.

Pedunc. laterales.

Var. 1. fol. laxioribus, & obscurioribus.

2. fol. viridissimis: capitul. maximis.

4. *pyriforme. B. anth. erectis, pyriformibus: calyptra subulata: surcul. subaculibus: fol. ovatis, muticis (pellucidis). Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 337. f. 1. Dill. musc. tab. 44. f. 6.*

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 29. f. 3. Buxb. cent. 1. tab. 64. f. 1. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 16.

In Europæ pratis, ad aggeres, & fſſis humidis.

Rosulæ folior. sessiles, in surculo brevissimo.

Fol. pallida. Caps. turgida. Calyptra simil. calypt. B. extinctorii, in longum cornu producta, inferne lacera.

5. *extinctorium. B. anth. erecta, oblonga, minori: calyptris laxis, æqualibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 45. f. 8. b. f. 9.*

CRYPTOGAMIA MUSCI:

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 1. Magn. hort. tab. 82. Morif. hift. 3. f. 15. tab. 7. f. 12.*

Leertia vulgaris. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 18.

b. Leertia ciliata l. c. tab. 19.

In Europæ arenofis.

Differt a cæteris, calyptra cylindræo-campanulata, extenforii forma, pellucida, albida, margine crenulato, vafculum occultante. Surcul. foliifus, teres. Fol. ovat-lanceol. pellucida, viridula, nervo divifa; fuprema patula. In folo pingui ma. & ramofior.

6. fubulatum. B. anth. erectis, fubulatis: furcul. fubacaulibus. Syft. veg. ed. 14. Dill. mufc. tab. 45. f. 10.

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 25. f. 8. Morif. hift. 3. f. 15. tab. 7. f. 13.

In Europæ aggeribus humidifculis, & pafcuis fylis varum.

Fol. oblonga, nunc latiora, nunc anguftiora, imberbis, patula, in ficca contorta, & crispata, pellucida, pallide viridia, fubcarinata. Capsul. longæ, incurvæ, dein erectæ. Setæ pallide luteifcentes. Calyptræ longæ, fubfufcæ. Opercul. longum, acutum, fubrufum.

7. rurale. B. anth. erectiusculis: fol. piliferis, recurvis. yft. veg. ed. 14. Dill. mufc. tab. 45. f. 12.

Muscus &c. Buxb. cent. 5. tab. 44. f. 1. Vaill. parif. tab. 25. f. 3. Morif. hift. 3. f. 15. tab. 16. f. 12.

In Europæ muris, rufticorum cædis, arborum truncis 24.

Bulbilli fubcylindrici, apice nigri. Fol. elliptica, obtufa, concava, fublutea, aut fufca. Pedunc. annotini, laterales. Capsul. longe roftrata. Differt a fequent. fol. latioribus; pilis produftioribus. Elatius, & ramofius eft. Cespites denfiores. Pedunculi o veteribus furcul. non ex fummis ramis prodeunt.

8. murale. B. anth. erectis: fol. (ovat-lanceol.) piliferis, rectiusculis: furcul. fimplicibus, cespitofis. Syft. veg. ed. 14. Dill. mufc. tab. 45. f. 14.

Muscus &c. Vaill. parif. tab. 24. f. 15. Michx. gen. tab. 59. f. 7. Buxb. cent. 1. tab. 64. f. 4.

b. *Dill.* l. c. f. 15.

Muscus &c. *Buxb.* l. c. tab. 25. f. 4.

In Europæ muris, faxis, tectis, tegulis.

Cespites convexi. Rosula folior. ad radicem sessilis, patula, & in cauliculum succrescens. Fol. cava, læte viridia; nervo in pilum album fluitantem producto. Seta uncial. Capsula longa, cylindrica, fusca, longo cilio rubente; operculo longe aristato.

b. Rosulæ similes. Fol. ovat-lanceol. breviter mucronata. Caps. simil. una cum setis minoribus. Cilia rubra, pariter prælonga.

9. *scoparium.* B. anth. erectiuscul. peduncul. aggregatis: fol. secundis, recurvatis: caule declinato. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 46. f. 16. Fl. Dan. tab. 824. f. 1.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 28. f. 12. Buxb. cent. 2. tab. 4. f. 1. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 11. & 13.*

In Europæ sylvis arenosis; in truncis putridis 24. Surcul. sub 2-unc. ramosi, inclinati, fordide rufi. Fol. longa, 4-linear. longe mucronata, tenuia, secunda, arcuata, sericea, luteo-viridia. Pedunc. quandoq. solitar. Caps. cylindrica, inclinata, curvula, sulcata. Opercul. aristatum.

10. *undulatum.* B. anth. erectiuscul. peduncul. subsolitar. fol. lanceolat. undulato-ferratis, carinatis, patentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 477. Dill. musc. tab. 46. f. 18.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 17.*

Polytricum &c. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 16. 17.*

In Europæ sylvis, aggeribus, pratis umbrosis.

Surcul. 1-2-unc. erecti, foliosi. Fol. in apice congesta, magna, pellucida. Pedunc. rubri. Caps. cylindric. inclinatæ, aristatæ, per ætatem fuscae, operculo rubro.

11. *glaucum.* B. anth. erectiuscul. operculo arcuato: fol. erectis, imbricatis: surcul. ramosi. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 46. f. 20.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 13. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 22.*

In Europæ ericetis apricis, & locis humidis, argillofis.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Densi, & lati cespites. Color glaucus. Fragilitas peculiaris. Surcul. semuncial. inferne nigricantes; superne ex luteo-virentes. Fol. capillaria, lanceol. acuminata, sine pilo. Pedunc. brevissimi, crocei. Caps. ovatae, per aetatem inclinatae, longe aristatae. Facies Sphagni palust: fol. albicantibus; operculo admodum subulato.

- 12. albidum.** B. anth. erectis: fol. lingulatis, obtusiuscul. parulis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 46. f. 21.*

In insula Providentiæ.

Cespes brevis. Surcul. simplic. vel ramosi. Fol. tenera, albicantia; recentia glauca, glabra: superiora expansa. Setæ breves, albidæ, in quibus capsulæ parvæ, ovatae, pallide fusca.

- 13. pallucidum.** B. anth. erectiuscul. fol. (ovato-lanceolat. aristatis) recurvis: surculo, hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 46. f. 23. b. f. 24.*

Muscus &c. Pluk. alm. tab. 44. f. 7.

In Europæ paludibus, & in montibus.

Surcul. erectus, ramosus, purpureus. Fol. patula, virid. nitida. Caps. exiguae, ovatae, ciliatæ.

- 14. imberbe.** B. anth. erectis, ore dilatatis: fol. carinatis (imbricatis, lanceolatis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 48. f. 46.*

Barbula fallax. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 24.

In Europæ arenosis. graminosis, ad sepes, muros.

Cespes densus. Surculi semunc. ramosi. Setæ breves, pallidæ, primum dilute virentes, dein dilute purpurasc. Fol. fere capillacea, dilute viridia, in apice plura; & longiora quam in ramis: in planta virente recurva; in sicca, varie flexa. Ramorum nervi subrubent.

- 15. unguiculatum.** B. anth. erectis, oblongis: peduncul. axillaribus: fol. erectis, acutis carinatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 48. f. 47. b. 48.*

Muscus &c. Buxb. cent. 2. tab. 2. f. 9.

Barbula unguiculata. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 23.

In Europæ muris, arenosis.

Surcul. breves, simplic. vel ramosi, superne crassiores. Fol. parva, viridia, opaca, apicæ conniventia, aut saltem modice hiantia. Setæ breves, inferne rubescentes, superne viridilutescentes. Caps. oblong. operculo acuminato, incurvo. Calypt. primum erecta, pallida, dein fusca, incurva. *Var. surcul. & fol. tenuioribus.*

Surcul. vix semipollic. dense vestiti fol. linearilanceol. luteo-virentibus, breviter mucronatis, carinatis, post efflorescentiam contortis. Apice setæ rubræ, superne dilutiores. Pedunc. axillar. breves. Caps. oval-oblonga, primo virescens, dein obscure rubra, operculo obliquo, crassiusculo.

16. *aciculare*. B. anth. erectis; operculo aciformi: fol. erectis, subsecundis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 46. f. 25.*

In Helvetia, Anglia &c. in montibus.

Habitus Hypni scoparii. Fol. imbricata, lanceol. nervo distincta. Capitula e folior. alis, ut in *Hypno*, egrediuntur, sed ad radicem deest vagina squamosa.

17. *flexuosum*. B. anth. erectis: fol. setaceis: peduncul. flexuosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 47. f. 33.*

In Europæ sylvis umbratis.

Surculi densi, 1-2-unc. simplic. vel subramosi.

Fol. sublutea, subulata, pilosa. Setæ ab initio virentes, varie plerumq. intortæ, maturæ flavescentes, aristarum *Avenæ* instar tortæ. Caps. oblong. operculo cuspidato, rubello, Calypt. albida, subinde 2-3. e singulis surculis setæ, & capsul. oriuntur.

18. *heteromallum*. B. anth. erectis: fol. setaceis, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 47. f. 37. Fl. Dan. tab. 479.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 27. f. 7. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 5. 7.*

Dicranum &c. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 26.*

In Europæ ericetis, juniperetis, & in truncis arborum.

Surculi humiles, erecti, plerumq. simplices.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Fol. falcata. Capf. ovat-oblonga, operculo aristato, rubro, sæpe inclinato.

19. *ortuosum*. B. anth. erectis: fol. setaceis, imberbibus, arefactione retortis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dun. tab. 330. f. 1. Dill. musc. tab. 48. f. 40.*

Muscus &c. *Scheuchz. alp. tab. 19. f. 15. Pet. gaz. tab. 65. f. 8.*

In montibus Helvetiæ &c., ad rupes.

Surculi cespitosi, 2-unc. Fol. iuniora recta, longa, lanceolata; adulta falcata, cincinnata. Capful. cylindricæ, longe ciliatæ.

20. *truncatulum*. B. anth. erectis, subrotundis; operculo mucronato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dun. tab. 337. f. 2. Dill. musc. tab. 45. f. 7.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 2. Buxb. cent. 2. tab. 2. f. 2, & f. 7. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 18.*

Gymnostomum truncatum. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 5.

In Europæa, ad agros, fuffis, & sepes.

Muscus minimus. Pulvinati cespites densam setarum rufarum sylvam educunt. Fol. ovato-lanceol. pilifera, pallida. Capf. erectæ, ovatæ, cressæ, aristatæ. Opercul. breve, aristatum. *Differt manifeste a sequent. capful. rufis.*

21. *viridulum*. B. anth. erectis, ovatis fol. lanceolat. acuminatis, imbricato-patulis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 48. f. 43.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 29. f. 5.*

In Europæa agris, aggeribus.

Minimum, pallide virens. Fol. fere setacea, viridissima, primo latiuscula, inde longe lanceol. per siccitatem crispa. Ex media folior. rosula seta flava. Opercul. longa ac aristatum. Capsulæ flavescences, ciliatæ.

22. *palustre*. B. anth. erectis, subrotund. axillaribus: fol. subulat. distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 47. f. 36.*

Habitat

23. *paludosum*. B. caulon: fol. setaceis: anth. obscurissimis, patulis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 49. f. 53.*

In Europæa humidis, montanis.

Rosula foliorum fuscorum. Capsula cyathiform.

fusca. Differt a viridulo, capsul. fuscis, & fol. per siccitatem minime crispis.

24. *hypnoides*. B. anth. erectis: surculo rectiusculo: ramis lateralibus brevibus, fertilibus. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 476. Dill. musc. tab. 47. f. 32. b. f. 28. y. f. 31. c. tab. 47. f. 27.

Hypnum &c. Hall. helv. tab. 46. f. 4.

Muscus &c. Pluk. alm. tab. 47. f. 5. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 7.

In Europæ faxis, rupibus sabulosis.

Surculi longi. Rami multi, alterni, toti foliosis. Fol. imbricata, longe lanceol. in pilum educta, recurva, lutescentia, quibus differt a B. rurali. Caps. erectæ, crassæ, ovatæ. Opercul. longe aristatum.

25. *verticillatum*. B. anth. erectis: peduncul. arefactione confertis: fol. (verticillatis) piliferis: surculis fastigiatis. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 47. f. 35.

Ad latera collium.

Surcul. cespitosi, uncial. ramosi. Fol. capillacea, inferiora obsolete albicantia; superiora pallide, & læte viridia. Setæ breves, pallidæ. Caps. parvæ, subrotund. subvirentes. Opercul. exiguum, rubellum.

26. *æstivum*. B. anth. erectis, subrotund. axillaribus: fol. subulatis, distantibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 47. f. 36.

In Europæ paludibus.

Simile priori, & B. 42. Dill. differt tenuitate caulium, & longitudine; setarum parvitate &c.

Cespites densi, surculis sescuncial. ramosis, subnudis. Fol. satore virid. in apice surculi brevem penicillum efformant. Caps. brevis, ovata, ciliis brevissimis.

27. *Celsi*. B. anth. erectiuscul: peduncul. longissimis: surculis acaulibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 49. f. 54.

Habitat Upsalia.

Fol. parva. Pedunc. subcapillar. pollicar. purpurascens.

28. *trichodes*. B. anth. erectiuscul. ore ciliato, absque anulo: peduncul. longissimo. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 49. f. 58.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Meesia uliginosa, Hedw. *Stirp. cryptog. Fasc. 1. tab. 1. 2.*

In Helvetia, Germania &c.

Surculi breves. Rosula ex fol. erectis, angustis, viridibus. Caps. sursum latelescentes, operculo brevissimo, obtuso, miniato.

29. *squarrosus*. B. anth. obliquis: fol. quinquefariis imbricatis, recurvis: caule ferrugineo, tomentoso. *Syst. veg. ed. 14.*

Muscus &c. *Buxb. cent. 4. tab. 65. f. 1.*

In Europæ borealis paludibus apricis.

Diffundum ab *H. squarroso*. Surculi pl. conferti, erectiusculi, undiq. fusco-pubescent. ramo uno, alterove brevi. Fol. minima, sessil. ovata, acumin. subcarinata, late virid. Pedunc. terminal. longus, purpur. Caps. oblong. obliqua.

*** *Antheris nutantibus.*

30. *argenteum*. B. anth. pendulis: surcul. cylindric. imbricatis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. 880. f. 2. Dill. musc. tab. 50. f. 61.*

b. 63. giff. app. 86. tab. 2.

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 16. f. 3. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 17.*

In Europæ tectis, muris, rupibus.

Surculi pl. uncial. Fol. imbricata, ovato-lanceol. mucronata, cauli valde adpressa: iuniora virentia; adulta argentea. Setæ subrubent. Caps. ovatae, operculo brevi, obtuso, primum virides, dein ex luteo-subfuscae.

31. *pulvinatum*. B. anth. subrotundis: peduncul. reflexis: fol. piliferis, lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 50. f. 65.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 29. f. 2. Pet. gaz. tab. 95. f. 15. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 21.*

In Europæ muris, rupibus.

Cespites densi, lati, orbiculati, convexi, & viridi, & atro col. varii, incani. Fol. longo, & albo pilo fluitante terminata. Pedunc. ex rosulis primi anni. Caps. elliptica, viridis, erecta; in senio lineata reflectitur & sese imergit intra folia.

32. *setaceum*. B. anth. subrotundis: peduncul. reflexis: fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 12. f. 1.*

Habitat

Differt ab affinibus, anth. subrotund. pedunculis reflexis, & fol. setaceis. Diversum a B. *pulvinato*, quod pilis albis canescit, & pedunculos adeo reflexos habet, ut anth. plerumq. intra cespitem occultet.

33. *cespiciosum*. B. anth. pendulis: fol. lanceolatis, acuminato-setaceis: pedunc. longissim. *Syst. veg. ed. 14. Polish. pal. n. 1017. c. icona Dill. musc. tab. 50. f. 66.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 29. f. 7. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 15.*

In Europæ muris, tectis glareosis.

Facies Musci annotini. Planta variabilis. Cespites densi, & viridissimi. Surculi teretes, purpur. Fol. nitida: iuniora bulbum efformant conniventem; adulta stellulam. Seta inferne purpur. superne pallida. Caps. ovatae, obtusae, pendulae.

Dantur individua stellifera, proinde ad Muscium spectare videntur.

34. *carneum*. B. anth. pendulis, subglobosis: fol. lanceol-acutis, alternis (rarioribus). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 50. f. 69. Buxb. cent. 2; tab. 2. f. 6. nimis humilis. Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 20.*

In Europæ udis subhumidis collium.

Simil. B. trunculato, sed fol. rarioribus, lanceolatis, mucronatis, pene aristatis, laxius in surculo longo dispositis. Surcul. ruber. seta brevior, rubens, ex annotino surculo.

35. *simplex*. B. anth. nutante, oblonga: fol. subulatis (plerumq. heteromallis): surculo simpliciss. cernuo; media pedunculifero. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 50. f. 59. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 19.*

In Europæ pascuis.

Ex minimis Muscis. Surculus vix trilinearis. Fol. inferne surculo adpressa, superius laxa, explicata. Ex summo surculo seta ruberrima. Caps. cylindric. curvula, operculo conico.

36. *dendroides*. B. anth. nutantibus: surculo erecto: ramis ter-

minalibus, verticillatis; ramulis alternis: foliis ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc. tab. 1. f. 2. Ad. Med. Svec. T. 1. tab. 14. f. 2.*

Habitat in Java.

Muscus palm. Caul. erectus, sublignosus, annotinus, squamosus, ramis 8-10. recurvatis, ramulosis. Fol. adproximata, amplexicaul, lanceolato-subulata, ferrata. Pedunc. terminal. anni præteriti caulis e centro ramorum, elongati, filiform. erecti. Caps. cylindrica, adrenuata, curva, fulcata, ferruginea, orificio dentato, luteo.

67. *alpinum.* B. anth. pendula oblong. fol. ovatis, acuminatis, carinatis: furcul. ramosis: axillis pedunculiferis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 50. f. 64.*

In Europæ rupibus tenui terra sedis.

Surculi cespitosi, ramis brevioribus, & longioribus. Fol. crebra, erecta, nitida; iuniora subviridia cum purpura mixta; in adultis furcul. & ramorum pars inferior ex purpuro, & fusco nigricans; superior atro-rubens. Setæ purpur. & atro rubentes. Caps. oblong. obtusæ. Calyptra purpur.

- Hallerianum.* B. acaul. c. pilulis sessilibus: fol. extimis patentibus, obtusis, intimis erectis, mucronatis. *Neck. meth. musc. Fl. Dan. f. se. 5. tab. 249. f. 3. Dill. musc. tab. 32. f. 13.*

Habitat

B. fol. mollibus, subulatis, setis brevissim. alaribus: capsul. ovatis. *Hall. n. 1802. Enum. tab. 45. f. 8. It. helv. tab. 1.*

In alpium sylvis.

Proximum B. pontiformi. Pulchra planta. Surculi recti, rubigine rubra obducti, cæterum cespitosi, crassi, albi. Fol. conferta, longa, capillr. imbricata, viridissima. Cilia ruberrima.

- montanum.* B. cauliculis erectis: fol. capillaribus, vagis: capsul. cylindricis; operculo conico. *Hall. enum. Stirp. Helv. n. 1804. tab. 46. f. 1.*

In Helvetia, Pedemontio, locis subalpinis.

Surcul. uncial. & ultra, albidus, inferne rubiginoso tomento obsitus. Fol. ascendentia, etiam

etiam heteromalla, viridissima. Setæ purpur. ex summo caule natæ. Calyptra longa, striata. Caps. ovalis, sed non turgida, erecta, exigua, matura cinnamomea.

pallidum. B. capsul. urceolaris, erectis, pectine spiculi: fol. capillaceis: surculis acaulis. Schreb. *Lips. Dill. musc. tab. 49. f. 57.*

Trichostomum &c. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 27.*

In aggeribus arenosis.

Surcul. brevissimi. Fol. acuminata, sæpe secunda, nunquam se contorquentia, pallide viridia. Setæ fuscunciales, pallidius virides.

stellatum. B. acaule; fol. involutiv: operculis cuspidatis; pectine spirali. Schreb. *Lips.*

Barbula rigida. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 25.*

In muris e limo constructis.

Accedit ad B. Dill. musc. tab. 49. f. 56. Surculi 1-2, lin. geometrici. Fol. pauca, 7-8, inflexulæ formam congesta, oblongo-triangular. patentia, subv. ginantia, acuminata, basi plana. Seta uncial. obscure purpur. Caps. oblonga. Calyptra angusta, testacea.

Erucaefolium. B. capitul. erectis: fol. carinatis, siccitate crispis. Neck. *meth. musc. Dill. musc. tab. 39. f. 55. optima.*

In locis arenosis.

Capitula oblonga, squallide lutescentia. Opercula cuspidata, ciliis coloratis. Fol. sublanceol. rigidiuscula.

mutans. B. fol. lanceolar. subulat. capsul. urceolat. cernuis; opercul. conico. Schreb. *Lips. Dill. musc. tab. 50. f. 61.*

Ad latera fossarum.

Differt a M. pyriformi, fol. brevioribus, basi latioribus, minus late viridibus; seta non arcuata; capsulis per ætatem erectis, non pyriformibus, sed e basi angusta semper ampliatis &c.

pusillum. B. (*Trichostomum*) fol. ex ovato-concava basi subulatis: thecis erectis, oblongis. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 28.*

In arenoso-lutosis, apricis.

Stip. 2-3. linear. erectus, simpl. fuscus. Fol. stipitis inferiora minima, sensim maiora; per-

Tom. VI.

M

rigonialis maxima: cuncta reticulata, longe aristata, nunc reflexa, nunc modice inflexa, quandoq. heteromalla. Ductulorum fasciculus latiusculus, tener, membranaceam expansionem longe excedens. Paginæ color e luteo-amoeno viridis. Vaginula oblonga, cylindrica, senio futeilla, margine obtusiore. Pedunculus stipite quadruplo longior.

tenuis.

B. fol. lanceolat. laxè imbricatis, capsul. cylindricis, aristatis. *Hull. helv. n. 1817. W'eb. Spicil. Fl. Pedem. Dil. musc. tab. 48. f. 49. Terræ innascitur in sylvis montanis.*

flavescentis.

B. capsul. subrotantibus; surcul. simplicibus; fol. linearibus, carinatis, rugosis. *Scop. Fl. Carn. tab. 61.*

Inter rupes, & muros.

Cespites lati, pulvinati, luteo-virid. Fol. 2. lin. longa, triquetra, carinata, falcata, transversis plicis undulata, ex sicilitate contorta. Caps. longa, erecta, subulata, ore ciliata. Calyptra citrina, apice rubra.

3424. HYP-
NUM.

Anth. operculata. Calyptra lævis. Filamentum laterale, ortum e perichætio. (i. e. vagina squamosa, foliacea). Differt a Maio, & Bryo fructificat. axillari.

* *Frondeb. planatis.*

1. *spiniforme*. B. fronde simplicissima: foliol. subulat. patentibus: peduncul. radicalibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 43. f. 68.*

Adiantum &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 23. f. 4. In Jamaica.*

Surculi erecti, simplic. rigidiusculi. Fol. per ætatem fusca. Setæ surculis paulo longiores.

2. *taxifolium*. H. fronde simplicissima, pinnata, ovato-lanceol. basi pedunculifera. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 473. f. 2. Dill. musc. tab. 34. f. 2.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 24. f. 11.*

In Europa umbrosis.

Planta elegans, *Filiculam* quamdam simulans. Surcul. simplex. Foliol. utrimq. 10-12. Seta unica e basi surculi, vix semunc. Capitula parva, brevissima, incurva.

3. *denticulatum*. H. frond. pinnata, simplici, basi pedunculifera: pinnis duplicatis, recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 34. f. 5.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 29. f. 8. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 36.*

In Europæ, supra terram umbrosam.

Muscus tener, & pallidus. Surculus simpl. decumbens, basi setifer. Fol. disticha, falcata, ita sibi proxima, ut quasi gemella videantur. Caps. cylindricæ, cilio denso, inclinatæ, maturæ erectæ.

4. *bryoides*. H. fronde simpliciss. pinnata, lanceolat. apice pedunculifera. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 493. f. 1. Dill. musc. tab. 34. f. 1.*

Muscus &c. *Vaill. parif. t. b. 24. f. 13. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 11. Buxb. cent. 1. tab. 64. f. 3.*

In Europæ umbrosis collibus.

Muscus minnus, capituli ora magna, ciliis rubris spectabilis. Surcul. vix semunc. adscendens. Fol. utrimq. 5-6. superne longiora, oblonga, modice arcuata. Peduncul. flavicans.

5. *acacioides*. H. fronde pinnata, ramosa, apice pedunculifera. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 34. f. 4.*

In Patagonia.

Surculi tenues, simplices, vel ramosi. Pinnul. crebræ, ex obscuro-viridi-nigricant. Setæ brevæ, fuscæ. Caps. exiguæ, subrotund. fuscæ.

6. *adiantoides*. H. frond. pinnata, ramosa, erecta, medio pedunculifera. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 34. f. 3.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 28. f. 3. Buxb. cent. 2. tab. 1. f. 4.*

In Europæ paludosis montanis &c.

Surcul. erectus. Pinnarum paria sub 40. pinnis planis, lanceolat. ad mediam costam annexis, antrorsum incliuatis. Setæ rubræ. Capitula obliqua, subulata.

7. *complanatum*. H. fronde pinnata, ramosa; foliol. imbricatis, ovatis, acutis, complicatis, compressis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 34. f. 7.*

M ij

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 23. f. 4. Morif. hift. 3. f. 15. tab. 5. f. 5.*

In Europa, ad truncos arborum.

Surcul. semiped. ramofi. Fol. difticha, nitida. Setæ plurimæ, rubræ. Capitula brevia, erecta, cylindrica, rubra. *Var. romulis, foliisque latioribus.*

8. *ornithopodioides.* H. frond. pinnata, ramofa; foliol. ovatis, mucronatis, carinatis, patentiffimis. *Syft. veg. ed. 14. Dill. mufc. tab. 34. f. 9.*

In Patagonia.

Viderur var. H. crispæ.

9. *sylvaticum.* H. fronde pinnata, ramofa, procumbente, foliol. acutis, medio pedunculifera. *Syft. veg. ed. 14. Dill. mufc. tab. 34. f. 6.*

In Europæ fylvis, ad arborum radices.

Differt ab H. denticulato, cui fimile, fetis ex ramis prodeuntibus non a radice; & opercul. ariftatis.

•• *Surculis vagis.*

10. *lucens.* H. furcul. ramofis: frondibus fubpinnatis; foliol. punctatis. *Syft. veg. ed. 14. Dill. mufc. tab. 34. f. 10.*

In Europæ paludofis.

Surcul. procumbens, fefqui-2-uncial. Fol. imbricata, lata, acuminata, plana, reticulata, rore veluti cryftallino adfperfa, alterna: fuperiora utrimq. æqualia; cætera margine paulo productiore, & leviter elliptica. Setæ fubrubent. Capf. parvæ, ovatæ, nutantes, ex fufco nigricantes; calyptra recta, cufpidata, albicante.

11. *rugofum.* H. furcul. vagis, erectiusculis: fol. fecundis, recurvatis, bafi rugofis. *Syft. veg. ed. 14. Ad. pol. 2. tab. 7. f. 2. Dill. mufc. tab. 37. f. 24.*

In Helvetia, Germania &c, in montium fpongiofis.

Surculus longus, rarius ramosus. Fol. longe lanceol. valde rugofa. Rami inter folia rubri. Pedunc. atro-purpur. Capful. breves, obovatæ, abfque ciliis. Opercul. conicum, non ariftatum.

12. *undulatum*. H. furcul. ramosis; frondibus subpinnatis: foliol. undulatis, complicatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 36. f. 11.*
Muscus &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 33.
In Europæ saxosis, cavernosis collium, & montium.
Adfines sequenti: fol. tamen acutiora; setæ longiores. Surcul. humifusus. Fol. totum furculum squamatim tegentia, elliptica, pallide virid. nitida. Rami pauci, vagi, adtenuati, albido-virescent. Pedunc. subradical. longissimi. Caps. oblong.
13. *crispum*. H. furcul. ramosis; frondibus subpinnatis: foliol. (crispis). *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. ed. 2. tab. 45. f. 5. & ed. 1. tab. 3. f. 5. Dill. musc. tab. 36. f. 12.*
Muscus &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 10.
In Europæ locis saxosis, subalpinis, & in corticibus arborum.
 Surcul. penduli. Rami distantes, inordinati, Filicinorum more dispositi. Fol. imbricata, bina furculum amplectentia, in uno latere plura, oblonga, apice deflexa, nitida. Caps. ovata. *Differt a priore, fol. magis crispis, obscurioribus: capitul. rotundioribus.*
14. *triquetrum*. H. ramis vagis, recurvis: fol. ovato-lanceol. recurvatis, patulis (aristatis, triquetris). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 38. f. 28.*
Muscus &c. Buxb. cent. 4. tab. 63. Vaill. parif. tab. 28. f. 9.
In Europæ pratis, sylvis, sepibus, & pascuis montanis.
Muscus vulgarissimus, pratorum emaciatorum pestis, luteo-virens, hispidus, ramis apice crassioribus, ramulosis. Surcul. repentes, pustul. Fol. denso, & multiplici ordine congesta, pallida, pellucida. Setæ erectæ, firmæ, sature purpur. Caps. transversa, cylindrica, deinde nutans.
15. *rutabulum*. H. ramis vagis, subrepentibus: fol. ovatis, mucronat. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 38. f. 29. Fl. Dan. tab. 824. f. 2.*
Muscus &c. Vaill. parif. tab. 27. f. 8. & tab. 23. f. 2.
In Europæ sepibus, sylvis, ad arborum radices.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Fol. priore minora, patula, striata, breviter aristata. Extremi ramuli in caudas acutas densantur. Anth. ad modum *Rutabuli* incurvatæ. Caps. supra convexa, subtus planiuscula, operculo conico, obtuso; adulta rubens.

*** *Sursulia pennatis*.

16. *filicinum*. H. furcul. pinnatis; ramulis distantibus; foliol. imbricatis, acutis, secundis, recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 36. f. 19.*

Musculus &c. *Vaill. parif. tab. 29. f. 9. Loef. ic. 43.*

In *Europa humidiusculis montanis*.

Musculus rubiginoso-virens. Rami summi conferti. Surcul. prostratus, 3 pinnat. pinnis alternis, maioribus. Fol. falcata, sublutea. Setæ 2-unc. ex vaginis maximis, nitidis, subluteis. Capsula inclinata, gracilis. *Variat pro diversitate locorum*.

17. *proliferum*. H. furcul. proliferis, plano-2-pinnatis; peduncul. aggregatis, (obliquis; operculis aristatis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 35. f. 13.*

Musculus &c. *Vaill. parif. tab. 29. f. 1. bene. & tab. 28. f. 1. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 20. Buxb. cent. 2. tab. 1. f. 2.*

In *Europa pratis, sylvis ad terram, & ad arborum radices*.

Arbusculam figura refert. Surcul. longus, e medio frondium elevatus, croceo-ruber, palmar-dodrant. Foliol. ovat-acumin. carinata. Pedunc. fescunc. summis frondibus ad 4-8. Calypt flava, nitida. Caps. ventricosa, inclinata, ex sulco virens.

18. *delicatulum*. H. furcul. subproliferis, plano-pinnat. cuspidatis; pedunc. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 83. f. 6.*

In *Amer. Europa septentr.*

Priori simile, sed longe tenerius; an varietas? Color primum late virens, dein furculis flavicantibus.

19. *parietinum*. H. furcul. plano-2-pinnatis; fol. adpressis; peduncul. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 35. f. 14.*

Musculus &c. *Loef. ic. 44.*

In Europa, ad arborum truncos imos, & in sylvis ad terram.

Simil. H. prolifero, sed magis planum. Surculi longe repit, ramis suboppositis, & longe decrescentibus. Fol. breviter, ovat-lanceol. mucronata, plerumq. sublutea. Vaginæ nitentes. Setæ purpur. Caps. curvæ, subpurpurascens.

20. prælongum. *H. furcul. subpinnat. decumbentibus: ramulis remotis; foliul. ovat lanceolat. (aristatis); antheris cernuis. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 35. f. 15.*

Muscus &c. Buxb. cent. 4. tab. 63. f. 3.

In Europæ terris, truncis, lignis.

Surculi spitham. Fol. rara, distincta, subfusca. Setæ ex origine ramorum. Caps. ovatæ, aristatæ.

Hæc species difficiliter determinatur, quam dignoscitur.

21. crissa ca-strensis. *H. furcul. pinnatis; ramulis adproximatis: apicibus, foliisque recurvis. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 36. f. 20.*

Muscus &c. Vahl. parisi. tab. 27. f. 14. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 8. icon obliquit. Loef. pruff. tab. 41. bene.

In Europa, Pennsylvania, ad radices Abietis &c.

Planta formosa, luteo viridis. Surculi Struthio-Cameli plumulam referunt; pinnul. parallelis, lente decrescentibus, adpressis. Cespes latus, & densus copia ramorum. Ultimi tantum ramis dense pinnati. Fol. falcata, & crispata, in ramorum apicibus longiora. Pedunc. rubelli.

22. abietinum. *H. furcul. pinnatis, teretiunculis, remotis, inæqualibus: (fol. adpressis, ovat-lanceolat. aristatis). Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 35. f. 17.*

Muscus &c. Vahl. parisi. tab. 29. f. 12. Loef. pruff. tab. 43. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 22.

In Europæ sylvis abietinis.

Surculi luteoli. Fol. curvula, ramis valde adpressa. Differt ab H. filicino, fol. minime falcatis, & ramis adenuatis.

23. plumosum. *H. furcul. pinnatis, repentibus: ramis confertis: fol. imbricatis, subulatis: anther. erectis. Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 35. f. 16.*

In Europa, ad arborum radices.

Color luteo-virid. aut obscurus, cum splendore sericeo. Surculi spitham. Fol. aristata. Seiz pl. semunc. fulcæ, seu subrubent. *Differt ab H. sericeo, habitu vere pinnato; & fol. patentissimis.*

*** *Fol. reflexis.*

24. *suppressifor-* H. surcul. subpinnat. compressis, fol. imbricatis, me. secundis, recurvis, subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 535. f. 2. Dill. musc. tab. 37. f. 23.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 27. f. 13. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 8.*

In Europæ sylvis, ad arbor. radices.

Color flavescenti-nitidus. Surcul. repens. Rami erecti, vagi, frequentissimi. Summi rami in cincinnum intorti. Fol. multa, imbricata, longe conica, apice recurvo. Vaginæ inter fol. latentes. Seiz uncial. ex rubro-flavæ. Caps. curvula, non cernua.

25. *aduncum.* H. surcul. erectiusculo-subramosis: fol. secundis, subulatis, recurvis; ramis recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 37. f. 26.*

In Europæ uliginosis, & passim humidis montanis.

Rami erecti, parum ramosi. Fol. crispa. Vaginæ parvæ. Setæ longæ, 2-uncial. Caps. ovatæ, inclinatæ.

26. *compressum.* H. surcul. pinnat. compressis (pinnis ramosis): fol. acuminatis, recurvis: anth. erectiusculis, ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 36. f. 22.*

In Europæ truncis arborum.

Differt ab H. cristæ castrensi, ramis ramosis; setis brevioribus; habitu triangulari, & diminuto ramorum.

27. *scorpioides.* H. ramis vagis, procumbentibus, recurvis: fol. acuminat. secundis, (aristatis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 37. f. 25.*

In Angliæ, Sveciæ &c. paludibus profundis, & in vallibus Pedemontii.

Habitus Lycopodii. Muscus procumbens, ramis vagis, fulcis; apicibus aduncis, flavis. Fol.

nonnihil nitida, præcipue per extremos furculos. Caps. ex fulco-rufescent.

28. *viticulosum*. H. furcul. repentibus: rami vagis, teretibus: fol. acuminatis, parulis, (crispis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 39. f. 43.*
Muscus &c. Vaill. parif. tab. 23. f. 1. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 7. Pluk. alm. tab. 47. f. 4. Lo-f. pruff. tab. 49.

In Europæ montosis, aridis ad arbores.

Surculi prælongi, ramosi. Fol. luteo-virentis, sæpe secunda, mucrone recurvo, ut crispâ videantur.

29. *aquatium*. H. furcul. procumbentibus, submersis: fol. linearibus, acuminat. secundis, recurvis: anth. oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 290. Dill. musc. tab. 43. f. 70.*

Nudis saxis innascitur intra aquam.

Cespes densus. Surcul. simplic. aut subramosi, semiped. & breviores, dense foliosi. Fol. sessil. integerr. supra concava, subius convexa, atro-virid. In summis ramulis peduncul. nigrescent. nitidi. Anth. nitidæ.

30. *squarrosum*. H. furcul. vagis: fol. lanceolat-acutis, complicato-carinatis, quinquefariam recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 535. f. 1. Dill. musc. tab. 39. f. 38. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 2.*

b. Fl. Dan. tab. 648. f. 3. Vaill. parif. tab. 27. f. 5. Dill. musc. tab. 39. f. 39.

In Europæ subhumidis.

Surcul. sesquipalm. Rami, & setæ erectæ. Fol. pallida.

31. *palustre*. H. furcul. repentibus: ramis confertis, erectis: fol. ovatis, secundis: anth. erectiusculis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 37. f. 27.*

In Europæ udis collinis, & montosis.

Maxima plantæ pars in terra abscondita. Color in recenti albo-viridulus; in sicca candidus. Surcul. longus, subpedal. cespitosus, inferne subnudus, superne foliosus, fol. confertis. Vaginæ longiusculæ. Dum rami sunt ramosiusculi, recurvantur. Setæ ad basin ramorum. Opercul. obtusa, mucrone brevissimo.

32. *loreum*. H. furcul. reptantibus: ramis vagis, erectis: fol.

secundis: anth. subrotundis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 39. f. 40.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 25. f. 2. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 24. Tabern. ic. 809. In Europæ montosis.*

Simil. H. squarrosus: differt surculis multo longioribus, magis ramosis, tactu rigidis; fol. longioribus, falcatis, non valde reflexis. Color a luteo-virid. cum nitore.

***** *Surcul. dendroidibus, seu fasciculatis.*

33. *dendroides.* H. furcul. erecto; ramis terminalibus, fasciculatis, simpliciuscul: anth. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 823. f. 2. Dill. musc. tab. 40. f. 48.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 6. Tourn. Inst. tab. 326. f. B. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 31.*

In Europæ pratis, sylvisque subhumidis.

Simil. H. Illecebro. Surcul. digital-palmar. arbusculam referens, albo tomento oblitus. Fol. crebra, ovato-acumin. nitidula, in summis ramis disticha. Setæ rubentes. Calyptra tenuis, straminea. Capf. oblongæ, operculo cuspidato.

34. *atopscurum.* H. furcul. erecto: ramis terminalibus, fasciculatis, subdivisis: anther. subnutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 41. f. 49.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 23. f. 5. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 30.*

In Europæ sylvis humidiuscul.

Surcul. longe nudus, elatior quam in priore. Rami numerosiores, ramosi. Fol. breviora, ovato-lanceol. satute virid. magis furculo adpressa. Capf. aristata, inclinata. Elata vegetatione veluti fruticulus adparet.

***** *Surcul. teretiusculis.*

35. *curtipendulum.* H. furcul. vagis, teretibus; fol. ovato-acutis, aristatis, patulis: anth. pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 43. f. 69.*

In Europa, America, ad radices arborum, saxorum, in montosis.

Habitus ramosus, prolixus, teres, imbricatus.
 Seræ breves ex longis vaginis. Caps. maturæ
 pendulæ.

36. *purum*. H. furcul. pinnato-sparsis, subulatis: fol. ovaris,
 conniventibus: (setis prælongis: capsul. in-
 clinatis, aristatis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.*
tab. 706. f. 2. Dill. musc. tab. 40 f. 45.

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 28. f. 3.*

In Europæ pascuis, sylvis subhumidis.

Surculi longi, subramosi, nitidi. Fol. pallida,
 pellucida, nitida. Pedunc. caulini, furculi, &
 rami imbricati. Caps. cylindricæ, inclinatæ,
 operculo aristato.

37. *filifolium*. H. surcul. vagis, ramosissimis; ramis filiformi-
 bus: anth. obliquis. *Syst. veg. ed. 14. Dill.*
musc. tab. 42. f. 62.

In Europæ truncis arborum.

An Var. H. m. osureidis?

38. *illerebrum*. H. furculis, ramisque vagis, teretibus, erecti-
 utculis, obtusis: (fol. ovat-lanceol. conca-
 vis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 706.*
f. 1. Dill. musc. tab. 40 f. 46.

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 25. f. 7.*

In Europæ, & Amer. se. centr. pascuis.

Planta pallescens. Surculi toti foliosi. Fol. ni-
 tida. Apices ramorum subrotundi. Vaginæ
 minimæ. Caps. incurvæ; opercul. aristatis.

39. *riparium*. H. furcul. teretibus, ramosis: fol. ovat-acutis,
 patulis; distantibus (aristatis). *Syst. veg. ed.*
14. Fl. Dan. tab. 649. f. 1. Dill. musc. tab.
40. f. 44.

In Europæ, ad fluviorum ripas.

Surculi longi. Fol. congesta, lata, nitida; iu-
 niora patula. Vaginæ ad ramorum ortum.
 Anth. inclinatæ, opercul. breviter aristatis.

40. *suffida-
sum*. H. furcul. vagis: fol. ovato-lanceolat. convolu-
 tis, apice acuminato. *Syst. veg. ed. 14. Dill.*
musc. tab. 39. f. 34.

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 23. f. 11. Buxb.*
cent. 2. tab. 3. f. 1. 2. 3. 4.

In Europæ paludibus muscosis, quas replet.

Surcul. longi, teretes, ramis distantibus. Fol.
 lata, ovat-lanceol. Anth. longæ, 2-unc. &
 ultra, ex vaginis prælongis. Calypt. flave-
 scens. Caps. ventricosa, curvula; opercul.
 breviter conico, rubente.

***** *Surculis confertis.*

41. *sericeum*. H. furcul. repente; ramis confertis, erectis; fol. subulatis, aristatis; anth. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 42. f. 59.*
Muscus &c. Vaill. parif. tab. 27. f. 3. Burb. cent. 4. tab. 62. f. 1. & tab. 64. f. 1. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 25.
In Europa, ad truncos, muros, inque campis.
 Surculi repentes, ramis multis, brevibus. Fol. imbricata, semiexpansa, viridiff. nitida. Vaginæ albæ, & squamosæ ex furculis prodeunt. Setæ purpur. Caps. erecta, cinnamea. Opercula miniata, acute aristata. Cilia alba. *Differt ab H. velutino, furculis longioribus; fol. maioribus, sericeis, nitidis, lusco-viridibus.*
42. *velutinum*. H. furcul. repente; ramis confertis, erectis; fol. subulatis, aristatis; anth. subnatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 475. Dill. musc. tab. 42. f. 61.*
Muscus &c. Vaill. parif. tab. 26. f. 9. Burb. cent. 4. tab. 62. f. 23.
In Europa, ad radices arborum.
 Surcul. numerosiff. graciles, ramosiff. Fol. late viridia. Caps. ovatæ, mucronatæ, transversæ. Operculum breve, conicum, argute mucronatum.
43. *serpens*. H. furcul. repentibus, ramis filiformibus; fol. minimis, aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 42. f. 64. A.*
In Europa, Virginia, ad caudices, ligna, sata.
Dignoscitur furcul. innumera; & fol. capillatiss.
 Variabilis planta, minima, cespitosa. Fol. alterna, ovato-lanceol. flavescens. Setæ corallinæ, superne pallentes. Caps. magnæ, opercul. brevi, parum acuto.
44. *sciuroides*. H. furcul. erectis, ramosis, incurvatis (fol. adpressis, subovatis, aristatis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 41. f. 54.*
Muscus &c. Vaill. parif. tab. 27. f. 12. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 5. f. 27.
In Europæ truncis arborum.
 Color obscure viridis, per matem rubiginosofuscus. Surculi maturi torti Vulpis caudam referunt; semina furculi distincta crescunt.

Fol. planiuscula, satore viridia, striis tenuis, elevatis, longitudinalibus. Caps. erectæ, opercul. conicis.

45. *gracile*. H. surcul. repentibus; ramis fasciculat. erectiuscul. teretibus: anth. erectis, ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 649. f. 2. Dill. musc. tab. 41. f. 55.*

In Europæ frugibus.

Ex arborum corticibus pendens. Ramuli pl. cuspidati, erecti, figura leguminum *Ornithop. scorpioidis*. Fol. breviter mucronata, luteovirentia. Setæ subrubentes. Caps. erectæ, magnæ, cuspidatæ, ochroleucæ.

46. *mesureoides*. H. surcul. ramulissimè ramis subulatis, utrimq. attenuatis, teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 41. f. 51. b. f. 50.*

Muscus &c. *Vuill. parif. tab. 27. f. 6. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 3.*

In Europa, supra lapides, arborumq. radices.

Muscus reptans. Fol. arcte imbricata, ovato-lanceol. breviter aristata. Setæ ex ramorum origine. Anth. ovatæ, inclinatæ. Opercula acuta, non aristata.

47. *clavellatum*. H. surcul. toti ramosi, ramis confertis. Fol. imbricata, ovato-lanceol. nitida. Setæ uncial. Caps. erectæ, tumidæ. Calypt. alba. Opercul. longe aristatum.

48. *julaceum*. H. repens, ramis erectis, confertissimis: anth. incurvis, operculis inflexis. *Syst. veg. ed. 14. Pollich. pal. e. icone. Dill. musc. tab. 41. f. 56.*

In Europæ lignis putridis.

Surcul. creberrimi, breves, superne paulo crassiores, clavæ parvæ figura. Fol. dense congesta, exigua. Setæ breves. Caps. parvæ, subrotundæ, operculo incurvo, cuspidato. Calypt. subfusca.

49. *julaceum*. H. ramis erectis, teretibus, imbricatis, obtusis: perichætiis longitudine fere pedunculor. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 41. f. 56.*

In Amer. septentr.

Viticulis repentibus arborum corticibus adfigitur, e quibus numerosa, & dense congesta surgit soboles. Surcul. simplic. vel ramosi, teretes, subrigidi, *julorum Coryli* facie. Fol. crebra,

ovata, luteo-virid. Perichætia 1-2-3. setas pen-
ne totas obvestiunt, e squamis angustis, su-
periore cæteris multo longiore, conflata. Caps.
ovata, fuscæ ochroleucæ.

49. *Halleri*. H. ramulis adproximatis, brevibus; fol. planis;
recurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. n. 1734.*

In alpinis.

Surcul. prostrati, longi, ramis innumeris cespitem efformantes virid-fuscum. Fol. exigua, argute mucronata, abique pilo, ad mediam ulque partem recta; altera ad angulum fere rectum reflexa, & surculo parallela. Vagina teres, fol. brevibus, repandis. Seta uncia minor. Caps. gracilis, curvula, operculo mino-
riaro, conico, non aristato, ciliis albis.

50. *nitens*. H. ramis brevissimis: fol. lanceolat. subulatis, nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. n. 1784. Dill. musc. tab. 39. f. 37.*

Habitat in pratis humidis.

Synonymon Hall. n. 1754. spectat ad H. velutinum.

Surcul. palmar. tomentosi; fol. raris, ramis ramosis. Fol. luto immersis fusca; summa longa, concava, flava, aut dilute lutea; acumina-
ta, striata, nitida. Setae erectæ, longæ. Caps. oblong. incurvæ, rubellæ.

- myurum*. H. fol. ovato-lanceol. ramis teretibus, compressis. *Hall. helv. n. 1745. Fl. Ped. Dill. musc. tab. 41. f. 50. Vaill. parif. tab. 28. f. 4. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 30.*

Ad arborum truncos.

Caul. toti ramosi, neque arbuscul. similem stipitem proferentes, ramis conertis. Fol. imbricata, nitida. Vaginae de foliis paulum exserti-
tibus. Capsul. erectæ, tumidæ. Calyptra al-
bissima. Opercul. longe aristatum.

- Rufiforme*. H. fol. rufiformibus: capsul. subrotundis. *Wais. Floræ Gotting. Dill. musc. tab. 38. f. 31.*

In rivulis.

Surcul. repentes, fibrosi, arcte saxis adhæren-
tes, 1-3 unc. ramis erectis. Fol. brevia, lata,
ovato-lanceol. nervosa, lutea, pellucida, aut

obscuræ virid. pro varia ætate, alterna, dense imbricata, superius disticha, laxa.

fluitans.

H. erectum, aut fluitans; fol. oblongis, angustis, peracutis. *Wais. Fl. Gotting. Dill. musc. tab. 38. f. 33.*

In rivulis.

Simile Fontinali min. Surcul. dodrantal. & ultra, ramis vagis. Fol. alterna, lanceol. potius triangularia, acuta, surrecta, plana, patentia, pellucida, versus apicem furculorum adproximata, densiora, inferiora remotiora, nunc pallide, nunc obscure viridia.

striatum.

H. ramis vagis, recurvis; fol. ovatis, acutis, lineatis, undiq. patentibus: opercul. mucronatis. *Schreb. Fl. Lips. Dill. musc. tab. 38. f. 35.*

In nemoribus udis.

Fol. conferta, magis amplexicaul. H. *Rutabula* latiora, & fere triangularia, apice obtuso, vel acuto, non in acumen elongatum terminata, lineata.

Adiantum.

H. furculo vago, subpennato, repente: fol. lanceolat. patulis: capitulo oblongo, opercul. rostrato. *Neck. meth. musc.*

Ad arborum truncos.

Cum. H. Rusticifol. confundit Haller. Color semper stramineus, nitidus. Surculi, ramiq. sæpe repunt. Anth. pendul.

palatinum.

H. furcul. vagis; ramis ficcitate subsecundis, incurvo-subulatis: fol. lanceolat. capitul. erecto, acuminato. *Neck. meth. musc. Dill. musc. tab. 41. f. 55. optima.*

In saxosis, & arborum parietibus.

Ad arbores furcul. adscendentes, brevioresque sunt; ad saxa, dependentes, longiores. *Dill. fig. B. C. in saxosis enatam exprimit.*

retundifolium.

H. furcul. repentibus, filiformibus, vix uncial. fol. planis, subrotundis, patulis: pedunc. pl. *Scop. Fl. Carn. tab. 62.*

In parietibus.

Rami pauci. Fol. acuminata. Capsul. rubellæ, operculo in tenuem acum exeunte. Calypt. albo-paleacea. Os caps. binis seriebus denticulorum.

erichodes.

H. ramis rectiuscul. pinnatis, adproximatis, api-

CRYPTOGAMIA MUSCI.

ce pedunculiferis. Neck. Gallo-Belg. Dill. musc. tab. 39 f. 36. 37.

In paludosis montanis, & subalpinis.

Fol. lanceolata, striata: rami alterni: pedunc. colorati.

H. fol. ovat-lanceol. pilo terminatis, rarissimis setis de medio caule erectis. Hall. helv. n. 1759.

In Helvetia.

Differt ab H. prælongo, præcipue fol. rarissimis, & capsul. non aristatis. Surculi in aquis pedales & longiores, parum ramosi: in siccis breviores, & ramosiores. Fol. ita rara, ut caulis veluti nudus adpareat.

H. caulibus fluitantibus, prælongis: fol. lanceolat. capsul. inclinatis. Hall. helv. n. 1760. Dill. tab. 83. f. 7.

In Helvetia.

Differt a priore, ramis frequentibus; fol. longioribus, & minus latis, neque pilo aristatis.

H. caul. fluitante, prælongo: fol. raris, lanceolat. adscendentibus. Hall. helv. n. 1761. Vaill. tab. 33. f. 6.

In Helvetia.

Simil. H. n. 1759. sed fol. adscendentin, non reflexa, lanceol. gracilia, in summa planta convoluta.

H. caulibus teretibus, clavatis, & filicentibus. Hall. helv. n. 1763.

In alveis Aquilejensibus.

Peculiaris planta. Principia furculi magna, fere ut in splendente *Myosurideo*: fol. latiuscula, ovat-lanceol. teretia, disticha. Deinde finis cuiusque rami alias in clavæ quasi modum intumescit; alias, & frequenter subito decrescit, & in filii similitudinem adtenuatur. Finis ultimus sæpe simplex; alias sciphuli aliquam similitudinem habet, ut putes, *Minium* te videre.

massubicum. H. Vaill. parif. tab. 27. f. 1.

Ad arbores.

Fol. multinervia. Caps. deflexæ.

Differt ab H. cuspidato, fol. plusquam tribus nervis longitudinaliter lineatis; pedunculis furculo, unde prodeunt, longioribus: capsul. nunquam

quam erectis; calyptra pallidior; loco natali; habitu ramosiore; & virore saturatiore.

H. ramis teretibus: fol. ovat-lanceolat. fetis prælongis: capsula crassa; opercul. conico. *Hall. helv. n. 1742. Vaill. parif. tab. 29. f. 10. Dill. sylv. musc. tab. 40. f. 47.*

In sylvis.

Adfine H. cuspidato. Surcul. longi, 4-5-uncial. ramosi, ramis distantibus declinati, aut erecti, toti foliosi, purpur. Fol. ovata, acumin.

serpinatum. H. repens; fol. triangularibus, angustis: ramul. subrotundis. *Hall. Enum. n. 16.*

Ad arbores.

Facies, & nitor H. sericei, sed fol. diversa; surculi minus ramosi; setæ ex omnibus ramis: capsul. brevior, elliptica; osculum ciliis albidis coronatum. Fol. nullis nervulis lineata, ovata, convexa.

lutescens. H. surcul. vagis, procumbentibus: fol. ovato-lanceolat. subulatis, striatis: capsul. obliquis. *Schreb. Fl. Lips. Dill. musc. tab. 42. f. 60.*

In pratis nemorosis.

Differt ab H. sericeo, surcul. longioribus ramis remotioribus: caps. cernuis.

intricatum. H. surcul. repentibus; ramis brevibus: fol. laxis, lanceolat. acuminat. capsul. obliquis, cernuis; mucrone obliquo. *Schreb. Fl. Lips. Vaill. parif. tab. 28. t. 2. 6. 7. 8.*

In arborum corticibus.

Surcul. longi, intricati. Fol. visibilia oculo nudo, in pilum breviorē definitia. Setæ dilute rubræ. Caps. inclinatæ, aut ad latus flexæ, primum virides, dein obscure rubræ, oblique urceolatæ.

murale. H. surcul. rectis, teretibus: peduncul. subæqualibus: anth. subcernuis. *Neck. Gallo Belg. Dill. musc. tab. 41. f. 52.*

In Gallo-Belg.

Simil. H. velutino; differt fol. ovatis, obtusis; peduncul. brevioribus. Planta quandoque atropurpur. Pedunc. colorati.

saladinianum. H. surcul. repentibus, ac ramulis rectiusculis: peduncul. axillaribus, anthera brevioribus. *Neck. Gallo-Belg. Dill. musc. app. tab. 85, f. 18.*

Ad arborum truncos.

Planta 1-2-pollic. Pol. ovata, acuta, imbricata, intra ramulos axillar. Pedunc. vix sesquilineam longi.

stellatum,

H. furcul. erectis; fol. ovatis, longe mucronatis, erecto-patulis, coloratis, *Schreb. Fl. Lipf. Dill. musc. tab. 39. f. 35.*

In pratis humidis.

Surcul. inferne nigricantes, aut fulvi, superne lutescentes. Fol. amplexicaul. basi dilatata, non striata, Sem. axillaria.

albicans,

H. furcul. ascendente, ramis teretibus, arcte imbricatis: fol. ovatis, mucronatis: capitul. axillaribus, obliquis, *Neck. meth. musc. Dill. musc. tab. 42. f. 63. optima.*

In Ericetis fabulosis.

Gemmae protrudit, quibus perpetuo gignitur folioles.

dubium,

H. furcul. pinnatis, subdecumbentibus, ramis adproximatis: fol. rectis, acutis: anth. subnatis. *Neck. Guss. Belg. Dill. musc. tab. 37. f. 4.*

In pascuis, locisq. paludosis.

Var. anther. nullis.

H. caespitosum, filamentosum, minimum, subnatum. *Dill. musc. tab. 36. f. 18.*

In Guiana.

H. denticulat. exiguum, pendens, atrovirens. *Dill. musc. tab. 43. n. 67.*

H. terreste. *Sloan. Jam. 1. tab. 25. f. 3.*

H. conglomeratum. *Sloan. Jam. 2. tab. 25. f. 3.*

H. fol. lanceolat. falcatis, setis alaribus; capsul. ovata, inclinata, operculo mamillari. *Hall. helv. n. 1779.*

In Helvetia.

Polytrichorum faciem refert, nisi quod totus habitus mollior est. Surculi *Bryoides*, parum ramosi, purpur. Fol. longe lanceolata, acuta, crispata. Capsul. grandis, pyriformis, ventricosa.

H. ramis compressis: fol. pilo aristatis, nitentibus: capsul. erectis; operculis conicis. *Hall. helv. n. 1784. Dill. Sylv. musc. tab. 39. f. 37.*

In udis alpinis.

Surculi parum ramosi, toti fol. tecti imbricatis, gracilibus, rectis, lanceolat. plerumq. subru-

bris, aut luteis. Capſ. erecta, pene cylindrica. Cilia alba. Operculum miniatum.

A L G Æ.

1424. JUNGERMANNIA. *M*as. pedunculat. nudus. Anth.
4-valv.
Fem. sessilis, nudus, seminibus
subrotundis.

* Frondibus pinnatis, secundis.

1. *asplenio-* J. frondibus simpliciter pinnatis; foliol. ovatis,
ides. subciliatis. Syst. veg. ed. 14. Scop. Fl. Carn.
ed. 2. tab. 62. Mich. gen. tab. 5. f. 3. O. O.
Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 69. f. 5.
Muscus &c. Loef. pruss. tab. 47.
- b. J. Mich. tab. 5. f. 1. 2.
Hepaticoides &c. Vaill. parif. tab. 19. f. 7.
Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 69. f. 6.
Muscus &c. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 42.
In Europæ, Indiæ udis umbratis, collinis.
Cespitosa, luteo-virens. Surculi uncial. & breviores, basi ramosi, adscendentes. Foliol. obtusa, convexa, teouiter denticulata, sine articulis. Thecæ terminales, divergentes, sub 3-linear. Capitul. fuscum, divisum in 4. partes, lineam longas.
2. *javanica.* J. frondibus simpliciter pinnatis; furcul. ramosissimis; foliol. ovatis, imbricatis, convexis.
Syst. veg. ed. 14. Linn. jun. meth. musc. tab. 2. f. 1. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 15. f. 2.
In Java.
Erecta, ramosissima; glaberrima. Fructificat. laterales.
3. *viticulosa.* J. frondibus simpliciter pinnatis; foliol. planis, nudis (subrotundis). Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 5. f. 4.
Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 69. f. 7.
In Europæ udis umbratis, sylvis, super terram.
Surcul. provoluti, 1-2-3-unc. plus, minus ramosi. Fol. densissima, exigua, non crenata.

Vaginæ dentatæ . Pinnul. alternæ , planæ , pellucidæ , dilute virides . Pedunc. uncial. candidi . Capitula subrotunda nigra , nitida .

4. *polyanthes* . J. frondibus simpliciter pinnatis ; fol. integerrim. imbricatis , (ovatis) convexis . *Syst. veg. ed.* 14. *Mich. gen. tab.* 5. f. 5.

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab.* 79. f. 9.

In Europæ palustribus.

Planta exigua , palustris , repens . Surcul. vix unc. pinnati . Fol. densissima , paulum imbricata , disticha . Per totum furculum breves vaginulæ .

5. *lanceolata* . J. frondibus simpliciter pinnatis , lanceolat. apice floriferis ; fol. integerrim. *Syst. veg. ed.* 14. *Mich. gen. tab.* 5. f. 6.

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab.* 70. f. 10.

In Europæ humidis umbratis.

Planta palustris . Surcul. vix unc. sæpe per terram latos cespites efficiunt . Fol. confertissima , læte viridia , præcipue apice congesta , ut furculus rotundo capitulo finiatur , nervo crasso , fusco , etiam obliqua , & paulum auriculata , paulumq. incurva . Flos nigricans .

6. *bidentata* . J. frondibus simpliciter pinnatis (foliol. 2-dentat. in ramo florifero maioribus) . *Syst. veg. ed.* 14. *Mich. gen. tab.* 5. f. 12.

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab.* 70. f. 11.

Hepaticoides &c. *Vaill. parif. tab.* 19. f. 8.

Muscus &c. *Morif. hist.* 3. f. 15. *tab.* 6. f. 47.

In Europæ ericetis umbratis , subhumidis.

Planta procumbens , reptans , 1-2 uncial. Foliol. subopposita , ovata , dilute viridia . Anth. subglobosæ . Vaginæ floriferæ ex summis ramulis . *Variet. ramosa , & non ramosa.*

7. *micropidata* . J. frondibus simpliciter pinnatis , ex medio furculo floriferis : foliol. bidentat. *Syst. veg. ed.* 14. *Mich. tab.* 6. f. 17.

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab.* 70. f. 13.

In Europæ umbratis , humidis.

Planta minima . Surculi breves , prostrati , pallidi . Frondes lineares , ramosæ . Foliol. rara , disticha , dentibus sinu acuto divisis . Vaginæ cylindricæ , per caulem sessiles , & floriferæ .

8. *quinquedentata* . J. frondibus pinnatis , ramosis , apice floriferis : foliol. subquiquedent. *Syst. veg. ed.* 14.

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 71. f. 13.*

In Europæ.

Surculi confertim nascuntur erectiusculi, plus minus ramosi. Fol. basi angustiora, rachim amplexantia, superne subconcaua, subpellucida.

** *Frondibus pinnatis, pinnul. auriculatis, superne tectis.*

9. *undulata*. *J. frondibus supra bipinnatis, apice floriferis; foliol. subrotund. integerrimis, undulatis. Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 71. f. 17.*

Hepatica &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 6.*

In Europæ.

Quo ad habitum simil. sequenti, sed surcul. longioribus, superne ramosioribus. Fol. disticha, adproximata, minime imbricata, patentia, æqualia, alterna, atro-virid. nervo rubiginoso.

10. *namorosa*. *J. frondibus supra bipinnatis, apice floriferis; foliol. ciliatis. Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 5. f. 8.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 71. f. 18.*

In Europæ sylvis montanis, umbrosis.

Surcul. breues, adscendentes, simplices, lucide virescentes. Fol. alterna, imbricata, ovata, planiuscula, sulcata, circumferrata.

11. *resupinata*. *J. frondibus supra bipinnatis, inferne floriferis; foliol. imbricatis, rotundis, crenulatis. Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 71. f. 19.*

In Europæ rupibus.

Planta resupinata. Frond. digitales. Foliol. & squamosæ auriculæ valde crebræ, alternæ, crispæ.

12. *albicans*. *J. frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliol. linearibus, recurvatis (auriculatis). Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 71. f. 20.*

Hepaticoides &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 5.*

In Europæ umbrosis, ad arborum trunco.

Surcul. conferti, 1-2-unc. simplic. vel ramosi, Ante efflorescentiam extremitates reliquis surculis latiores, & ob foliol. densius congesta, crispæ adparent. Frond. simplic. seu ramosi.

- culæ, resupinatæ. Foliol. plana, pellucida, pallide viridia, per siccitatem albicantia.
13. *trilobata*. J. frondibus subtus bipinnatis: fol. subquadratis, obsolete trilobis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 5. f. 10.*
Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 7. f. 23. & tab. 71. f. 21.*
In Italia, Germania &c.
Muscus crassus, viridiss. & subruber. Surcul. reptantes, ramosi, teretes. Foliol. obtusa, undulata, & veluti angulosa, Trichomani similia, inferne oblique ad caul. adnata, ad extremos ramos pinnata, distincta.
14. *reptans*. J. frondibus subtus bipinnatis. apice reptantibus: foliol. 3-4-dent. *Syst. veg. ed. 14.*
Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 71. f. 24.*
In Europæ ericetis udis.
Dignoscitur ab innumeris vaginis floriferis, in centro cespitis collectis.
Planta parva. Surculus planus, ramosus. Fol. Trichomanis, quadrata, denticulis curvis, in ramis imbricata, & congesta. Flos atro-purpur. Seta alba.
15. *multiflora*. J. fronde repente, ramosa: foliol. alternis, geminis, setaceis, æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 69. f. 4.*
In Europæ sylvis.
Stirps filiformis, depresso-planiuscula. Fol. hyalina.

*** *Frondibus imbricatis.*

16. *complanata*. J. furcul. repentibus: fol. rotundis, inferne auriculatis, duplicato-imbricatis: ramis æqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 5. f. 21.*
Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 72. f. 26.*
Hepaticoides &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 9. bene.*
In Europa, ad arborum truncos.
Planta tenera, luteo-viridis. Surcul. 1-2-unc. ramosi, crustas efficiunt late corticem regentes. Squamæ rotundatæ. Setæ breviss.
17. *dilatata*. J. furcul. repentibus: fol. (orbiculatis) inferne

auriculatis, duplicato-imbricatis; ramis apice
luculentioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 72. f. 27.*

Hepaticoides &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 10.*

Muscoides &c. *Mich. gen. tab. 6. f. 6.*

In Europa, America, ad arborum truncos.

Differt a priore, fol. minoribus, magisque elevatis; surcul. ramifloribus, superne dilatatis & colore obscurius viridi. Surculi atro-rubri, huic uni proprii. Fol. alterna, rariora. Flos hirsutus, niger, per ætatem pallens.

18. *Tamarisci.* J. fol. imbricatis serie duplici; superioribus subrotund. obtusis, convexis, quadruplo maioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 72. f. 31.*

Hepaticoides &c. *Vaill. parif. tab. 23. f. 10.*

Muscoides &c. *Mich. gen. tab. 6. f. 5.*

In Europa, ad truncos arborum, & rupes.

Planta simil. priori, nigro-purpur. Surculi a corticibus, & faxis, quibus adhærent, plerumque penduli, primum obscure virides, dein subfusi, rubiginosi, & atro-rubent. Fol. exigua, infer. minora. Setæ brevissimæ. Gemmæ ut in sequenti.

19. *platiphyllo.* J. surcul. procumbentibus: (fol. imbricatis, lanceolatis, superne planis, alternis, inferne concavis, quinquefariis). *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 72. f. 32. b. 33.*

Hepaticoides &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 9.*

Muscoides &c. *Mich. gen. tab. 6. f. 3. 4. b. f. 1.*

Muscus &c. *Moris. hist. 3. f. 15. tab. 6. f. 44.*

In Europæ, & Amer. septentrion. sylvis, ad arborum truncos.

An planta dioica? Muscus atro-virens. Surcul. longus, imbricatus, ramosus. Gemmæ terminales, compressæ, Brizæ locustis similes, quæ sunt rami iuniores. Ex folior. alis vaginæ laxæ, pene rotundæ, bivalves.

20. *ciliaris.* J. furculis repentibus: foliol. duplicato-imbricatis; inferne auriculatis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 73. f. 35.*

Muscus &c. *Vaill. parif. tab. 26. f. 11.*

In Europa passim.

CRYPTOGAMIA ALGÆ:

Surculi usque semiped. ramosi, pinnati, tecti; sicuti & folia plumulis in speciem albensis tomenti. Fol. superiora sæpe 2-fida. Ex alis folior. vaginæ maximæ, cylindricæ, villosissimæ.

21. *vaginata*. J. furcul. repentibus: fol. alternis, cuneiformibus, retusis, complicatis, amplexicaulibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. meth. musc. tab. 1. f. 5. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 14. f. 6.*

Habitat inter Juvæ muscos.

Rami filiform. undiq. floriferi.

22. *varia*. J. furcul. erectiusculis; fol. (distichis, subrotundis, integerrimis) bipartitis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 5. f. 9.*

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 73. f. 36.

In Europæ sylvis, ericetis.

Planta primum procumbens. Foliol. carinata, viridia, pellucida. Setæ candidæ. Capitula subrotunda, nigricantia.

23. *pulcherrima*. J. furcul. erectiusculis, confertis: fol. ovatis, imbricatis, sub-2-fid. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. -- Dill. musc. tab. 69. f. 3. Lin. jun. musc. tab. 69. f. 3.*

Habitat ad arborum truneos.

Pulcherrima sui generis. Fol. alterna, secunda, per lentem concava, elegantissime punctata, margine ubiq. villis oblita, articulatis. Toto cælo a *J. cillari* differt, cui foliol. duplicato-imbricata, & inferne auriculata.

**** *Surcul. undiq. imbricatis; foliolis sparsis.*

24. *julacea*. J. furcul. teretibus: foliol. undiq. imbricatis (inconspicuis) fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 73. f. 38.

In alpinis Britannia &c.

Ex densis cespitibus oriuntur surculi filiform. recti, parum ramosi, subsericei. Apex globuliferus. Vaginæ ovatæ. *Per siccitatem nitorem amittit.*

25. *rupestris*. J. furcul. teretibus: foliol. subulatis, secundis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 73. f. 40.

In Europæ frigidis rupibus, humentibus.

Planta dense congesta, exigua, longitud. $\frac{2}{3}$ aci-

culæ, erecta, inferne nuda, nigricans, plorurum, non ramosa. Fol. reflexa, primum obscure viridia, dein nigricantia.

26. *tricophylla*. J. surcul. teretibus: foliol. capillaceis, æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 73. f. 37.*

In Europæ frigidis rupibus.

Planta exigua, & prostrata, capillaris, col. luteo-viridi, & quasi albicante. Vaginæ longæ, cylindricæ, 2-fidæ, ex summis ramis.

27. *alpina*. J. surcul. teretibus: foliol. ovatis, patentibus: calycibus imbricatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 73. f. 39.*

In alpidibus Britannicæ &c.

Surcul. 1-2-unc. surrecti, in plurimos ramulos superne divisi; in palustribus atro-rubentes; in rupibus fulco-rufescentes. Fol. crebra, exigua.

28. *sertularioides*. J. surcul. repentibus; ramulis undiq. floriferis: fol. capillaceis, æqualibus, articulatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. meth. musc. tab. 1. f. 6 Añ. Medic. Svec. T. 1. tab. 14. f. 6.*

Circa Upsaliam, locis humidis inter Brya, & Hypna.

Surculi longi, conferti, flexuosi. Fol. erecta.

Ramuli in omnibus axillis floriferi. Fructification. apice dehiskentes, unde stellulæ, minutæ, purpur. *Diagnosticatur facile a Mustis repentibus colore pallido, vel albescente.*

***** *Acaules, frondibus simplicibus.*

29. *epiphylla*. J. acaul. foliol. (cucullato) frondi innato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 339.*

Marileia &c. *Mich. gen. tab. 4. f. 1.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 74. f. 41.*

Hepaticoides &c. *Vaill. paris. tab. 19. f. 4. ob petala brevita.*

In Europæ ripis elatioribus, umbrosis, udia.

Planta atrovirens. Fol. brevita, lata, pallida, linea nigra divisa, in obtusas lacinias minus profunde secta, humifusa, tenuia, lævia, læte viridia, pellucida. Ex medio ramorum folio vaginæ cylindricæ, quasi laceræ, hirsutæ. Fl. albicantes.

30. *pinguis*. *J. acaul. frond. oblonga, sinuata, pingui (ex oris florifera)*. *Syst. veg. ed. 14.*

Maršilea &c. Mich. gen. tab. 4. f. 2.

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 74. f. 42.

Hepatica &c. Vaill. parisi. tab. 19. f. 6.

Lichen &c. Pluck. alm. tab. 42. f. 2.

In Europæ paludibus.

Fontana, cespitosa, dichotoma, fragilis, pellucida. Fol. absque linea nigricante. Fl. nigricantes, Varia ludit facie.

31. *multifida*. *J. acaulis; frondibus bipinnatifidis. Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 74. f. 43.

In Angliæ, Germaniæ ericetis.

Planta parva. Frondes humifusæ, pallide virides. Foliol. oblonguscula, luteo-viridia. Pedunc. subpollic. Anth. atra. Fol. per siccitatem obscure viridia.

32. *furcata*. *J. acaulis; fronde linearî, ramosa, extremitatibus furcatis, obtusiusculis. Syst. veg. ed. 14.*

Maršilea &c. Mich. gen. tab. 4. f. 4.

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 74. f. 45.

Hepatica &c. Vaill. parisi. tab. 23. f. 11.

In Europa, ad truncos, rupes, & e terra.

Surcul. prostrati, prælongi, plani, ramosi: Frondes ramosæ, molles, pilis raris ciliatæ, luteo-virides, odoratæ. Linea dorsalis, viridis. Fl. nigricantes.

33. *pufilla*. *J. acaulis; fronde subhipinnatifida, laciniis imbricatis (e basi florifera). Syst. veg. ed. 14.*

Lichenastrum &c. Dill. musc. tab. 74. f. 46.

In Europæ rupibus, ericetis, humentibus.

Frons brevissima; substantia tenera, pellucida, col. pallide viridi. Capitula rotunda, nigra, lucida.

- subspinosa*. *J. pinnulis alternis. Dill. musc. tab. 70. f. 16.*

In Guiana.

- tridentata*. *J. frondibus sterilibus, humifusis; floriferis erectis: fol. secundis, tridentatis. Scop. Fl. Carn.*

In vallibus subalpinis.

- convexa*. *J. surcul. aggregatis, simplicibus, lineas 2-4. longis, convexis: foliolis imbricatis, dentatis. Scop. Fl. Carn.*

In putridis arboribus.

Lati cespituli, coloris *Bryi muralis*, ex furculis dense congestis, adscendentibus, & prostratis, apice oblong. Fol. amplexicaul. dense imbricata ita locantur, ut 4. facies longitudinales referant, cum duæ tantum sint.

minima. J. minima; fol. auritis, ex rotundo-acuminatis, punctatis. *Scop. Fl. Card. Mich. gen. tab. 6. f. 19.*

In putridis arboribus.

Surcul. repens, ramosus, luteo-virens. Foliol. rariora, vix auriculata, integra, aut subdentata, concava, aristata.

serpyllifolia. J. furcul. procumbentibus, attenuatis, deflexis: foliol. subrotundis, integerrimis, sine auriculis: thecis dorsalibus. *Scop. Fl. Carn.*

In sylvis sub truncis putridis.

Surculi lin. 3-4. longi. Qui eriguntur fol. summa albo polline adspersa gerunt.

J. minor, durior: fol. auricularis, bicuspidatis. *Hall. helv. n. 1876.*

Planta nova subalpina. In Helvetia.

Surcul. semisuberecti, uncial. simplices. Fol. lanceol. adparent; in aqua tamen resolvuntur.

Pars maior lanceol. paulo longius aristata. In apice folia congeruntur, inferne rara.

J. fronde plana, pinnata, dichotoma; ramulis brevissime bicornibus. *Hall. helv. n. 1886. Mich. gen. tab. 4. f. 6.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 74. f. 47.*

Hepatica &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 3.*

In stagnis.

Valde simil. J. fureata, surcul. planis, eiusdem fere latitudinis, dichotomis; ramis brevissime, & obtuse bicornibus.

1425. TAR- GIONIA. Cal. 2-valvis, includens globum. Anth. cam- panulata, sessil. in fundo calyc.

1. *hypophylla*. T. minima, & vulgaris. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 3.*

Lichen. &c. *Dill. musc. tab. 78. f. 9. Col. ceph. 1. tab. 333. Buxb. cent. 1. tab. 61. f. 4.*

In Italia, Hispania &c, locis aqua humidatis, sabulosis, præsertim secus flumina.

Planta minima, non raro parvi digiti unguis magnitudinem æquat. Frondes coriaceæ, ad-

gregatæ, cordatæ, seu subcuneatæ, supra virescent. punctatæ, subtus lineolis fuscis, sulcatis. Cum grandior est, totum solum ex purpura nigrescit, atque in extremo intumescit.

1426. MAR- *Masf.* Cal. peltatus, subtus tectus. Cor. 1-pet.
CHANTIA. tal. Anth. multifidæ.

Fem. Cal. sessil. campanulat. polyspermus. *Substantia firma, coriacea. Fol. lamellosa, subarticulata; vegetabilibus, aut mineralibus adhaerentia.*

1. *polymorpha.* M. calyc. communi decemfido. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. 2. tab. 1. f. 1.*

Lichen &c. *Dill. musc. tab. 76. f. 6. Fuchf. hist. 179. Camer. epit. 782.*

b. M. *Ad. parif. 1713. tab. 3. Mich. gen. tab. 1. f. 2.*

c. M. *Mich. gen. tab. 1. f. 3.*

Hepatica 3. *Tabern. ic. 813.*

In Europa, iuxta aquas lente fluentes, & locis umbrofis.

Fol. membranacea, carnosæ, multipliciter imbricata, in terræ superficie sese diffundentia, nitida, nervo maiori per medium discurrente; varia, modo latiora, & breviora, modo longiora, & angustiora; eaque plus, minus divisa, Quercus forma sinuata, supra satyre virid. nitida, subtus pallidiora.

b. *Frons æquabilis. Pileus luciniosus, laciniis teretiusculis, apice dilatatis, dentatis, sub quibus globuli pilosi. Setæ teretiuscul. raris pilis ad basin adpersæ.*

c. *Pileus planus, crenulatus, sub quo globuli imberbes. Setæ angulosæ, nullibi pilosæ.*

2. *chenopoda.* M. cal. communi dimidiato, palmato, 4-fido. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichen &c. *Plum. fil. tab. 142. Dill. musc. tab. 77. f. 8.*

In Martinica.

Planta pinguiuscula, tota ex meris membranifacæ, super humentia saxa sese diffundens. Hæ membranulæ, *Opuntia* ad instar, unæ ex aliis procedunt, sinuosæ, late virentes, punctatæ.

3. *crenata*. M. calyc. communi, 4-partito; laciniis tubulosis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Lichen &c. *Dill. musc. tab. 75. f. 3. Buxb. cent. tab. 62. f. 2.*
Lunaria vulgaris. Mich. gen. tab. 4.
In Europæ umbrosis.
 Gregatim nascitur. Frons viridissima, rotunde lobata, squamosa, areolis, & vesiculis distincta. Scyphi lunati.
4. *tenella*. M. calyc. communi hemisphærico, apiculato; margine lamellis radiato. *Syst. veg. ed. 14.*
 Lichen &c. *Dill. musc. tab. 75. f. 4.*
In Virginia.
 Fol. exigua, angusta, carinata, integra, vel scissa, tenuiter crenata, viridia, vel obsolete purpurascens. substantia pellucida, exsucca. Setæ uncial. capillaceæ, nigrae; Capitula parva, ex rotundo-apiculata, margine fimbriato, candicante.
5. *hemisphærica*. M. calyc. comm. quinquesido, hemisphærico; perichætio nullo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 762.*
Hepatica &c. Mich. gen. tab. 2. f. 2.
 Lichen &c. *Dill. musc. tab. 75. f. 2. Buxb. cent. 2. tab. 3. f. 1.*
In Europæ paludosis, umbrosis, montanis.
 Frons late viridis, villosa, non reticulata, bilobata, margine crenato, ciliato. Setæ uncial. hirsutæ, nigrae. Capitul. hemisphæricum, sulcus globulis 3. dissiliens, pollensque effundentibus.
Perichætia nulla, nec calyc. seminiferi.
6. *conica*. M. calyc. communi 3-loculari, subovato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 274.*
 Lichen &c. *Dill. musc. tab. 75. f. 1. Giff. opp. tab. 1. Col. exphr. 1. tab. 331.*
Hepatica &c. Vuill. parif. tab. 33. f. 8. Mich. gen. tab. 2. f. 1.
In Europæ umbrosis, ripis elevatis.
 Frons simil. priori, lata, obtuse laciniata, plana cespites efficit, & superficiem habet reticulatam, & albo-tuberculosam. Pileus extrinsecus floris formæ, 5-locul.
- Ob inflorescentiam novum genus postulat,*

7. *androgyna*. M. calyc. communi, integro, hemisphærico.

Syst. veg. ed. 14.

Lichen &c. Dill. musc. tab. 75. f. 3.

In Italia, Jamaica, inter saxorum crepidines, locis subhumidis.

Monoica simul, & androgyna. Frond. partial. lineari-dichotomæ, virides, glabræ, subpellucidæ, vena nigricante distinctæ, oblique squamosæ. Capitula parva, fungiformia. Scyphuli orbiculares, bracteas referentes, margine integro, limbo tuberculoso.

triandra. M. pileo hemisphærico, integro, triloculari.

Scop. Fl. Carn. tab. 63. f. 1355.

In humo, sub radicibus arborum.

Minima, florendo tabescit. Foliol. uncial. profunde, & dichotome laciniata, tenuia, punctata, ex ultimis divisionibus educunt setæ capitula sublineares.

quadrata. M. pileo hemisphærico, semi-4-fido, 4-locul.

Scop. Fl. Carn. tab. 63. f. 1356.

Inter saxa, in muris, & rupibus.

Proxima M. *androgyna*, sed icon Mich. & Dill. pileos quadratos non habent; sicuti nec descriptio Linneana. Superficies pilei, florescentiæ tempore, fusco-rubens.

1426. *BLASIA*. Mas. Cal. cylindricus, granis repletus.

Fem. Cal. nudus; fructu subrotundo, fol. immerso, polyspermo. Habitus, & facies Lichenis. Expansio foliosa, in orbem plerumq. disposita, non crustacea, ut in Lichene, utriculosa, viridissima, ramosa, lobis subrotundis, rotunde crenatis. Nervi mediam frondem dividunt.

f. *pusilla*, B. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 45. Mich. gen. tab. 7.

Mnium &c. Dill. musc. tab. 31. f. 7.

In Europa, ad latera fissarum, solo ex arena sterili.

Fol. plura, tenuia, pellucida, venis quibusdam albidis ad basin distincta, bifariam divisa, & subdivisa, ambitu paulisper elevato; reliqua interiori parte humifusa, & tenui lanugine terræ adfixa.

1427. *RICCIA*, Cal. o. nisi cavitatem vesicularem intra fol. substantiam. Cor. o. Anth. cylindrica, sessilis, germiui imposita. Pistil. Germ. turbina- tum. Styl. filiform. antheram perforans. Pe- ric. spheric. coronatum anth. emarcida. Sem. hemisphærica, pedicellata. *Fröns coriacea, re- pens, pulposa, Jungermanniis acaulebus, vel Marchantiæ similis.*

1. *crystallina*, R. frondibus superficie papillofis, *Syst. veg. ed. 14. Ad. palat. tab. 2. f. 9. Mich. gen. tab. 57. f. 7. 3.*

Hepatica &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 2.*

Lichen &c. *Dill. musc. tab. 78. f. 12.*

In Europæ locis subhumidis.

Pinguis, & superficie crystallina. Frondes cor- datæ, reticulatæ, obtuse denticulatæ, pla- næ, in orbem spatæ, in 2-3. lobulos divisæ, oris latiuscul. obtusis.

2. *minima*, R. frondibus glabris, 2-partit. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 57. f. 6.*

Lichen &c. *Dill. musc. tab. 78. f. 11.*

In Europæ inundatis.

Fol. exigua, sulcata, nitida, segmentis angu- stioribus, acutis; col. & substantia herbacea.

3. *glauca*, R. frondibus glabris, canaliculatis, bilobis, lo- bis lanceolat. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 57. f. 4.*

Hepatica &c. *Vaill. parif. tab. 19. f. 1.*

Lichen &c. *Dill. musc. tab. 78. f. 10. Buxb. cent. 2. tab. 5. f. 5.*

In Italia, Gallia, Anglia.

Frons crassa, pulposa, glauco-virid. non pellu- cida, terræ arcte adhærens.

4. *fluitans*, R. frondibus dichotomis, lineari-filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Ad. palat. tab. 2. f. 8. Fl. Dan. tab. 275.*

Lichenastrum &c. *Dill. musc. tab. 74. f. 47.*

Hepatica &c. *Vaill. parif. tab. 10. f. 3.*

In Europæ fossis, piscinis, ad ripas, supra aquam extensa.

Frondes ramosæ, fusco-virides, Cilia rariora, albida.

5. *natans*, R. frondibus obcordatis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichen &c. *Dill. musc. tab. 78. f. 18.*

In stagnis Angliæ, Germaniæ.

Fol. parva, temere congesta, plana, tenuia, supra obsolete viridia; subtus fusco-purpur. figuræ variæ, alia integra, pleraque 2-fida. *Margines ciliatæ revera non sunt, sed tantummodo radiculis marginalibus, sapius explanatis illam faciem debent.*

R. fronde reticulata, æquabili, lobis 2-partit. & 3-part: lobulis triangularibus. *Hall. helv. n. 1895.*

An R. Mich. gen. tab. 57. f. 3? accedit ob pilos.

In aquæ superficie.

Ex comm. centro octo foliol. fere in orbem sparguntur, reticulata, areis hexagoniis, inferne pilis obstita, nervo medio depressiori divisa; qua nota a *Dillen. planta differt.*

1418. ANTHO-CEROS. *Mos. Cal. sessilis cylindric. integer. Anth. subulata, longissima, 2-valv.*

Fem. Cal. 6-part. Sem. 3. Frons coriacea, plana.

1. *punctatus*. A. frondibus indivisis, sinuatis, punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 396. Dill. musc. tab. 68. f. 1. Mich. gen. tab. 7. f. 2.*

In Italiæ, Angliæ &c. uliginosis, umbrosis.

Planta Licheniform. late diffusa. Fol. brevina, carinata, subtus incurvata, tenuia, pellucida, satute viridia; e quorum superficie crebri pedunculi, virides, acicularum instar dividuntur primo vere; dein 1-2-3. uncias longi, virides.

2. *lævis*. A. frondibus indivisis, sinuatis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 68. f. 2. Mich. gen. tab. 7. f. 1. Schmid. ic. tab. 19.*

Lichen &c. Burb. cent. 1. tab. 61. f. 1.

In Europa, & Amer. boreali.

Fol. latiora, imbricata, rotunde sinuata. Pedunc. ex media fronte uncia etiam longiores.

3. *multifidus*. A. frondibus bipinnatifid. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 88. f. 4.*

In Germania.

Frons uncial, ramosissima, pinnata, ad angulos rectos

rectos divisa; pinnulis sublinearibus, dilute viridibus.

429. LICHEN. *Musc.* Receptacul. subrotund. planiuscul. nitidum.

Fem. farina foliis adpersa. *Substantia filamentosa, solida, aut rigida, ramossissima; vel foliacea, crustacea, vel tubercula subinens.*

A. Leprosi, tuberculati.

l. scriptus. L. leprosus, albicans; lineol. nigris, ramosis, characteriformibus. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 56. f. 3.*

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 18. f. 1.

In Europæ corticibus arborum.

Crusta obscura, cinereo-albicans, tenuissima, rimas agens varias arborum, literas hebraicas, aut chinenfes exprimentes.

l. geographicus. L. leprosus, flavescens, lineolis nigris map-pam referens. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dun. tab. 468. f. 1?*

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 18. f. 3.

In Europæ rupibus altis, & saxis.

Crusta tenuissima, flava, lapidi adpressa, inseparabilis, late saxum tegens, tabulam simulans geographicam.

l. atro-virens. L. leprosus, viridis, margine, tuberculisque atris. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europæ rupibus.

Tubercula parva, conferta, flavo-virescentia, ut tota area flavo-virens adpareat, margine nigro.

l. byssoides. L. leproso-farinaceus; peltis stipitatis, subglobosis. *S. fl. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 14. f. 3.

In Europæ glareosis.

Crusta farinosa, viridi-cinerea. Peltæ pro ratione magnæ, ex livido-rubescens.

l. laevis. L. leprosus, albus; tuberculis concoloribus, hemisphæricis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ubique in rupibus, & saxis.

Crusta senescens fusca. Tubercula conferta, mauscula.

l. rupicola. L. leprosus, albidus; tuberculis pallidis, albo-marginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Tom. VI.

Q

Supra rupes planiusculas, nudas, apricas, in sylvis.

Crusta parva. Tubercula quandoq. sunt virescentia, subconvexa, absque margine; unde diversa adparet.

7. *pertusus*. L. leprosus: verrucis subtessellatis, lævigatis, pertulis, uno, alterove cylindrico. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 766.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 9. Mich. gen. tab. 56. f. 2.*

Lichen &c. *Mich. gen. tab. 52.*

In saxis, & arboribus Europæ.

Crusta alba, tenuis; florens crassa; verrucis angularis.

8. *rugosus*. L. leprosus, albicans; lineolis simplicibus, punctisque nigris, confertis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 2.*

In Europæ sylvis, supra arborum truncos.

Crusta evidentiori, & tubercul. parvis, rotundis differt a L. *scripto*.

9. *sanguinarius*. L. leprosus, cinereo-virescens; tubercul. atris. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 3.*

In Europæ rupibus, truncisque arborum.

Crusta tenuissima, plerumq. linea nigra circumscripta. Tubercula magna, subglobosa, non nitida, intus rubra, margine obsoleto, angulato, non membranaceo.

10. *fusco-ater*. L. leprosus, fuscus; tubercul. atris. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europæ rupibus.

Ex meris atris, irregularibus tuberculis, nunc sparsis, nunc iunctis conitat.

11. *vernalis*. L. leprosus, albidus; tubercul. subrotundis, ferrugineis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 4. & tab. 55. f. 8.*

Possit in Europa.

Crusta cinerescens-alba. Tubercula conferta, subglobosa, sessilia, gelatinosa.

12. *calcaris*. L. leprosus, candidus; tuberculis atris. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 8.*

In Europæ rupibus marmoreis.

Substantia Tartaro Visi similis, figura, & cras-

stie valde similis, sulphur. dein albidæ. Superficies rimosa, subaspera, eminentiis candidis, vix conspicuis.

13. cinereus. L. leprosus, tubercul. nigris (minutissimis), albo-marginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In rupibus, & saxis.

Simil. L. fusco-atro, sed tuberculis minoribus.

Margo Lichenis niger est.

14. atro-albus. L. leprosus, niger; tuberculis atro, alboq. mixtis. *Syst. veg. ed. 14.*

In alpium rupibus.

Difficile dictu, quinam color constituat crustam.

15. niger. L. leprosus ater, tubercul. subrotund. concoloribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Hall. helv. n. 2084.*

In rupibus.

A. L. nigro vetustarum arborum differt gl'ulis subrotund. nigris, per superficiem sparsis.

16. Oederi. L. leprosus, ruber; tubercul. nigris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc. Fl. Dan. tab. 470. f. 1.*

Habitat in rupibus.

Crusta varians col. luteo, & rubro.

17. ventosus. L. leprosus, flavus; tuberculis rubris. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 472. f. 2.*

In alpium rupibus.

18. fagineus. L. leprosus, albus; tuberculis albis, farinaceis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 53. f. 1.*

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 18. f. 11.

In Europa, ad truncos Fagi &c.

Crusta alba, verrucis concoloribus. Tubercula crebra, villosa.

19. carpineus. L. leprosus, cinereus; tubercul. rugosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Carpini truncis, ramis.

Crusta cinereo-virescens, tenuissima, lævis. Tubercula conferta, sessilia, rotunda, viridula in recenti planta; cinerea in sicca.

20. corallinus. L. leprosus, ramosus, teres, fasciculatus, fissigatus, confertissimus, albus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa rupibus, & lapidibus.

Simil. L. calcario. Crusta rariissima, quæ fracta conspicitur constare fol. confertissim. teret.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

tibus, ramosis, fig. *Corallii*, absque tuberculis.

21. *eriacetorum*. L. leprosus, candidus; tuberculis incarnatis.

Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 59.

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 1.*

Fungus &c. *Bucc. musc. tab. 10.*

Fungilli &c. *Mientz. pug. tab. 6.*

In Europa sylva pectinibus, glareosis uliginosis.

Crusta tenera ex glebulis calcariis minimis im-
conspicuis; alisque maioribus composita glo-
bulis rotundis, & albis, terram macilentam
obducit. Glebulæ majores excresecunt in fungulos
cylindricos, qui capitula dilute rosea, calca-
ria, & rotunda gerunt. *Var. peltis fissipata;*
& fissili plana.

B. Leprosi, scutellari.

22. *candelarius*. L. crustaceus, flavus; scutellis luteis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 18.*

*In Europæ parietibus, muris, truncis arbor. præ-
sertim Quercus.*

Crusta lata, foliacea, laciniata, rotunde lobata. Scutellæ planæ, in centro cespitis.

23. *gelidus*. L. crustaceus, albicans; peltis tuberculosis, rugosis, testaceis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 170. f. 2.*

In Islandia faxis.

Crusta foliacea, orbicularis, longitudinaliter ru-
gosa, arcte faxis adhærens. Peltæ convexæ,
rufa testaceæ.

24. *frigidus*. L. crustaceus, albicans, suffruticulosus, ramulis brevissimis confertis: peltis marginatis, testaceis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. diff. musc. tab. 2. f. 4. Act. Med. Svec. T. 1. tab. 35. f. 4.*

Habitat in alpinis Lapponicis.

Crusta crassa, incipiente farinosa, deinde ver-
rucosa, & quidem non absimilis fig. *Dill. tab. 17. f. 36.* & demum fere fruticulosa; humi-
da, gelatinosa instar evadit; sicca fragilissima.
Peltæ crocæ, albo-marginatæ, crenulatæ.
Characteri *L. gelidi* accedit, sed huic crusta
foliacea, faxis adnata, peltis radiatis, absque
ullo margine.

25. *tartareus*. L. crustaceus, ex albo-virescens; scutellis fuscis.

sco-flavescentibus, margine albo. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 51. f. 6.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 12.*

In Europa, ad rupium parietes.

Omnium crassissimus, verrucosus, glebulis factus subrotundis.

26. *æruginosus*. L. crustaceus, æruginosus: scutellis carneis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Fl. Austr. 3. tab. 275.*

Super putridos vaslarum arborum truncos.

Crusta col. æruginosi, late sese extendens, siccata magis cinerea. Scutellæ pulvinatæ, inæqualiter orbiculatæ, integræ, vel sinuatæ, glabræ.

27. *flavescens*. L. crustaceus, verrucosus, flavescens; scutellis rubris, margine albo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 1.*

Habitas

Proximus L. tartarico. Crusta tartarea, flavescens, crassa, verrucosa, verruculis inæqualibus: maioribus aliis, iisque veluti hemisphærico-convexis: aliis minimis, supra superficiem maiorum. Scutellæ ubique dispersæ, inæqual. sessiles, orbiculares, vel oblong-oval. alias irregulares, modo integræ, modo lobatæ, plerumq. concavæ, tamen etiam planiusculæ, aut depressæ, semper sanguineæ margine elevato, albo cinctæ; dum crusta *L. tartarei* ex albido-virescit, & scutellæ ex viridi-flavescent.

28. *pallescens*. L. crustaceus, albicans; scutellis pallidis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 51. f. 4. Dill. musc. tab. 18. f. 17.*

In Europa lapidibus, ascribitur, trabibusque putridis, & arborum corticibus.

Lichen sæpe in orbem digestus. Fol. marginalia imbricato-plicata, cæteris latiora, rugis longitudinaliter interpositis; centralia subirregularia. Color ochroleucus, subcervinus. Scutellæ congestæ, planæ, rotundæ, etiam angulosæ, concolores, ora alba.

29. *lentigerus*. L. crustaceus, albicans, sublobatus; scutellis albo-marginatis, ætate flavescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc.*

Habitas in rugibus terra cæcis inter muscos.

Crusta alba, nirens, in rotulas orbiculares expansa. Scutellæ parvæ, concavæ.

30. *subfuscus*. L. crustaceus, albicans; scutellis nigris; junioribus urceolatis, cavis (margine cinereo, subcrenato). *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 16.*

In Europæ arboribus, & rupibus.

Crusta verrucosa, tenuis. Scutellæ primum rufæ, dein fusæ.

31. *muscorum*. L. crustaceus, incanus; tuberculis atris, connexis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc. Habitat in terra, & in muscorum stiratibus.*

Crusta *B.ffi incani*. Tubercul. in siccioribus interdum plana, ætate sæpius turbinata.

32. *parvulus*. L. crustaceus, albus; peltis concavis, obrusis, pallidis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 18. f. 10.*

In muris.

Pulchellus, coriaceus, tenax, verrucis albis, aut ochroleucis, in crustam coalescentibus. Scutellæ magnæ, ovatæ, ora tumente, concolores.

33. *upsaliensis*. L. crustaceus; foliol. subulatis, striatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In tumulis jugis alpium. Upsaliæ.

Magnitudo L. *saxatilis*, cinereo-albus, constans setis rectis, albis, prostratis, emarcidis, inæqualibus, longitudine unguis, simplicibus. Scutella radicalia, nec setis insidentia, maiuscula, alba, margine obruso.

C. Imbricati.

34. *centrifugus*. L. imbricatus; (fronde semipinnata) foliol. obsolete multifid. lævibus, albidis, centrifugis; scutellis amplis, rufo-fuscis. *Syst. veg. ed. 14.*

Buxb. cent. 2. tab. 7. f. 3. Dill. musc. tab. 24. f. 75. Lin. Fl. Lopp. tab. 11. f. 2.

In Europæ frigida rupibus.

Progradiendo a centro ad peripheriam, sensim in medio deliquescendo, dignoscitur. Color subviridis cum glaucescencia, subtus villosus atro. Lobuli longi, rotunde laciniati.

35. *saxatilis*. L. imbricatus; (fronde semipinnata, rotundo lobata) foliol. sinuatis, scabris, lacunosis; scutellis badiis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. paris. tab. 21. f. 3. Michx. gen. tab. 49. f. 1.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 24. f. 83.*

Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 13. tab. 7. f. 6.*

In Europæ rupibus, & arborum corticibus.

Supra atro-glaucus; subtus nigricans, & pilosus. Scutellæ per totam superficiem dispersæ, partim concolores, partim spadiceæ, ora alba.

36. *omphalodes*. L. imbricatus; foliol. multifid. glabris, obtusis, incanis; punctis vagis eminentibus. *Syst. veg. ed. 14. Vahl parif. tab. 20. f. 10.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 24. f. 80.*

In Europæ rupibus.

Fol. supra lævia, nitida, purpur. vel spadicea, & lacunosa; subtus nigricantia, & cirrhosa. Scutellæ ora sæpe fissi, intus fol. concolores, glabræ; extus cinereæ, subhirsutæ.

37. *olivaceus*. L. imbricatus; (fronde semipinnata) foliol. rotunde lobatis, lividis, nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Vahl: parif. tab. 20. f. 8.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 24. f. 78.*

In Europæ rupibus, & corticibus arborum.

Lichen fusco-olivaceus, cortici undiq. adnatus; papillis minimis, fuscis in disco, subtus totus carbonarius, & villosus. Scutellæ magnæ, patentés, reflexæ, intus virides, extus cinereæ.

38. *fahlunensis*. L. imbricatus; (fronde laciniata, nigerrima) foliol. linearibus, dichotomis, planiusculis, acutis, scutellis concoloribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 10. f. 2.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 24. f. 81.*

In Europæ rupibus nudis.

Siccus, cespitosus, aterrimus, nitens, inferne crustaceus. Scutellæ rotundæ, nitentes, margine paulum elevato.

39. *Aygius*. L. imbricatus; foliol. palmat. recurvis, atris. *Syst. veg. ed. 14.*

In Svecia.

Fol. supra convexa, punctis minimis, elevatis, confertis. Scutella orbiculata, nigra, concava, margine obtuso, crenulato.

40. *crispus*. L. imbricatus; fol. lobatis, truncatis, crenatis, atro-viridibus: scutellis concoloribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 19. f. 23. an
tab. 26. f. 26?

Ad murus.

Scutellæ magnæ, recentes atro-virides, limbo
crenato; siccæ e rufo-fuscæ, margine atro.

41. *crissatus*. L. imbricatus, dentato-ciliatus: scutellis fol.
maioribus. Syst. veg. ed. 14.

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 19. f. 25. B.
f. 26.

In Europa australi.

Fol. 2. lineas lata, apice 3-4-denticul. Scutel-
læ subconcaavæ, limbo crenulato, atro-rufæ.

Sicca planta fusca evadit.

- b. Color ex viridi-glaucus, per siccitatem ad plum-
beum vergens. Scutellæ cul. disci fusco; limbo
fol. concolore.

42. *rigidus*. L. imbricatus; foliol. teretibus, compressis,
ramuloso-multifidis, atris centrifugis: scutellis
sessilibus, concavis, concoloribus. Syst. veg.
ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 6. Hall. helv.
n. 1966. tab. 47. f. 1. Dill. musc. tab. 17.
f. 37.

In Helvetia &c.

Lichen minimus, in circulum cespitosus, fur-
culis durissimis, nigris, teretibus, compressis,
nitidis; cæterum dichotomus. Scutellæ cavæ,
planæ, concolores, ut ad Lichenes pulmona-
rios accedat.

43. *parietinus*. L. imbricatus; foliis (rotunde lobatis) crispis,
fulvis; peltis concoloribus. Syst. veg. ed. 14.

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 24. f. 76. C.

In Europæ parietibus, rupibus, lignis.

Aliquando viridis. Fol. in orbem congesta, mar-
gine inæqualiter laciniato; marginalia cæteris
latiora.

44. *physodes*. L. imbricatus; (fronde semipinnata) laciniis ob-
tusis, subinflatis. Syst. veg. ed. 14. Buxb.
cent. 3. tab. 14. f. 1. Mich. gen. tab. 50. f.
1. 2.

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 20. f. 49.

In Europæ corticibus B-tulæ, saxis, & rupibus.

Differt a cæteris apicibus folior. tumidis, & sè
transversim secantur, inflatis. Lichen cavus,
supra albo cinereus, subtus ater. Vento agi-
tatus, fluctuare solet.

43. *stellata*. L. imbricatus; (fronde semipinn. obtusa, lobata) foliol. oblongis, laciniatis, angustis, cinereis: scutellis pullis. *Syst. veg. ed. 14. Michx. gen. tab. 43. f. 2.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 24. f. 7.*

In Europa ramis arborum.

Cinereus, vel niveus, fuscus, aut olivaceus; inferne nigricans, orbiculatus, tenuis. Scutellæ fuscæ, dein nigricantes.

46. *granulatus*. L. imbricatus; foliol. subrotund. crenatis, scabriuscul. atro-viridibus: scutellis fulvis, disco depresso. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 19. f. 24.*

In arenis humidis.

Plumbeus. Scutellæ in disco sparsæ, plurimæ; parvæ, rubræ.

D. Foliacei.

47. *chrysophthalmus*. L. foliaceus, subimbricatus, linearis, lacerus; ciliatus: peltis elevatis, radiatis, fulvis. *Syst. veg. ed. 14.*

In cap. b. spei rupibus.

48. *Burgesii*. L. foliaceus, subimbricatus, crispus, peltis elevatis, muricato-crispis, fundo depresso, plæno. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat

Scutellæ planæ, nitidæ, margine crispo.

49. *siliaris*. L. foliaceus, erectiusculus; laciniis linearibus; ciliatis: scutellis pedunculatis, crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 711. Vuill. parif. tab. 20. f. 4. Tourn. inst. tab. 323. f. 5.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 20. f. 45.*

Musci &c. *Lucf. pruff. tab. 50.*

Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 6.*

In Europa arboribus.

Color supra glauco-fuscus, subtus albus. Cespes densus, & valde ramosus. Cilia ramorum nigricantia, aut rufescentia.

50. *islandicus*. L. foliaceus, adscendens, (convexus, pustulatus) laciniatus; marginibus elevatis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 155. Michx. gen. tab. 44. f. 4. Buxb. cent. 2. tab. 6. f. 1. 2.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 28. f. 111. b. f. 112.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 7. f. 34.*

In Europæ sylvis sterilibus, terra, & lapidibus innascitur.

Variabilis planta, sed semper sicca, & dura; super terram late diffunditur, profunde laciniata, laciniis supra rufescentibus, aut ex viridi-rufis, vel flavescentibus: subtus albidis, margine spinoso, ciliato. Peltæ extremis foliis arcte adnatæ, latæ magis, quam longæ, spadiceæ, limbo exili, non spinoso.

Vr. 1. fol. tenuioribus, & crispioribus.

= 2. ramulis omnino teretibus, intus cavis, nec ciliatis, at color luridus, basi rubra.

92. *ovata*. *L. foliaceus, adscendens, laciniatus, crispus, glaber, lacunofus, albus, margine elevato. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 227. Fl. Lapp. tab. 11. f. 1.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 21. f. 56.*

In Lapponia, Upsalia &c. alpina.

Cespitosus, ramosus: adultus in crispam naturam sui dissimilem abit. Fol. segmenta ultimæ dentata. Color albus (ramis subterreis) vel subviridis, demum flavus. Scutellæ spadiceæ, margine flavo.

93. *pulmonaria*. *L. foliaceus, laciniatus, obtusus, glaber; supra reticulato-lacunofus; subtus tomentosus. Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 29. f. 113.*

Pulmonaria &c. *Fuchf. hist. 631. Cam. epit. 783. Mich.*

In Europæ sylvis umbrosis super arbores antiquas, præsertim in Fagis, & Quercubus.

Frons lata, numinum bracteatum referens. Scutellæ sparsæ. Color naturalis, per siccitatem rufus.

94. *furfuraceus*. *L. foliaceus, decumbens, furfuraceus, laciniis acutis (supra farinosis), subtus lacunofus, plerumq. reticulatis, atris. Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 38. f. 1. Buxb. sent. 2. tab. 7. f. 1.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 21. f. 52.*

In Europæ arboribus, & alpium sylvis.

Lichen confertus, ramosissimus, corniculatus, mollis. Fol. ex angusta basi sensim dilatata, cornu cervini divisura, spinulis minutis quan-

doq. prædita. *Var. superficialis subius alba, & absque reticulo.*

94. *ampullaceus*. L. foliaceus, planiuscul. lobatus, crenulatus: peltis globosis, inflatis. *Syst. veg. ed. 14.* Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 8a.*

In Anglia.

Fol. tenuia, utrimq: glabra, altera parte subfusa, altera ex purpureo-nigricante, laciniiis brevibus, & latis. Scutellæ pro ratione plantæ magnæ, vesiculosæ, glabræ, extus cineræ, intus purpur.

95. *leucomeles*. L. foliaceus, linearis, remosus, nigro-subciliatus: peltis subpedunculat. radiatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. meridion.

Fol. palmaria, parentia, inæqualia, lactea, supra glabra, subtus subseriata. Peltæ hemisphæricæ, albæ.

96. *farinaceus*. L. foliaceus, erectus, compressus, ramis acutissimis: verrucis marginalibus, farinosis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 20. f. 14. 15. 13.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 23. f. 63.*

In Europæ arboribus, præsertim Quercetis, Fraxinetis, & silvis montanis.

Ludit magnitudine folior. Color. glauco-virens. Rami ultimi acute bicornes.

97. *linearis*. L. foliaceus, erectus, dichotomus, ramis linearibus, divaricatis, altero latere canaliculatis: peltis minutis, marginalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc.*

Habitat in nova Zeelandia.

98. *Filix*. L. fronde slipitata, bifida, laciniata, lobata, lobis obtusis, crenatis: scutellis sparsis, planiuscul. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc. tab. 2. f. 2. Aët. med. Svec. T. 1. tab. 15. f. 1.*

Habitat in nova Zeelandia.

Stipes brevis, nudus.

99. *rupesstris*. L. foliaceus, membranaceo-gelatinosus, lobatus, lobis obtusis: scutellis sparsis, minutis, concoloribus. *Syst. veg. ed. 14. -- Dill. musc. tab. 19. f. 22.*

Habitat in rupibus aquosis, inter muscos.

Atrovirens. Madidus fere coriaceus; fuscus verò rotus ater evadit: Scutellæ globosæ, vel planæ, raro reperiuntur.

60. *salicaria*. L. foliaceus, erectus, lacunofus, convexus, ramosus, (lacinii linearibus, acutis rigidis, farinosis: scutellis terminalibus). *Syst. veg. ed. 14. Mich. tab. 22. f. 11. Vaill. paris. tab. 20. f. 6. b. tab. 21. f. 2.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 23. f. 62. A. B. C.*

Musco-Fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 16. tab. 7. f. 3.*

In Europæ arboribus, rupibus.

Planta 2-3-pollic. pallide cinerea. Lacinia tenuis, dichotomæ cespitem efficiunt; ramorum apicibus rostratis. Scutellæ leviter cavæ, subrotundæ, concolores.

61. *fraxinea*. L. foliaceus, erectus, oblongus, lanceolatus, (fronde latissima) sublaciniatus, lacunofus, glaber: scutellis subpedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Tourn. Inst. tab. 323. f. A. B.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 22. f. 39.*

Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 14. 3. 4.*

- b. Lichen. &c. *Mich. gen. tab. 36. f. 1.*

In Europæ arboribus, præsertim Fraxinis.

Variat magnitudine. Difformis, utrimq. lacinia- tus, sed inferne profundius, utrimq. flavescens, quandoq. rufescens. Fol. plura, tuberculo lignoso infidentia. Lacinia obtusæ, rigidæ, rugosæ.

62. *fuciformis*. L. foliaceus, rectiuscul. lævis, subtomentosus, ramosus, lacinii lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 22. f. 61.*

Fucus Roccella. *Bauh. hist. 3. p. 797.*

In India, Canariis.

Frondes pl. ex eadem basi, spitham. albidæ, priori similes, sed molliores, lanceol. Peltæ utriusq. sparsæ supra superficiem, & in margine copiosiores, subfissil. latiores, orbiculatæ, cineræ, margine obtuso, albo.

63. *pransfri*. L. foliaceus, erectiuscul. (utrimq.) lacunofus; subrus tomentosus, albus. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. paris. tab. 20. f. 11. 12. Mich. gen. tab. 36. f. 3.*

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 21. f. 33.

b. Lichen &c. Vaill. parif. tab. 20. f. 7.

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 21. f. 34.

Ad Europæ arbores fices.

Junior planta albicat; adulta fuscescit, et tandem nigrescit. Fol. plana, lata, divisa ad im-
star corn. Damm, supra subvirescentia, aus
flavescentia; subtus alba. Scutellæ concolo-
res.

b. *Differt superficiei non incana, & lanuginosa, seg-*
mentis varioribus, longioribus, angustioribus.

64. *juniperinus.* L. foliaceus, laciniatus, crispus, fulvus; peltis lividis. Syst. veg. ed. 14.

In Europæ juniperetis.

Differt a L. parietino, colore pallide flavo; fol.
laxis, erectiuscul. peltis disco brunneis.

65. *asperatus.* L. subfoliaceus, pallide viridis, rugosus, margine undulatus; (fronde rotunde lobata, inferne atra, & aspera). Syst. veg. ed. 14.
Mich. gen. tab. 48. f. 1.

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 23. f. 97. C.

Musco-fungus &c. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 1.

In Europa, America, ad saxa, & arbores, locis montanis.

Glauescenti-luteus, aut sulphureo-virens; raro
sentellas proferens. Ex eodem centro rugoso, &
sinuato fol. plura in orbem disposita, rugis
oblongis, & obliquis. Scutellæ sessiles, vera
rucolæ, umbilicatæ, rufescentes.

66. *evocatus.* L. foliaceus, margine pulvereo-flavo. Syst. veg. ed. 14.

In India.

Fol. L. *hepatici.* instar foliaceæ, lævia, margine subsinuata, scabraque subtus villosa-adhærentia.

67. *glauus.* L. foliaceus, repens, depressus, lobatus, glaber (supra cinereus, subtus ater): margine crispo, verrucoso, farinaceo. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 598. Vaill. parif. tab. 21. f. 12. Mich. gen. tab. 50. f. 1.

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 23. f. 96.

Musco-fungus &c. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 4.

- In Europa truncis Betulinis, & silvis montanis.*
*Differt a L. caperato, facie crispâ; laciniis ultimi-
 mus, subvittatis. Color albo-cinerefcen-
 ti-glucosus, aut tumidus, cum nitore quasi gum-
 meo; subtus in centro scaber, & nigerimus.*
*Fol. amplum, orbiculatum, papyro tenuius,
 lobis etiam crispis, & duplicatis. Scutellæ
 exiles, fulgæ.*
- 68. japonicus.** L. foliaceus, depressus, incise-lobatus, farina-
 ceus, crispus, subtus villosus. *Syst. veg. ed.*
14. Thunb. Jap.
In Japonia.
*Adfinis priori, sed subtus non glaber, verum to-
 mentosus & radicalis ramosis. Fol. imbricata,
 oblonga.*
- 69. fascicularis.** L. foliaceus, gelatinosus; tuberculis fascicu-
 latis, turbinatis; fronde majoribus. *Syst. veg.*
ed. 14. Fl. Dan. tab. 462, f. 2.
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 19. f. 27.
In Germania; Anglia.
Fol. radicalia, minuta, hyalina Tremella instar.
*Tubercula subpetiol. apice truncata, rubra, lim-
 bo obtuso.*
- 70. Tremel-
 loides.** L. foliaceus, plumbeus, rigoso-crispus, glaber:
 peltis sparsis, rubris. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
Ad cap. h. Spei.
Similis Tremellæ frondibus tumidis.
- 71. ornatus.** L. foliaceus, erectiuscul. pelucidus, crispus:
 scutellis marginalibus, plano-depressis, rubris,
 margine crispis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Europa.
Pulcherrimus, torus viridi-luteus, & tener.
*Frondes parvæ, quæ copia scutellarum maio-
 rum non adparent. Scutella nitrâ, plana,
 margine magno, viridi; unde peltæ quæ in
 L. siccharato apparent immersæ.*
- 72. nigrescens.** L. foliaceus, gelatinosus, subrotund. lobatus,
 rugosus, atro-virens: scutellis confertis, ru-
 bris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 19. f. 10.
Vespertilio Lighfood. Fl. Scotie.
In arborum truncis, rupibus, & saxis.
N. Corticæ.

73. *aquaticus*. L. coriaceus, repens, lobatus, obtusus: peltis hemisphæricis, maximis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 20. f. 44?
In Suecia sub aqua, in paludibus.
Diversus a L. crinito Dill. musc. tab. 84. f. 8.
 Fol. pallide virid. margine integerrimo. Peltæ subfessil, primum planæ, deum dilatatæ, margine reflexo, supra discum fol. positæ, incarnato-fuscæ.
74. *resupinatus*. L. coriaceus, repens, lobatus: peltis marginalibus posticis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 764. Mich. gen. tab. 44. f. 1. 2.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 28. f. 105.
In Europæ sylvis.
Differt a L. canino, quod minor, & quod peltæ a pagina terram spectante oriatur. Color supra obscure cinereus; subtus ex albo-rufescens: peltæ postice ferruginæ.
75. *venosus*. L. coriaceus, repens, ovatus, planus, subtus venosus, villosus: peltis marginalibus, horizontalibus. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 44. f. 3. & 5.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 28. f. 109.
In Europa, ad margines scrobiculorum in sylvis.
Omnium minimus. Color supra virens, subtus albus, cum nigro reticulo. Fol. brevia, lata, glabra, plerumq; integra. Peltæ nigerrimæ, aut ex violac-nigricantes.
76. *aphthosus*. L. coriaceus, repens, obtuse lobatus, planus: (supra) verrucis sparsis: peltæ marginali adscendente. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 767. f. 1.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 28. f. 106.
In Europa sylvæ acerris, sterilibus, sub Juniperis.
Differt a L. canino, virore insigni, & maculis obscurioribus. Fol. virentia satore viridia; sicca glauca. Peltæ ex fusco-virescent.
77. *arcticus*. L. coriaceus, repens, obtuse lobatus, planus, lævis; subtus avenius, villosus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Suecia boreali, sub Juniperis.
 Fol. lata, integra, albida, subtus nivea. Peltæ subtus versus marginem magna, magnitudine

pollicis, unde inter omnes Lichenes latissima, livido-incarnata.

78. *anthardicus*. L. coriaceus, repens, obtuse lobatus, planus, glaber, supra lacunofus, subtus bullatus: peltis planis, amplissimis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 10. f. 1.*

Habitat

Fol. coriaceum, molle, glabrum, inordinate undiq. lobatum, subtus album, & bullatum, supra lacunofum, & olivaceum. Lobi subtus gerunt peltas amplissimas, suborbiculares, planiusculas, glabras, & badias. In madefacto, & sicco idem ferme color est, nisi quod supra magis fuscescat in sicco.

79. *caninus*. L. coriaceus, repens, obtusa lobatus, planus; subtus venosus, villosus: pelta marginali adscendente. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 336. Fl. Dan. tab. 767. f. 2. Vaill. parif. tab. 21. f. 16.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 27. f. 102.*

Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 9. f. 1.*

In Europæ sylvis, iuxta lapides, in terra.

Amplus, col. plumbeo. Fol. magna, ex basi angusta dilatata, quasi farina cinerea tecta, subtus albi; iuniora oblonga, adulta lobata. Pelta marginalis brunnea, subtus lævis, & incarnata.

80. *sylvaticus*. L. coriaceus, repens, laciniatus, lacunofus: peltis marginalibus, adscendentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 27. f. 101.*

Mich. gen. tab. 43.

In Helvetiæ, Germaniæ &c. rupibus, arboribus.

Odor in sicca planta nullus: humore irrigata, evadit urinoza, nauseosa. Torus superne fusco-cinereus: subtus extrema fol. & lacinie e fusco-albicant; reliqua parte nigricans. Fol. oblonga, in lacinias parum latas inordinate divisa. Peltæ ex fusco-rubræ.

81. *horizontalis*. L. coriaceus, repens, planus; (fronde rotunde lobata) subtus avenius: peltis marginalibus, horizontalibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 765. Mich. gen. tab. 44. f. 1. 6.*

Liche-

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 28. f. 104.*

In Italia, Helvetia &c.

Color subfuscus, subtus margine ochroleuco. Fol. varie divisa, & sinuata, tenuia, & minus rigida. Pelta grandiora, saturate rubra, oris albis, per ætatem convolvuntur, & fiunt tertia. Madidus dum est, pelta horizontalis undiq. marginata.

82. *perlatus*. L. coriaceus, repens, lobatus, glaber; subtus ater: scutellis pedunculat. integris. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 21. f. 12. Mich. gen. tab. 50. 51.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 20. f. 39.*

In Europa, ad arborum, & præcipue Quercuum truncos.

Supra glaucus, perlatus, subtus nigricans. Fol. exteriora obtusa, recta, latiora, interiora adscendentia, undato-plicata, apice farinifera. Scutellæ magnæ, scyphiform. breviter pedunculatæ, extrus fol. concolores, iatus fuscæ, glabræ.

83. *saccatus*. L. coriaceus, repens, rotunde-lobatus: peltis depressis, subtus saccatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 532. f. 3. Mich. gen. tab. 52. optima.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 30. f. 121.*

In Europa alpibus.

Dignoscitur quod pro peltis subtus saccum format. Facies Marchantia. Frons parum divisa, viridis; subrus albedo-rubella, & glabra. Scutellæ nigra.

84. *croceus*. L. coriaceus, repens, subrotunde lobatus, planus; subtus venosus, villosus, croceus: peltis sparsis, adnatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 263. Fl. lapp. tab. 11. f. 3.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 30. f. 124.*

In Helvetia, Lapponia &c.

Fol. 3-4 terræ incumbentia, subrotunda, sed basi angustiore, margine aut integro, aut subcrenato; inferne venis subfuscis reticulata, villosa. Scuta perampla, orbiculata, planissima, atro-spadicea.

85. *sarcoides*. L. coriaceus, gelatinosus, carneus: scutellis similibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 22.*

Habitat

Tom. VI.

P

Substantia gelatinosa, tremula, & mollis, instar *Tremelæ*, ex fusco-carneo col. sive rufo, raro ultra scutella protensa, arboribus adhærens, tenuissima, animalium quorundam membranam mentita; sed ultra scutella protenditur tunc admodum incrassatur, & modo animale substantiam crassiorem æmulator; modo adurgit in gyros n-efenteriform. Scutellæ sunt eiusdem substantiæ, & coloris, concavæ, & subrotundæ, aut sessiles, aut basi in pedunculum veluti elongantur.

F. *Umbilicati, squallentes quasi fuligine.*

86. *miniatus*. L. umbilicatus, gibbus, punctatus; subtus fulvus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 10. f. 3. Fl. Dan. tab. 532. f. 1. Hall. helv. tab. 2. f. 2. ed. 2. n. 1999. tab. 47. f. 2. Mich. gen. tab. 54. f. 1.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 30. f. 127.*

In Helvetiæ, Angliæ &c. rupibus alpinis.

Multiformis: natura coriacea. Color cinereus.

Folior. lacinia rotundatæ, concavæ, supra cinereo, & nigro punctatæ, subtus fusco fulvæ congregantur in cespitulum convexum, & nubis picturæ similem.

87. *velleus*. L. umbilicatus, subtus hirsutissimus; (fronde coriacea, interne pustulata: scutellis atris). *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 82. f. 5.*

In alpinis Lapponiæ, Angliæ &c.

Fol. latissima, a 3. unc. ad palmar. & dodrant. amplitudinem extensa, parum divisa, lobis obtusissimis, crassa, supra cinereo-fusca, globulis concoloribus, inferne atra.

88. *pustulatus*. L. umbilicatus; (fronde lobata, cinerea) subtus lacunosus, furfure nigro adpersus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 597. f. 2. Mich. gen. tab. 47.*

Lichenoides &c. *Vaill. parif. tab. 20. f. 9. Dill. musc. tab. 30. f. 131.*

In Europæ rupibus apicis.

Frons plana, lobis subrotundis, supra tota pustulata, bullis convexis, cinereis, & livescens; subtus pulla, & cinerea. *Humilus virefcit.*

89. *proboficidens*. L. umbilicatus; peltis turbinatis, truncatis, perforatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 2.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 20. f. 42.
In Svecia, Lappontia, Pennsylvania, Italia &c. sylvis abietinis.
 Frons magnitudine pollicis, orbiculata, inæqualiter, & obtuse lobata, centro radicata subius hinc inde fibram radicantem exferens, lævis: supra planiuscula, vel nonnihil contorta, cinerea, punctis fuscis elevatis exasperata. Peltæ per discum sparsæ, minimæ, atræ, margine lato, plano.
90. *deussus*. L. umbilicatus, undiq. lævis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 21. fig. a. b. ic. b.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 30. f. 117.
In Gallia, Svecia &c. rupibus, collibus elatis, apricis.
 Minimus, fuscus, durus, valde coriaceus; fronde rotunde lobata, lobis crenatis, superne cinereo-fusca; subtus nigerrima, glabrosa.
91. *polyphyllus*. L. umbilicatus, polyphyll. utrimq. lævis, crenatus, atrovirens. *Syst. veg. ed. 14.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 30. f. 129.
In Europa rupibus elatis, apricis.
 Durus, corneus. Color utrimq. satore ex cœruleo lividus. Rosulæ imbricatæ, sine crispo; furculis acutius bifidis.
92. *polyrhizos*. L. umbilicatus, polyphyllus, utrimq. lævis, polyrhizos. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 597. f. 1. Hall. enum. helv. tab. 2. f. 4. hist. tab. 47. f. 4.*
Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 30. f. 130.
In Arvonæ, Svecia &c. rupibus apricis, elatis.
Var. L. miniati. Frons imbricata, subrotunda, punctata, cinereo-glauca, subtus hirta. Scutellæ atræ.
93. *pullus*. L. umbilicatus, utrimq. lævis, plicato-crispus, lobatus, subtus papillofus; supra peltis convexo-depressis notatus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 3.*
Habitas
 Fol. coriaceum, tenue, lentum, umbilicatum, suborbiculatum, fuscescens, nudum, papillis protuberantibus, a centro ad peripheriam plica-

to-crispum, lobis non profundis, inæqualiter rotundatis, in senio laciniatis, nunquam vero crinitis, aut villosis, nec cirriformis, totum læve, glabrum, atrum, tuberculis peltiformibus, subrotundis, protuberantibus, sessilibus, convexo-depressis.

94. *mesenteriformis*. L. umbilicatus, utrimq. lævis, plicato-crispus, lobatus, subtus glaber, supra peltatus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 5.*

Habitat

Peltæ mox sessil. mox pedunculat.

Fol. coriaceum, duplo crassius, rigidiusq. L. *probofideo*, non solum versus periphæriam, sed in centro superne multipliciter crispato-lobatum, lobis exstantibus, utrimq. læve, & nudum, nullis papillis, foveolis, aut villis præditum; subtus albido-fuscescens, supra ex cinereo-nigricans, copiosis tuberculis peltiformibus, convexis, supra sulcis circularibus, concentricis exaratis, anthracinis instratum. Lobi periphæriæ, & disci irregulariter rotundati, cirrhis, aut crinibus nullis fimbriati.

95. *anthracinæus*. L. umbilicatus, undiq. lævis, plicato-crispus, lobatus: peltis omnino nullis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 4.*

Habitat

Differt a L. *pullo*, fol. coriaceo quidem, sed fericæ tenuitatis, & rigiditatis; utrimq. ater, undiq. glaber, & nudus, nullis tuberculis, sive peltis, aut papillis, minus crinitus, aut villis conspicuis. Lactucæ formam refert, subtus umbilico sessili, & nixo, cæterum liber, a centro versus periphæriam plicato-crispus, & lobatus, lobis rursus crispo-lobatis, lobulis ultimis rotundatis, & integerrimis.

96. *viridis*. L. umbilicat. subtus niger, supra viridis, punctis elevatis. *S. fl. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spec.

Color supra luteo-virescens.

G. *Scyphiferi*.

97. *cocciferus*. L. *scyphifer*, simplex, integerrimus: stipite cylindrico: tubercul. coccineis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 21. f. 4. Mich. gen. tab. 41. f. 3.*

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 7.*

In Europæ sylvis sterilibus, ericetis, rupibus.

Fol. sicuti tubuli, ex cinereo-incana, mixta tenui viriditate. Tubercula per ætatem fusca.

98. *cornucopioides*. L. scyphifer, simplex, fol. brevior: tuberculis coccineis. *Syst. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 9.*

Muscus &c. *Barr. rar. tab. 1268. f. 2.*

In Lapponiæ, Sveciæ &c. sylvis glaucis.

Crusta foliosa, virescens. Scyphi cum oris ornatis radiis, nunc planis, foliaceis, nunc in tubercula parva, fusco-coccinea delinentibus. *Sæpe prolifer est.*

99. *pyxidatus*. L. scyphifer, simpl. crenulatus; tuberculis fuscis. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 21. f. 11. Tourn. inst. tab. 325. fig. D. Mich. gen. tab. 41. f. 2. 4.*

Fungus &c. *Magn. horr. tab. 83.*

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 6. B. C. & fig. 8.*

- b. Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 13. tab. 7. f. 4.*

Lichen &c. *Mich. gen. tab. 41. f. 7. 9. Vaill. parif. tab. 21. f. 5. 9.*

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 6. D.*

In Europæ sylvis collinis, & montanis.

Crusta ramosa, supra cinereo-viridis, subtus nivea. Sursul. pyxide dentata.

- b. Infundibula plura, quæ coronam novæ prolis ex margine primi infundibuli efficiunt. *Multæ var. numerantur in Fl. Carn. Scop.*

100. *fimbriatus*. L. scyphifer, simplex, denticulatus: stipite cylindrico. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 21. f. 6. Mich. gen. tab. 41. f. 45.*

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 8. 9.*

In Europæ sylvis sterilibus, truncis, & corticibus arborum.

Gregatim passim in Ericetis nascitur. Sursuli subpollic. nudi substinent scyphum conicum, aut infundibuliform. denticulatum; sublacerum, extus pulverulentum, intus fuscescentem. Fol. humifusa, parva, varie dissecta, ex viridi-cahescentia.

101. *gracilis*. L. scyphifer, denticulatus, filiformis (infundibulis proliferis, & corniculatis). *Syst. veg. ed.*

14. *Mich. gen. tab. 41. f. 5.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 14. f. 13. C.

Musco-fungus &c. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 6.

In Europæ ericetis montis, & sylvis sterilibus.

Lichen 2-3-pollic. vulgerrim. fusco cinereus, simpl. vel ramosus. Surculi glabri. Scyphi parvi. Fol. ad basin plura, profunde lacinia-
ta, ex cinereo-virentia, subtus incana.

102. *digitatus*. L. scyphifer, ramissimus: ramis cylindricis: calycibus palmatis (ungulis coccineis). *Syst. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 15. f. 19.

In Europæ sylvis sterilibus.

Surcul. uncial-fesquiunc. crustaceus, ex cinereo-canescent; ramis in calyc. tubinatos, margine carnosos, desinentibus, coccineos. Fol. ad basin, & imis cauliculis oriuntur exigua, canescentia, tenuiter lacinia-
ta.

103. *cornutus*. L. scyphiter, simpliciusculus, subventricosus: calycibus integris. *Syst. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 15. f. 14. Scyphiform. cornutum, tab. 15. f. 16. E.

Muscus &c. Barr. rar. tab. 1277. f. 1. Bosc. mus. 2. tab. 107.

In Europæ ericetis, & sylvis sterilibus glareosis.

Surcul. conferti, adscendent. subnudi, tubuli-
formes, subclavati, acuminati, col. ex glauco-ciner. & subvirente. Cornua sæpe clavæ figuram referunt. Foliol. plurima, crispa.

104. *deformis*. L. scyphifer, simpliciusculus, subventricosus; calycibus dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Lapp. tab. 11. f. 3. Mich. gen. tab. 41. f. 1.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 15. f. 18. mala.

In Europæ ericetis, & sylvis montanis, sterilibus.

Surcul. erecti, subinde recurvi, simplic. vel sub-
ramosi, superne crassiores. Color nunc palli-
dior, nunc sordide incanus, viridi-cinereus, superfic. villosa, & pulverulenta: non raro stipites copiosi tol. crispis tecti sunt. Tubercula parva, ad rufum vergentia. Fol. parva, lacinia-
ta, ex cinereo-incana, basi, & inferiori caulium parti adnata.

105. *flammeus*. L. tubulosus, ramosus, retusus, croceus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. Medic. Svec. T. 10*

tab. 15. f. 3.

At cap. b. Spei.

Struſtura, magnitudine, & fig. proxime reſpon-
det *Lichnoidi* &c. *Dill. muſc. tab. 20. f. 19.*
ſed totus fulvus, ſeu croceus, omnino tubu-
loſus, nec ſubtus longitudinaliter ſiſus.

H. *Fruticulof.*

106. *rangiferi*-L. fruticulof. perforatus, ramiſſiſſimus; ramulis
nutantibus. *Syſt. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.*
180.

Coralloides &c. *Dill. muſc. tab. 16. f. 29.*

Muſco-fungus &c. *Morſ. hiſt. 3. f. 15. tab. 7.*
f. 9.

Muſcus corallinus &c. *Bauh. hiſt. 3. 1198.*

b. L. *Fl. Dan. 539*

Coralloides &c. *Dill. muſc. tab. 16. f. 30.*

In alpihus, & Europæ frigide ſylvis ſteriliſſimis.
Fruticul. ſempedal. mollis, totus alba farina
obductus, ex cinereo- & viſcenti-albicans.
Summis corniculis ſparſim tubercula naſcuntur
parva, rotunda, lucida, ruſcentia, per ſic-
citatem nigricantia.

b. *Solis corniculis diſſert, ut ſtos plenus a ſimpliſi.*

107. *uncialis*-L. fruticulof. perforatus; ramulis breviffim. acu-
tis. *Syſt. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. *Dill. muſc. tab. 16. f. 22.*

b. *Lichen* &c. *Mich. gen. tab. 40. f. 2.*

Coralloides &c. *Dill. muſc. tab. 16. f. 21.*

In Europæ ericetis.

Cespites denſi. Surculi uncial. ſubnudi, dichotomi, candicanti-flaveſcent. extremis ramis exiguis, ternis, quaternis, punctis ſubnigris terminatis. Fol. quædam quandoq. ad baln, tenuiter crenata, albicantis.

b. Surcul. palm. & ultra, nudi, aggregati, viriduli, fragiles; in planta ſicca albicantes. Ramuli terminales, ſtellarim expaſi.

108. *vermicu- laris*-L. fruticulofus, lævis, ſubramoſus, ramis diſſuſis, tubercul. ſparſis. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. jun. diſſ. muſc. p. 37.*

In alpihus Lapponicis inter gramina, & muſcos.
Lichen lacteus, ramis teretiſculis, ſiſtuloſis, magis, minulve ramoſis, ſubulatis: fructificationibus lateralibus, globulis. Simil. L. ſubu-

- lato, sed huius color, & situs diffusus, & tuberculi globosi ab illo discedunt.*
109. *subulatus.* L. fruticulos. subdichotomus, ramis simplicibus, subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 16. f. 26.*
 Muscus &c. *Tabern. ic. 809. Bauh. hist. 3. p. 767.*
In Europæ sylvis, ericetis.
 Surcul. 2-3-digit. parum ramosi, albide, glebis cinereis adpersi. Fol. ad basin, & per cauliculos parva, crenata, supra cinerea, subtus incana. Tubuli non palmati, cavi, clausi. Tubercula exigua, fusca.
110. *globiferus.* L. fruticulos. solidus, lævis: tuberculis terminalibus, globosis, cavis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 39. f. 6.*
 Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 17. f. 35.*
In Anglia &c.
Simil. L. paschali, sed aphyllus, lævior. Gloß ore parvo, intus nigri. Junior humilis est, surcul. sæpe ramosis, ex cinereo-glaucis: dein sesqui-2-unc. superne ramulosis, col. minus glaucescente, sed magis ad cinereum, & arenaceum tendente. In sicca ex fulvo-obsolete albicante; superficie semper glabra. Ramuli multi, teretes, acuti, furcati.
111. *paschalis.* L. fruticulos. solidus, tectus foliol. crustaceis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 151. Mich. gen. tab. 53. f. 5. 8. Scheuchz. alp. tab. 19. f. 4.*
 Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 17. f. 33.*
 Corallina &c. *Pet. musc. tab. 65. f. 7.*
 Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 12.*
 Muscus &c. *Lorf. pruss. tab. 48.*
In Italia, Helvetiæ, Lapponia, Pennsylvania &c. alpesribus locis.
 Basi latiuscula, lignosa, rupibus, *Fuci* instar adnascitur, crusta farinosa. Surculi 1-2-unc. ramis flexuosis; in iunioribus plantis crusta crispa toti obducti; inde rudi, præsertim subtus. Tubercula passim undiq. magna, carnosa, plana, fusca, vel cinerea; sicca nigra.
112. *tristis.* L. fruticulos. solidus; ramul. compressis, ramosis; apicibus nigricantibus: scutellis tem

minalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. meth. musc. p. 37.*

Veb. spic. tab. 4. optima Gunn. Fl. Norv. 2. tab. 2. f. 9. 14. Hall. enum. tab. 47. f. 1. Dill. musc. tab. 17. f. 37.

In rupibus altissimis.

L. minimus, cespitosus, furculis durissimis, nigris, nitidis, teretibus; cæterum dichotomus. Scutellæ cavæ, planæ, concolores, ut ad *L. pulmonarius* accedat.

113. *fragilis*. *L. fruticulos. solidus*; ramulis teretibus (filiformibus, nudis), obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 9. f. 6. c. Fl. Lapp. tab. 11. f. 4.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 17. f. 4.

In Europæ alpinis, alpinisque.

Gregarim nascitur fruticuli specie, 1-sesquiunc. Surculi eburneo-glauci, ramosi, glabri, apicibus obtusis, integri-2-fid Capitula non sunt tubercula carnosa, sed globuli duriores, solidi, materia fuliginosa, atra fæcti.

Si corniculata esset hæc species, a Corallina parva, ramosa. Phyt. Britan. viz distingui posset, adeo similis structura, substantia, & colore.

114. *verrucosus*. *L. fruticulos. solidus*; ramulis capitis, teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Cespites latitudine manus; ramul. pollic. erectis, filiformibus, cinereis, apice terminatis capitulo magnitudine sem. *Coriandri*, rotundo, obtusissimo; unde quasi torus verrucis solidis, confertis obsitus.

115. *Roccella*. *L. fruticulos. solidus*, aphyllus, subramosus: tubercul. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 17. fig. A. B. C. D.

Muscus &c. Pet. goz. tab. 7. f. 12. Pluk. alm. tab. 205. f. 6.

In insulis Archipelagi, Canariis, & ad rupes marinas.

Æ basi tophacea, & calcaria pl. surgunt furculi, 2-3-unc. recti, vel recurvi, in cornicula pauciora, plura, breviora, vel longiora divisi, col. cinereo, vel ex cinereo-fusco, nigrican-

re, substantia intus candida. Per horum longitudinem mox stigmata, mox tubercula cretacea adparent, plana, & veluti rescissa.

I. *Filamentosi*.

116. *plicatus*. L. filamentos., pendulus; ramis inplexis: scutellis radiatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Usnea &c. *Dill. musc. tab. 11. f. 1.*

In Europæ, & Amer. borealis sylvia densis, umbrosisq; fagetis.

Longissimus, rugosus, ex cinereo-fuscus, etiam per ætatem flavidus, crulla tenui, verrucosa, albida asper. Orbiculos nonnisi raros profert.

117. *barbatus*. L. filamentos. pendulus, subarticulatus; ramis patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Usnea &c. *Dill. musc. tab. 12. f. 6.*

In Europæ, & Amer. septentrion. sylvia, fagetis.

Filamenta longa, spirhamæa, albida, dichotoma, ramis extremis furcatis, alte pendentibus ex arboribus, comam satis amplam, & prolixam efficiunt. Orbiculos rare protert; sunt vero hi exigui, cernui, ramis absque limbo arcte adnati.

118. *radiciformis*. L. filamentos. teres, ramosissimus, glaber, radiciformis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. jun. diff. musc.*

Usnea radiciform. Scop. diff. p. 1. tab. 8.

In todinis Hercynia &c.

Substantia subterranea, aliena a Lichene; potius ad fungosam naturam accedit.

119. *divaricata*. L. filamentos. pendulus, angulatus, articulatus, intus tomentosus; ramis divaricatis; peltis orbiculatis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Usnea &c. *Dill. musc. tab. 12. f. 5. Mich. gen. tab. 39 f. 2.*

In Helvetiæ, Italiæ &c. cacuminibus arborum acifoliarum.

Surcul. dodrant-pedali. mollis, compressus, latiusculus, rugosus, pallens, aut ochroleucus, quandoq; articulatus. Rami compressi, & plani, quibus a cæteris speciebus differt, molles. Extrema fila ramosa, teretia, pendula. Peltæ planæ, glabræ, non radiatæ, non per latera, sed mediis ramis adnatæ; col. in sicca planta spadiceo, vel rufo anterieus, posterius albicante.

120. *Ufnea*. L. filamentof. pendulus, compressus, ramosus, lævis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 14. f. 31. & tab. 54 f. 10.*
In India orient. arboribus.
 Pedal. ramosus, inæqualis, axillis obtusangulis, in lamellas 2. separabilis: recens albus, ambrosiacus, & superficies glabra. Ultimæ filament. divisiones cornutam quandam divaricationem efformant.
121. *jubatus*. L. filamentof. pendulus: axillis compressis (filamentis nigris, prolaxis). *Syst. veg. ed. 14. Ufnea &c. Dill. musc. tab. 12. f. 7.*
Muscus arboreus &c. Dod. pempt. 471.
In Europa sylvis, & rupibus.
 Fusco-viridis, sed in atrum colorem degenerans. Filamenta glabra, non dura, at ubi viret, mollia potius, tenuia, non valde ramosa, sed valde complexa, & inorta, dodrant-pedalia, & longiora. Superiora fila, quæ crassiora sunt, compressa, cætera teretia. Tubercula lateralialia.
122. *lanatus*. L. filamentof. ramosissimus, decumbens, implicatus, opacus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. musc. 2. tab. 10. f. 5.*
Ufnea &c. Dill. musc. tab. 13. f. 8.
In Europæ frigida rupibus.
 Minimus, vix uncial. tenerrimus, flexuosus, ramis capillaribus, lævæ nigræ instar, saxis adhærens.
123. *pubescens*. L. filamentof. ramosissim. decumbens, implexus, nitidus (caulicul. nigris, capillaceis). *Syst. veg. ed. 14.*
Ufnea &c. Dill. musc. tab. 13. f. 9.
In Europæ septentr.
 Vix uncial. aterrimus, flexuosus, tenerrimus instar lævæ, seu filorum Bombycum.
124. *chalybeiformis*. L. filamentof. ramosus, decumbens, implicatoformis. flexuosus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 262.*
Ufnea &c. Dill. musc. tab. 13 f. 10.
In Europa, supra rupes, & sedimenta.
 Simil. L. iubato, sed brevior, 2. 3-unc. & minus pendulus. Surculi rigidi, undiq. sparsi, & varie inflexi, rariores, & laxiores. Color ex cinereo, & fusco-virens. Rami pulchre flavi.

125. *hirtus*. L. filamentos. ramosissimus, erectus: tuberculis, spatis, farinaceis. *Syst. veg. ed. 14.*
Usnea &c. Dill. musc. tab. 13. f. 12.
Musculus ramosus. Tabern. ic. 807.
In Europæ arboribus emortuis.
 Surcul. 1-2-unc. fibrosi, e cinereo-virescentes, arcte implexi, tactu rigidi, & elastici.
126. *vulpinus*. L. filamentos. ramosissim. erectus, fastigiatus, inæqualiter angulosus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 226. Jacq. misc. 2. tab. 13. f. 4.*
Usnea &c. Dill. musc. tab. 13. f. 16.
In Europæ tectis ligneis, muris, & sylvis montanis.
 Gregatim circa ramos arborum adnascitur, & præcipue *Quercuum*, fruticuli instar varie sparsus, & implexus, 1-fescunc. Surculi brevissimi. capillaceis extremitatibus terminati, col. nunc pallide, nunc sature flavo, substantia tenui, molli.
127. *articulatus*. L. filamentos. articulatus; ramulis tenuissimis, punctatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Usnea &c. Dill. musc. tab. 11. f. 4.
Musco-fungus &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 7. f. 11.
Dendrobryon &c. Col. ecphr. tab. 83. f. 2.
In Europæ australis sylvis.
 Longissim. cinereus, ped. semiped. barba.
128. *aurantiacus*. L. filamentosus, ramosus; aurantiacus, cum summitatibus atris: scutellis supra atris, subtus aurantiacis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 11. f. 2.*
Habitat.
 Valde paniculatus, constat ex pl. caulibus, ramosis. fescuncialius, teretibus, solidis, duris, firmis, qui una cum ramis suis crassioribus, dum in aqua humescunt, col. sunt ex rubro-aurantiaci; dum succescunt flavescunt. Ultimi ramuli breves, acuti, capillares, & numerosi, semper sunt atris, & lucidi. Intra hos egrediuntur scutellæ orbicul. integerr. planiusculæ, omni radio destitutæ, supra atræ, & lucidæ, subtus aurantiacæ, sessil. plurinæ.
129. *floridus*. L. filamentos. ramosus, erectus: scutellis radiatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Usnea &c. Dill. musc. tab. 13. f. 13.

Musco-fungus &c. *Morif. hist. 3. f. 13. tab. 7. f. 14.*

Muscus &c. *Tabern. ic. 808.*

In Europæ fagetis: vulgo ad arborum ramos emortuos.

Rami ratione plantæ magni, teretes, asperi. Pol. capillacea, parum ramosa, col. ex viridi-cinereo. In summis ramis scutellæ magnæ, undiq. ciliatæ, & radiatæ.

130, *sepenfis*. L. filamentos. ramosus, erectus, ciliatus, flavus: peltis radiatis, fulvis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Sp. i.

limitatus. L. crusta glauca, aut cinereo-virenti; linea marginali, repanda, nigra: tubercul. pl. nigris. *Scop. Fl. Carn.*

In Quercu, Abiete, Fago &c.

Junior planta minime marginata est; adultæ vero unico sæpe latere. Tubercula convexa, contigua, & confluentia.

rupestris. L. tubercul. sessilibus, nudis. *Scop. Fl. Carn.*

In rupibus calcariis.

Crusta vix conspicua, aut nulla. Tubercula dura, glabra, pulvinata. *Var crusta alba, tubercul. rufis; & altera crusta albida; tubercul. nigris.*

punctatus. L. crustaceus, subvirescens, margine sinuato, nigro; tubercul. glabris, sessilibus, convexis, atris. *Scop. Fl. Carn.*

In Fagis.

Differt a L. limitato, receptacul. scutellatis, & rarioribus. Crusta albo-virens, septa lineis repandis, atris, variegata, punctis nigris.

scaber. L. crustaceus, verrucosus, albus; orbiculis villosis, concoloribus. *Scop. Fl. Carn. Hall. helv. tab. 2086.*

In arborum corticibus.

Crusta alba, rugosa, granulata. Scutellæ iuniores sunt verrucæ, exiguæ, umbilicatæ; adultiores acquirunt margines leprosos, & crenulatos; disco manente concavo, & fulcescente.

marmoreus. L. crustaceus; scutellis sessilibus, subnudis, lapideis, concavis. *Scop. Fl. Carn.*

In rupibus calcariis, & in marmore rubro.

Crusta impalpabilis, Auroræ colore profert cotylas lapideas, rubellas.

alveolatus. L. crustaceus, splendens; scutellis immerfis, concavis, clausis. Scop. Fl. Carn.

In Fagis.

Crusta glabra, & albida elevat frequentes, parvosque tumores nigros, & nitidos, qui demum aperti favum mellis referunt.

osculentus. L. Pall. it. 1. tab. 1. 1. f. 4.

In Dauuria.

Corpuscula libera, oblonga, e crusta convoluta, coriacea, crassa, alba facta; extus rugosa, & tuberculosa, grysea, vel cinerea. Pelliculæ rariores, immeris, excavatæ, verucularum instar prominulæ.

ater. L. crustaceus, albicans; scutellis rugosis, nigris. Houd. Angl. 445. n. 19. Dill. musc. tab. 18. f. 15. & tab. 55. f. 8.

In arborum corticibus.

seruposus. L. crustaceus, cinereus, granosus; scutellis immerfis, atris, margine crenulato. Schreb. Lips. Dill. musc. tab. 18. f. 15. b.

In muris argillaceis.

mucuriformis. L. crustaceus, luteo-virens; tubercul. concoloribus, stipitatis, sphaericis. Scop. Fl. Carn.

In arborum corticibus.

Farina subphureo-virens. Setulæ tenues, capitulis sphaerico, concolore terminatis. Facile haberi potest pro Mucore furfuraceo, nisi repugnaret locus natalis; & capitula nunquam dehiscentia, sed polline tenuissimo adpersa.

viridulus. L. crusta pallide virente; surculis albis; tuberculis pulvinatis, aquose rubellis. Scop. Fl. Carn.

In faxis.

Crusta in orbem diffusa, granulosa, diametro etiam semiped. ambitu pallide virente; centro magis fructificante. Surculi sesquilineam longi, teretes, apice dilatati.

granosus. L. imbricatus; foliol. oblong. lobatis, incis, cinereis, lævibus; scutellis nigris, margine crenulato. Schreb. Lips. Mich. gen. tab. 91. f. 3. 5.

In tectis ligneis, putridis.

Orbiculus cinereus, continuus, rugosus, seg-

mentis in ambitu imbricatis, oblongis, varie flexuosis, divisis, sinuatis, crenatis. Scutellæ in disco pl. conferræ, sæpe granulis minoribus, punctans distinctæ, margine crenato, disco fusco-nigricante.

pulverulentus. L. imbricatus; foliol. lobatis, obtusis, crenatis, viri-ibus, polline confertis; scutellis nigris, margine crenatis. Schreb. Lyps. Dill. musc. tab. 4. f. 71.

In Salicibus, aliisque arboribus.

Col. aliisque attributis differt a L. granoso: lacinia latiores, obtusiores, profundius crenata. Recens eleganter, & laetè viridis, polline albo, præsertim in ambitu, confertus. Siccus primum cinereus, dein luridus, subtus incanus. Scutellæ in medio copiose congestæ, granulisque innumeris mixtæ; iuniores cancrorum calculis limiles, nigræ, sed farina cinerea obductæ, margine crasso, fol. concolore, æquali: adultiores sæpe angularæ, aut compressæ, nigræ, margine tenuiore, crenato, crispo.

pullus. Schreb. L. imbricatus; foliol. lobatis, olivaceis: scutellis integerrim. Schreb. Lyps. All. Fl. Ped. Dill. musc. tab. 24. f. 77. A. B. C. Mich. gen. O. XIX. tab. 31.

In lapidibus, & arboribus antiquis, montanis.

Simil. priori, sed differt superficie in recenti lutescente; frondibus latioribus, obtusissim. tenuioribus: glabritie totius plantæ: Steca in fuscum col. degenerat.

acetabulosum. L. imbricatus; foliol. margine obtusis: scutellis fol. concoloribus, subtus rugosis. Neck. giallo-Belg.-Dill. tab. 24. f. 79. optima.

In arboribus.

Diversus a L. olivaceo. Fol. complicata, imbricato-plicata, apice latiora, lacinulis inæqualibus. Superficies pallide olivaceæ, nec nitida.

pulcher. L. gelatinosus, exasperatus, viridis, undiq. concolor. Hall. helv. n. 2006. Dill. musc. tab. 19. f. 22.

In nemoribus, & rupibus.

Frondes imbricatæ, carnosæ, crassæ, gelatinosæ, sublinuata, e viridi-cæruleo, subpellucidæ. Scutellæ numerosæ, magnæ, carnosæ.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichen &c. *Hall. helv. n. 2018.**In rupibus.*

Frondes calcareæ, crassæ, duræ, albidæ. Scutellæ atræ, frondi immerse. Scyphi 4 lin. longi, fragiles, pedunculati, ex ipsa frondis substantia inter scutellas prodeunt.

Lichen &c. *Hall. helv. n. 2031. tab. 47. f. 3.*
Dill. musc. tab. 30. f. 134.

In rupibus.

Follicla exigua, imbricata, fusca, humore madido, virentia. Scutellæ mutæ, immerse.

hispidus. L. fronde semipinnat. canaliculata, cinerea. *Hall. helv. n. 2039. Dill. musc. tab. 10. f. 46.*

In arborum corticibus.

b. Lichen &c. *Hall. 1984. Dill. musc. tab. 29. f. 114. Mich. gen. tab. 49. optima.*

Ad rupium radicem.

Differt a priore, frondium lobis obtusissim. rotundatis, sinuat. l. crenulatis, supra glauis, subtus luteo-scentibus: densius violosis: scutellis carneis, submarginatis; in frondis disco, non margine sessilibus.

scopulorum. L. foliaceus, rectus, compressus, linearis, laciniatus, nitidus; lateribus verrucosis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

Lichenoides &c. *Dill. musc. tab. 20. f. 60.*

In rupibus Scaniae.

L. firmitate quoad structuram similis. Frondes cespitosæ, sesquipollic. albo-viridulæ. Laciniae steriles acutæ; fructificantes obtusæ.

pinastri. L. foliol. semiuncial. flavis, superne punctis nigris, paucis notatis; subtus leucotis, margine lobato; & a verrucis fructificantibus tumefacto. *Scop. Fl. Carn. Dill. musc. tab. 21. f. 57. huic proxima.*

In cortice Pini sylv. prope radicem.

Fol. exiguum faciunt cespitulum, modo suberecta, mox declinata.

amplissimus. L. foliaceus, repens, lobatus, supra cinereus, subtus roseus, tomentosus: scutellis rubris. *Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 46.*

In Fagis, & Abietibus.

Planta arborea, cinerea, ex siccitate albida; subtus pallide fusca. Folium latum, laciniatum, lobis crenatis; dioicum. *Mas. scutellis copio-*

copiosis, fulvis: *sem.* cespitulis nigro polline adpersis.

pulverulentus. L. foliaceus, repens, lanuginosus; papillis ramosis, cinereis obitus. *Scop. Fl. Carn.*

In fagis, & Abietibus.

Dilleno, aliisque ignotus, nisi sit sexus alterius Lichenis.

Fusco-cinereus; subtus ater. Ambitus folior. rotundatus. Divisio frequens in segmenta rotundata, parva, sinuata, radicata. Margo segmentor. extimorum pallidior. D. scus undiq. emittit verrucas testas polline cinereo.

fragilis. *Scopol.* L. foliaceus, repens, tartaricus, crispus, supra cinereo-virescens; subtus albus: scutellis rufescentibus. *Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 51. f. 12.*

In rupium fissuris.

Nil aliud est, quam mera terra, unde plurima prodeunt receptacula convexa, glabra, & rufa: Quindq. est fol. late sparsum, sine scutellis: aliquando cespitem facit ex meris globulis albis; inter quas massulae nigræ iacent, verrucis similes.

spongiosus. L. foliaceus, repens, spongiosus, supra cinereus, verrucosus: scutis exiguis, confertis, rubris. *Scop. Fl. Carn.*

In terra.

Cespes elevatus in colles; depressus in valles, palmar. & ultra, substantia cellulosa, cucurbita super induta est tenuissima, cinerea, ambitu lobata, unde prodeunt scuta convexa, glabra, colore *Santali rubri*.

senellus. L. foliaceus, laciniatus, albus, laciniis suberectis, obtusis, pilosis: scutellis sessilibus. *Scop. Fl. Carn. All. Fl. Ped. Vaill. paris. tab. 20. f. 5. Dill. musc. tab. 20. f. 46.*

In faxis, & arboribus montanis.

Exigua foliola laciniata, albida, apice dilatata, crenata, tumida, reflexa, pulverulenta, dorso punctul. nigris notata.

sedifolius. L. foliaceus, gelatinosus; foliol. imbricatis, teretibus; spongiosus: scutellis atris. *Scop. Fl. Carn.*

In rupibus.

Squamæ congestæ, crassæ, spongiosæ, supra vi-

rescent. subtus albidæ: scutellis lateraliter plenis.

cristatus Scopoli. L. foliac. gelatinosus, membranaceus, lobatus: scutellis concavis, cristatis, rubris. *Scop. Fl. Carn.-Dill. musc. tab. 19. f. 20.*

In faxis.

Tenuis, nigricans. Laciniz latæ, lobatæ.

granosus. L. foliaceus, gelatinosus, lobatus; lobis imbricatis, granulatis. *Scop. Fl. Carn. Dill. musc. tab. 19. f. 24.*

In faxis circa hortos.

Segimenta crassa, corporibus subrotundis granulata. Dum humida fusca est planta, & lucide virens: sicca nigrescit.

crispus Scopoli. L. foliaceus, gelatinosus, folior. segmentis capillaceis, ramosis, teretibus. *Scop. Fl. Carn.-Dill. musc. tab. 19. f. 31. C. Mich. gen. tab. 38.*

Inter muscos.

Tota planta confertis, & tenuissimis veluti crinibus hispida, ac fimbriata. Ultimi fines segmentorum educunt tenuissima filamenta.

foliaceus. L. fol. adscendentibus, multifido-laciniatis, subtus niveis, scyphiferis; scyphulis brevissimis, conicis. *Hondf. Angl. Dill. musc. tab. 14. f. 14. A.*

In sterilibus.

cauleatus. L. foliaceus, diffusus, compressus, ramosissimus, ramulis furcatis, spinulosis. *Schreb. Lipf.-Dill. musc. tab. 17. f. 31.*

Habitas.

Color fuscus. Surculi compressi, e ramulis, & ad margines spinulas tenuissimas innocuas proferentes.

hispidus Scopoli. L. foliaceus, laciniatus, albus, laciniis adscendentibus, obtusis, pilosis: scutellis sessilibus. *Scop. Fl. Carn.-Dill. musc. tab. 20. f. 46.*

In truncis varlarum arborum.

L. ciliato longe minor. Siccus pariter, ac humidus albus est. Scutella margine vix crenata.

cucullatus. L. foliaceus, erectus, laciniatus, albus: scutellis posticis cucullatis, fuscis. *Smith, in epist.*

Habitas.

Simil. L. nivali.

polydactylon. L. fronde oblonga, subtus venoso-villosa, marginibus subrevolutis, ascendens. Neck. meth. musc. Dill. musc. tab. 28. f. 107.

In sylvaticis montes.

Frons reptans, in lobos apice dilatatos divisa. Superficies in recenti atro-virens; in sicca cinerascens. Peltæ supra atro-rubicundæ, subtus carneæ.

orbicularis. L. fronde germinante, deformi, scutellifera, subrotunda; primordialibus farinosis. Neck. meth. musc. Dill. musc. tab. 24. f. 71. 72. var.

In corticibus arborum antiquarum.

Dum viget, e superiore pagina, & ex apice plantæ adultæ evolvit pullos visibiles, conglomeratim congestos, plicatos. Fol. in orbem posita. Superficies fusco-virens in recenti; cinerea in sicca. Scutellæ sessil. subatræ.

pufescens. L. fronde lobata, obrusa, avenia, margine sinuata, subtus villosa; peltis subrotundis. Neck. musc. Hall. n. 1990.

In sylvia.

Adfinis L. *aphosa*. Frondes juniores supra verrucosæ. Peltæ postica parte verrucis viridibus.

serotinalatus. L. fronde obtusa, lobata, subtus scabra, maculis rotundis varia. Scop. Fl. Carn. Hall. n. 1989. Dill. musc. tab. 29. f. 114.

In terra.

Corium sulphureum, laciniatum fissuras acquirit, & dilatat, unde pollen cinereus efflorescit.

elongatus. L. Jacq. misc. 3. tab. 2. f. 1.

Habitas.

Ad *Scyphiferos* pertinet. Similis L. *gracill.* Cylindricus, teres, fistulosus, mollis, cinereus, basi fusca, & tabescente, 4. unc. altus, suberectus, simplex, aut superne furcatus. Summitates modo subulatæ, acutæ, & steriles; modo trunco crassitie similes, apice scyphiformes. Denticuli fusco-capitati.

radiatus. L. scyphifer, subramosus, cylindricus, elongatus; scyphis inæqualibus, dentatis, radiatisque. Schreb. Lips.

In nemoribus.

Surcul. prælongus, plerumq. latere ramum simplicem, subulatum emittens, desinens in scy-

- phulum minus amplum, margine tenuiter denticulato. Tubercula rufo-fulca.
- exiguus*. L. scyphifer, simplex, stipite filiformi, lævis. Neck. gulla-Beig.-Dill. musc. tab. 14. f. 10.
Ad arborum stipites.
- Fol. decumbentia, varie multifido-laciniata, supra viridula, subtus albida. Surcul. vix pollic. cinerei.
- castaneus*. L. fruticosus, durus, castaneus: surculis castaneis. Hall. n. 1965.-Dill. musc. tab. 17. f. 31.
In ericetis montosis.
- Surcul. erectus, 2-pollic. ramosiss. compresso-lacunosus, spadiceus, nitidus. Rami copiosissimi. Scutellæ terminales, radiatæ, marginatæ, rufæ. Surculor. basis sæpe sanguineo-maculata; hinc L. islandico affinis.
- quisquiliaris*. L. fronde scabra, cinerea; ramis brevibus, acutis: scutellis nigerrimis. Hall. n. 2026. Mich. gen. tab. 53. f. 8.
In rupium cavernulis.
- Tenerissimi fruticuli, erecti, ramosiss. albidii; ramis acutis, fortiter albidis tectis. Tubercula terminalia, conferta, ovata, atro-fulca.
- furcatus*. L. fruticosus, tubulosus, ramosus, ramis erectis, furcatis. Houdt. Angl. Dul. musc. tab. 16. f. 27.
In sterilibus sabulosis.
- capillaris*. L. filamentis setaceis, pendulis; ramis circinnatis; scutellis ovatis. Burm. Ind. Rumph. amb. 6. tab. 40. f. 2.
In India.
- byssinus*. L. pulviculo super saxa, aut ligna adperso; tubercul. & scutellis evidentibus destituto. Scop. Fl. Carn.
- In arborum corticibus, super putridos offertes, & lapides.
- Plantarum simplicissima, quasi media inter lapides, & plantas.
- L. crusta tenaci, verrucosa; fungis fuscis. Hall. helv. n. 2043. Dill. musc. tab. 14. f. 2.
In rupibus sabulosis.
- Simil. L. Ericetorum; glebulæ tamen maiores; fungi minus rotundi, difformes, fusci.
- Elveloides*. L. crusta tartarea, verrucosa, cinerea; scutellis

carneis, planissimis. *Hall. helv. n. 2044. Web. Spicil. Atl. Fl. Ped.*

Corticibus arborum demortuarum innascitur, locis montanis, & subalpinis.

L. crusta olivacea, verrucosa: scutellis rubris, ferratis. *Hall. helv. n. 2045.*

In arborum radicibus.

Crusta ovata, etiam ramulis exiguis. Scutellæ grandes, etiam sanguineæ, oris ferratis.

L. crusta farinacea, verrucosa, glauca: scutellis planissimis, flavis, ora alba. *Hall. helv. n. 2046.*

In valibus ad terram.

L. crusta farinosa: scutellis planissimis, fordide rufis. *Hall. helv. n. 2047. Mich. p. 96. n. 2.*

Ad arbores, & lapides sabulosos.

Crusta valde tenera, mere farinosa. Scutellæ exigue, margine albo, fordide rufæ, dein nigæ, adeo confertæ, ut totam crustam tegannt. *Var. tota lutea.*

arvensis.

L. crustaceus, tartareus, glaucus: scutis difformibus, planis, ruberrimis. *Hall. helv. n. 2050. Web. spicil. Atl. Fl. Ped.*

In alpium rupibus, & saxis.

Crusta calcaria, verrucosa, tenera, cinerea.

L. crustaceus, ater: scutis inferne excavatis. *Hall. helv. n. 2052.*

In Helvetia.

Crusta est *Agarii* simil. nigra, late effusa, tubercul. obtusis, & planiuscul. inæqualibus. Subtus adparet superficies equina, plena rotundis foveis.

L. crusta verrucosa, areis polygoniis, punctiferis. *Hall. helv. n. 2053. Mich. gen. tab. 52. Dill. musc. tab. 18. f. 9.*

Ad saxa, & arbores.

Totus verrucosus, rimosus, & concolor, cinereus, vel fuscus.

L. crusta verrucosa, tenaci, fusca; scutis spadicis, nitidis. *Hall. helv. 2054.*

In muris, & saxis.

Simil. priori. Glebulæ multo maiores partem cespitis faciunt, absque scutellis, etiam solæ, quæ magnæ, rotundæ, col. *Cusce.* Scuta de-

num nigra, ora non tumente, albicante. Rimæ prioris, & areas non habet.

Differt a sequenti, scutellis planissimis; glebisq. maioribus.

L. crusta tenui, farinosa, rimosa, punctata: scutell. atris. *Hall. helv. n. 2055. scutellis solitariis. Mich. gen. tab. 54. f. 3. 7. 8.*

Scutellis, & crusta coniunctis. Mich. gen. tab. 54. f. 7.

In Helvetia.

Simil. n. 2053. natura rimosa, glebulisq. punctatis; etiam scutellis nigris: sed differt, quod absque verrucosa crusta sit mere farinaceus, tenuis, lapidi arcte adhærens.

L. crusta glauca, verrucosa, tenace. *Hall. helv. n. 2056. Dill. musc. tab. 18. f. 15.*

In parietinis ad calcem.

Crusta alba, & glauca, inæqualis, coriacea. Scutellæ magnæ, nigræ, ora alba.

L. sessilis: scutellis sordide virentibus, oris albis. *Hall. helv. n. 2057.*

In Helvetia.

Adfinis priori.

L. saxatilis, crusta verrucosa, flava: scutellis concoloribus. *Hall. helv. n. 2058.*

In duro marmore.

Crustæ latæ saxum tegunt, etiam ad pedis diametrum. Verrucæ non densæ, neq. continuæ.

L. crusta tartarea, albissima: scutellis nigris, marginatis. *Hall. helv. n. 2060.*

In duro lapide.

Crusta farinacea, tenera; verrucis minimis.

L. crusta tartarea, albissima: scutellis nigris. *Hall. helv. n. 2061.*

In lateribus, saxisque.

Crusta farinacea, tenera. Scutellæ perfecte orbiculares, absq. ora alba, paulum convexæ.

L. crusta inseparabili, farinosa, cinerea, villosa: scutellis atris. *Hall. helv. n. 2064.*

In fixis areosis.

Simil. L. geographica.

L. crusta verrucosa, cinerea: scutellis planis, nigerrimis. *Hall. helv. n. 2066.*

In arborum corticibus.

L. crusta tenerrima: scutellis hemisphæricis, viridibus. *Hall. helv. n. 2067.*

In Helvetia.

Crusta farinosa, cinerea.

L. crusta folliculosa, nigricante. *Hall. helv. n. 2068.*

In cortice.

Differt a prioribus. Asperam pellem *Afini Chagrini* refert, subviridi-nigram, totam plenam tuberculis conicis, depressis, subrugosis, concoloribus. Flavus brevissimus villus etiam intercedit.

L. crusta farinosa, tenuissima, albida: scutellis nigris. *Hall. helv. n. 2069.*

In arborum corticibus.

cinereo-fuscus. *L. crusta tenuissime cinerea*; scutellis fuscis. *Hall. helv. n. 2070. Web. spicil. Atl. Fl. Ped. Dill. musc. tab. 18. f. 4.*

In arborum corticibus.

L. crusta tenuissima: scutellis hemisphæricis, albo polline efflorescentibus. *Hall. helv. n. 2071.*

In arborum corticibus.

L. crusta tenerrima, farinosa, alba, punctis atris notata. *Hall. helv. n. 2072.*

In arborum cortice.

Crusta tenuissima. Scutellæ punctis non maiores, nigerrimæ.

L. crusta miniata, tenuissima, inseparabili: scutellis marginatis, flavis. *Hall. helv. n. 2074.*

Scutellæ grandes, planæ, aut concavæ, oris revolutis; in iuniori planta albis, in adulta concoloribus.

L. crusta nigerrima, verrucosa, papillis maximis, flavis. *Hall. helv. n. 2075.*

In saxo arenoso.

L. scutis in saxum immersis, nigris. *Hall. helv. n. 2076.*

In durissimo lapide.

Macula alba, etiam rubella.

L. scutellis flavis, lapidi immersis. *Hall. helv. n. 2078.*

In saxo duris.

L. stigmaticus: scutellis atris. *Hall. helv. n. 2080.*

In cortice etiam arborum.

Simil. L. scripto. In cortice scrobes frequentes excavantur, ut in facie variolosa, aut in cute stigmatibus notata.

L. minimus, atro-cinereus, villosus. *Hall. helv. n. 2082.*

In ligno crusta nigerrima adparet, & quasi verrucosa.

L. nigerimus, asper. *Hall. helv. n. 2083. An Dill. musc. tab. 18. f. 2?*

De cortice coni acuti, asperi undiq. ascendunt, dense stipati, ad lineam longi, non vero villi.

L. archipelagus. *Hall. helv. n. 2085.*

In lapide de cotis genere sunt intulæ nigrae, mole, & fig. variæ.

L. verrucosus, cinereus; orbiculis villosis, flavescens. *Hall. helv. n. 2087.*

In ligno putrido.

L. crustaceus, rimosus, verrucosus, cinereus. *Hall. helv. n. 2091.*

In arborum cortice.

Asper, inæqualis, ex glebis subfoliaceis factus.

L. farinaceus, mollis, villis efflorescens, albicans. *Hall. helv. n. 2092.*

Latas per terram crustas facit, friabilis, ex glebulis exquisite farinosis, inorganicis.

L. farinosus, alboreus, candicans. *Hall. helv. n. 2095.*

L. crusta viridissima. *Hall. helv. n. 2097. Dill. musc. tab. I f. 8.*

Crusta continua, granulosa, potius quam foliosa.

L. crusta cinnabarina. *Hall. helv. n. 2098.*

In Quercuum, & Fagorum cortice.

L. omnium subtilissimus, late sparsus, læte purpureus. *Hall. helv. n. 2100.*

Penitus inseparabilis. In fungis putrescentibus crustam efficiens elegantissimam, col. vivide roseo in Kermesinum tendente.

L. corniculo simplici; duro, subaspero. *Hall. helv. n. 2105.*

In subalpinis.

Durus, asper, olivaceus, cornicul. simplicibus, non adeo in scyphos, sed in ramosa potius cornua degenerantibus.

L. corniculo simplici, verrucis obsito. Hall. helv. n. 2096.

In sylvis.

Adfirmo L. cornuto. Corniculatus, & cylindricus, sed totus verrucis duris, fuscis, simplicibus, & ramosis tectus.

L. corniculis acute bifidis; pyxidibus imperfectis, & dimidiatis. Hall. helv. n. 1909.

L. corniculo subramoso; fungifero. Hall. helv. n. 1910. Var. L. 19 tab. 15. A. B. Dill.

Exiguus, ad L. cornutum 1093. Hall. pertinet, absq. scyphis, sed corniculo breviter a fido, aut in paucos ramos fisso, cuius apex ruberrimo, fungoso tumore incrassatur, etiam racemo, perpulchro fungorum coccineorum.

L. corniculatus, spadiceus, scyphis cylindricis. Hall. helv. n. 1911.

Crusta spadicea: pyxides spadiceæ, tamen polline adpersæ, sæpe subcavæ, & pene cylindricæ, profunde dentatæ. Dantur etiam proliфера.

L. scyphifer, infundibulo verrucoso. Hall. helv. n. 1913. Ad var. L. 9. Dill. pertinet.

Ex maioribus est, scyphis semunc. latis, intus verrucis albicantibus obsitus, quæ ita per ætatem crescunt, ut intus, & extus Lichenem obducant. Crusta foliosa durior.

L. scyphifer, verrucis racemosis. Hall. helv. n. 1914. Ad var. Lichenis 9. Dill. pertinet.

Ex minoribus exemplis pyxidati nascitur.

Circa suprema acetabula nascuntur agmina verrucarum duriuscularum subrubella, ut Brassicæ caulifloræ aliqua imago inde coacervetur.

L. pyxidatus, amplissimus, infundibulo inciso, crenato. Hall. helv. n. 1917. Bocc. museo di piante p. 21.

Pyxis omnium maxima, pene sescuncial. ad unc. lata, segmentis informibus, variæ, & oblique dentatis, ultimis spinulis exiguis, simplicibus, aut bifidis.

L. pyxidatus, maximus, profundè incisus, dentibus dentatis, punctatis. Hall. helv. n. 1920.

Elegans. Infundibuli collum longum, & perangustum: acetabulum amplum, planiusculum, foliosum, proliferum, similes edens pyxides,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

pariter angusto collo, lato acetabulo, pariter folioso, & secundo prolifero, secundis acetabulis gracilibus, & perexiguis.

L. Scyphifer, infundibulis spinosis. *Hall. helv. n. 1921.*

Priori adfinis, *subalpinus*. Acetabula latissima, repanda, & serrata, etiam lacera. Ex horum cavea undiq. spicula acuta, in coronæ speciem disposita, apice puncto ruberrimo notata, initio quasi proliferi coccinei. Totus habitus præterea verrucis obducitur.

L. cylindricus, fungo fusco terminatus. *Hall. helv. n. 1922.*

Accedit femorali *Dillen*, tubo cylindrico, absque acetabulo, terminato uno, pluribusve majusculis fungis fusci coloris.

L. asper, infundibulis gracilibus: corniculis foliosis, & verrucosis, fungiferis. *Hall. helv. n. 1930.*

In montanis.

Videtur nasci ex corniculato, viridi duriore, cuius color, & durities; cæterum 2-unc. iam coralloïdum similior, cylindricus, acetabulis angustis, difformibus, foliosis, verrucosis; fungis coronatis, proliferis, variis modis.

L. infundibulis tubiformibus, prolifer. *Hall. helv. n. 1931.*

In rupibus.

Tubi graciles, longi, ac fere cylindrici; infundibula angusta, ut rubas fere referant, earum ora tota fungis fuscis coronata; simplic. vel proliferi, aut ramoli, non verrucosi.

L. infundibulis foliatis, punctatis. *Hall. helv. n. 1932. Mich. gen. tab. 42. f. 3.*

In Helvetia, Hetruria.

Foliacea natura cum acetabulis confunditur; nam crusta ipsa passim periculum habet, & erigitur. Deinde vero infundibula simplicia, & prolifera, in latus, foliosas lacinas expanduntur, ut ad pulmonarios Lichenes hi pyxidati accedunt. Intermiscuntur parvi in ferris infundibulorum fungi, absque verrucis.

L. triplicato-prolifer; acetabulis angustis, foliosis. *Hall. helv. n. 1933.*

Inter plantas fœcæ Schuchz.

Est ex amplissimis; pyxidibus tamen gracilibus, petiolo filiformi; acetabulis triplicato-proliferis, ultimis acerabulis tubarum similibus, inferioribus etiam foliosis.

L. infundibul. explanatis, fungiferis. *Hall. helv.* n. 1934. *Dill. musc. tab. 14. f. 12. Vuill. tab. 21. f. 3.*

In Helvetiæ &c. rupibus.

Expansio foliacea, vulgaris pyxidati, potius amplior, eleganter rotunde semipinnata, fusciscens, nitida. Acetabula prolifera, serrata, coronata: vel innumerae scutellæ de ora ramorum efflorescunt, & de medio. Vetus folia difformia, nigricantia, contracta, semicava, palmata, exasperata, per ambitum lata, dentata, fungulis coronata, ut fol. ab acetabulis non distinguas.

L. fronde undiq. ex medio scyphifera, semipinnata, rotunde lobata. *Hall. helv.* n. 1935. *Hæc est var. 1a. A. Dill. tab. 14. Mich. tab. 42. f. 1. 2.*

In subalpinis.

Fol. fere *Endivia*, virentia, inde col. *Coffæ*, eleganter per oras lobata, & rotunde circumferrata, firma, & dura. Inferior superficies undiq. albissima; qua nota ab adfinibus recedit. Scutellæ numerosæ, alte pedunculatæ, subrubellæ.

L. pyxidatus, prolifer, multiformis; acetabulis foliosis, cylindricis, & spinulosus. *Hall. helv.* n. 1936.

In Helvetiæ.

Torus obscure ex umbrino-cinereus. Frondes ut in vulgari, sed acerabula mire deformata. Trunci lati, difformes, foraminibus pertusi, & reticulati. Rami ramosi, in deformia acetabula exeunt.

L. infundibulis proliferis, palmatis, serratis, & punctatis. *Hall. helv.* n. 1937. *Dill. musc. tab. 15. f. 17.*

In Helvetiæ.

Crusta vulgati. Tubuli difformes, lati, verrucosi, lacunosi, complanati, sine vario. Alii rames &

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

ducunt breves, simplices: alii acetabula angusta, punctis subnigris coronata. Eadem prolixa sunt etiam varie, & difformiter, & ultima acetabula habent palmata, ramosa, ramulis sæpe minimis punctis nigris terminata. Pæssim etiam furcul. foliosi sunt.

- L. corniculatus*, bi-tricornis, coccineo puncto terminali. *Hall. helv. n. 1940. An Mich. gen. tab. 10. n. 2. f. 1?*

In Helvetia &c.

Crusta pyxidati vulgar: cornicula brevissima, ramosa.

- L. verrucosus*, bi tricornis; fungul. fuscis terminalibus. *Hall. helv. n. 1941. Dill. musc. tab. 15. f. 20. vel 19. Mich. gen. tab. 42. ad. 10. f. 2.*

In silvis.

Tota crusta foliacea, obsita verrucis; sic infundibula, quorum aliqua simplicia, pleraq. prolifera, & ramosa sunt, ramis 2-3. quos omnes fusca tubercula fungosa terminant.

- L. verrucosus*, minimus, infundibul. 2-3-fidis; fungis fuscis, terminalibus. *Hall. helv. n. 1941.*

In Helvetia.

Omnium minimus. Crusta pyxidati vulgati, verrucosa. Capita in tubulis bruncialibus, 2-3-fidis, etiam palmatis, vix infundibuli naturam retinentibus, fungotis. Acetabula integra, & obscure divisa.

- L. asper*, infundibulis gracilibus: corniculis ramosis. *Hall. helv. n. 1943. Scheuchz. 1. tab. 5. f. 8. Mich. gen. tab. 41. f. 1.*

In Helvetia &c.

Ex corniculato duriori virecente nascitur, eiusque naturam conservat.

- L. caulibus lcyphiferis*, & cornicularis: corniculis ramosis. *Hall. helv. n. 1944. Panceov. ic. 16.*

In Helvetia.

Per Dillen, varietas corniculari. Crusta foliacea ut in vulgari, cornua similia, & admixta acetabula: sed alia, & plurima cornua in duos, plureve ramos breves finduntur.

- L. cornicul. erectis*, ramosis; infundibulis gra-

cilibus. *Hall. helv. n. 1945. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 7. f. 1. Vail. parif. tab. 26. f. 7. abſque ſcyphis. Mich. gen. tab. 41. f. 3. & leproſos ibidem f. 4.*

In ſubalpinis.

Durior priore, maior, cornubus 2-uncial. Pleurig. trunci mera cornua producunt, ramis paucis. Aliqui tamen acetabula habent ſimplicia, aut fungis nigris undiq. obſita.

L. cornutus, ſcyphis cornigeris, & fungoſis. Hall. helv. n. 1947.

In Helvetia.

Fol. parva, imo ſurculo adſperſa, ſcutellas frequentes, terminatrices, ſerratas, & laciniatas, etiam cornua edentes, & pyxides ſerratas, deniq. folioſas, & coronatas fungis fuſcis.

L. ſpadiceus; caulibus folioſis, ſcyphigeris, & corniculatis. Hall. helv. n. 1948.

In herbario Schæuchz.

Ex alpino ſpadiceo naſcitur ſurcul. folioſis, fol. adpreſſis; ramis partim in cornicula abeuntibus, partim in graciles, ſerrataſq. pyxides.

L. pyxidatus, ſerratus; cornubus ramoſis, ſubpyxidatis. Hall. helv. n. 1949.

In montibus.

Ex eodem alpino, aſpero natus, gracili infundibulo undiq. coronato, dentibus punctatis, capitatis. Alii rami in brevibus infundibula abeunt; longi alii in ramoſa cornua, & nova imperfecta infundibula.

L. pyxidatus, & corniculatus, ſpadiceus, tuberculofus. Hall. helv. n. 1950.

In Helvetia.

Pertinet ad noſtrum ſpadiceum maximum. Hall.

Multiform. in eodem cespite, totus tamen ſpadiceus, durus, cortice ruſo, tuberculofus, diſformis. Cornua alia ſimplicia acuta; alia in cylindrum abeunt parum dilatatum, quod acetabuli principium eſt. Alii in acetabulum conicum, gracile, oris dentatis, dentibus nigricantibus; alii ramoſi, & cornuti, ſubſeſſibus brevibus, ſpinuloſis.

L. prolifer, & corniculatus, cornicul. breviffime digitatis, fungiferis. Hall. helv. n. 1951.

Murif. hif. 3. f. 15. tab. 7. f. 6. Mick. gen. tab. 41. n. 7. f. 5.

In subalpinis.

Cruſta vulgar. pyxidati. Infundibula informia, dentata, denticulis rubro-fufco colore, rotundo fungulo terminatis. Alii rami ramoſi, coralloidei exeunt, quarum finis in furculos breviffimos terminat. Albus eſt, polline niveo confperſus, etiam folioſus, & verrucoſus.

L. fruticoſus, vage ramoſus, fuſcoſus; exremis ramis palmatis, fungiferis. *Hall. helv. n. 1952. Mick. gen. tab. 40. f. 4. 5. 6. Dill. ſylv. tab. 16. f. 25. 27.*

In Helvetia.

Ex maximis eſt. Cruſta foliacea, pyxidati vulgar: aliqua foliola toti furculi longitudini adhærent; vel eorum loco ſpinulæ nonnullæ. Fruticulus ad lineam latus, cavus, durus, aſper, fragilis, multo fuſco col. tinctus. Ramulis inſident funguli tubearnei, & aurantii, per ætatem fuſci. Surculus compreſſus, etiam rugoſus eſt.

L. coralloides, folioſus, & palmatus; ramulis confertis, folioſis, 2-fid. fungiferis. *Hall. helv. n. 1953.*

In Helvetia.

Accedit priori, ſed elegantior eſt. Surculus duricuſcul. teres, cavus, ad genicula apertus, craſſus, verſus ultimos ramorum fines totus planus, & palmatus. Frons paſſim adſperſa ramis ultimi foliis mixti, ampli, & folioſi.

L. caule fruticoſo, ſubfolioſo, ramis adſcendentibus, repetito-biruncatis, punctiferis. *Hall. helv. n. 1954. Murif. hif. 3. f. 15. tab. 7. f. 1. Vaill. pariſ. tab. 26. f. 7. Barr. ic. 1307. & 1277. Dill. muſc. tab. 16. f. 27.*

In Helvetia.

Ad n. 1952. valde accedit. Cinereus, vel virens. Habitus perinde durus, & lævis, abſque molli farina. Surculi recti, adſcendentes, ramiq. ad angulos acutiſſimos diviſi. Cruſta foliacea, ad caulem rarior, aut nulla. Rami crebriores, & breviores, quam priori, furculis perinde acutiſſimis, digitatis. Gemini, ternive funguli ſimiles, perexigui, rotundi, ſpædicei.

L. corniculat. verrucosus, *cavus*, *intus anthracinus*; *fungulis minimis*. *Hall. helv. n. 1958.*

In sylvis, & agris.

Accedit ad L. rangiferinum, qualis maximus provenit, *sempedal. ramosus*, *ramis supremis nutantibus*, *brevisissime multifid: fungulis vix conspicuis notatis*. *Totus obducitur globulis distinctis, cinereis*. *Mollis intus albus est.*

ceranoides. L. fruticosus, lævis, perforatus, spinosus, ramulis punctiferis. Hall. helv. n. 1959. All. Fl. Ped. Mich. gen. tab. 40. f. 2.

Coralloides &c. Dill. musc. tab. 16. f. 21.

In alpidibus.

L. caul. fruticoso, compresso, ramosissimo; ramulis punctiferis. Hall. helv. n. 1961.

In alpidibus.

Simil. L. uncial lævigato colore, sed multo humilior; surcul. compressis, non teretibus, ad sesquiline. latis. Rami conferti. Funguli vix conspicui; neque surculus ad genicula apertus.

L. caule fruticoso, ramoso, erecto, dense cespitoso, Hall. helv. n. 1962. Dill. musc. tab. 16. f. 25.

In montibus.

Surcul. vix uncial. sæpe perforati, ramis brevibus, ex trunco prodeuntibus. Fines conferti argutas spinas ex latiusculo surculo educunt. Color lutescens, basi nigra.

L. fruticosus, lævis, diffusus, ramosissimus, flavus, ramulis liventibus. Hall. helv. n. 1964.

In montibus.

Ambigit inter Coralloides Lichenes, & Usneas, sed non pendet. Durus, firmus, cavus, col. sulphureo; intus cavus, repetito-dichotomus, ramis, & ramulis lividis, subnigris, repetito, & tererrime divisis, in arcum flexis, extremis furcillis 2-fid.

L. ramosus, aureus; cauliculis planis, lacunosis; ramis cornutis, farinosis. Hall. helv. n. 1974.

In montibus.

Simil. L. kirsto, surculo compresso, non ramosiss. diviso, ramis rectis, longis, bicornibus,

pulchre flavis, polline concolore adspersis.
Est 2-3-unc. late diffusus, non pendens.

L. fronde convexa, oris plicatis; ramis brevibus; obtuse lobatis. *Hall. helv. n. 1979. Dill. p. 212. f. 112.*

In alpinis.

Multa similia cum **L. Eryngiifolio** natura subæquali genera. Surculi ferebavi, oris conniventibus, & undulatis, ramis apice complicatis, & multiplicatis, facie crispata.

L. fronde rotunde lobata, virente; inferne scabra. *Hall. helv. n. 2002. Moris. hist. 3 f. 25. tab. 7. f. 3. Dill. musc. tab. 25. n. 98.*

In alpidibus, ad terram, putridumq. lapidem fissilem.

Crusta magna, frondosa lobis brevibus. Pars superior lævis, viridis, per ætatem coloris coriacei. Per interiora cespitis verrucæ efflorescunt, quæ sentim evolutæ in maxinas scutellas abeunt, e cervino-rubras, dein fuscas. Facies inferior cervina, brevis, villosa, & quasi arenosa. Interior pars cespitis radicula ramulas denso ordine emittit.

L. pulmonarius, latifolius, utrinq. glaber, inferne col. lignei: scutellis fuscis, depressis, polline flavescente, rubro-aurantiaco adpersus. *Hall. helv. n. 2003.*

In Helvetia.

An **L. croceus**?

L. fronde rotunde lobata, inferne scabra; arbutulis obscuris. *Hall. helv. n. 2004. Mich. gen. tab. 46. Dill. musc. tab. 26. f. 99.*

In terra, & Muscis passim.

Habitus. **L.** 2002. Rosæ amplæ, planæ, glaucæ, lobis ambitu eleganter laciniatis, medio cespite elevato, superficie lævi, natura coriscea. Scutellæ disco rubro, limbo glauco. Inferna superficies concolor.

L. cartilagineus; scutellis frequentissimis, cervinis: fronde brevi, rotunde lobata. *Hall. helv. n. 2009. Dill. musc. tab. 24. f. 74.*

In Helvetia.

Cespes parum foliosus, fol. brevibus, rotunde, & eleganter lobatis, ex cinereo-virentibus. Scutellæ copiosæ, in centro cespitis congestæ,

stæ, ora eminente cinctæ, cervinæ, concoloræ.

- L. crispus*, convolutus; fronde olivacea, scrobiculosa, marginibus polliniferis. *Hall. helv. n. 1012.*

In Helvetia.

Frons virescens, obscure flava, crispa, passim convoluta, etiam scrobiculis effossa, finibus angulosis, laciniatis, acutis. Passim per extremos margines revolutos pollen albus. Inferne cincta est, & lævis, etiam fuliginosa, & niger.

- L. fronde cinerea*, rotunde lobata, profunde laciniata: scutellis nigris. *Hall. helv. n. 1016. Dill. musc. tab. 24. f. 71.*

In Helvetia.

Simil. L. centrifugo. Rosulæ ampliores. Fol. latiora.

- L. fronde calcaria*, pulposa, laciniata, miniata; lobis linearibus. *Hall. helv. n. 1022. Dill. sylv. tab. 24. f. 68.*

In rupibus alpinis.

Color miniatus. Fol. gracilia, sed crassa, obrussa, divisa. Scutellæ similes, congetiæ, planæ, oris albis.

- L. fronde verrucosa*, obscure lobata, viridi. *Hall. helv. n. 1015.*

In cortice ex montanis.

Ora crusta albißima, simpl. & lævis, foliaceæ tenuitatis, lobis obscuris, sed versus centrum cespitis elevantur, suntq. glebæ depressæ, varix fig. & magnitudinis.

- L. friabilis*, obtuse lobatus: scutellis fuscis. *Hall. helv. n. 1017.*

Ad terram glireosam latus cespites efficit.

Pulposa, farinacea, minus dura natura; folioli. in extremo cespite planis, latis, subrotundis. Scutellæ planissimæ, ex rubro-spadicæ, nitentes, grandiusculæ.

- L. saxatilis*, undulatus, niveus. *Hall. helv. n. 1029.*

In alpinis, ad saxa.

Lævis, alterne altior, & depressior.

- L. undulatus*, purpurascens. *Hall. helv. n. 1030.*

In cortice arborum.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Planta in ligneum languens, crassula, alternis undis inæqualis, coriacea.

L. nigerrimus, tessilis, obtuse lobatus. *Hall. helv. n. 2033.*

In arborum corticibus.

Ad gelatinosos accedit. Tenuissimus, late per corticem maculas ex atro-spadiceas occupat: subtus concolor, & perinde lævis. Lobi obtusissimi, & subrotundi.

L. albidus, laciniatus, lobis scutis. *Hall. helv. n. 2034. Dill. musc. tab. 10. f. 13.*

In alveo fontis.

Simil. L. crispo, sed non ciliatus, & denso cespite.

L. acute laciniatus, crispus, schisteus: scutellis ex fusco-rubentibus. *Hall. helv. n. 2035. Enum. tab. 45. f. 5. An Dill. musc. tab. 19. f. 30?*

In muris, & saxis.

Ex cœruleo-nigricans, saturior *L. crispo*. Fol. latiuscula, sed crispa, sine latiusculo, obtuso, & rotundo. Scutellæ ex fusco-rubentes.

L. (Tremella) gelatinosus, viridis, exsperatus, undiq. concolor. *Hall. helv. n. 2036. Dill. musc. tab. 19. f. 22.*

In Helvetia.

Color etiam ex cœruleo-virens, ut in *L. crispo*, sed fol. planiora.

L. (Tremella) gelatinosus, niger, undosus, & crispus. *Hall. helv. n. 2038. Comm. Acad. perop. T. 3. tab. 14. f. 3. An Dill. musc. tab. 10. n. 15?*

Ad terram, locis macilentis.

Toræ crustæ nubiformes, plicatæ, & undulatæ, non planæ, crassæ, nigerrimæ, pulposæ, per pluvias gelatinosæ, numquam membranaceæ.

L. (Tremella) niger, undatus, crustaceus. *Hall. helv. n. 2040.*

In Helvetia.

Agarici similis, gelatinosus; obtusis tuberculis in continuam superficiem coalescit, in terra natantem.

1430. TRE- Prunificationes vix manifestæ, in corpore gelatinoso.

1. *juniperina*. T. sessil. membranacea, auriformis, fulva. *Syst. veg. ed. 14.*
In juniperetis p.^o vere.
 Gelatina fulva, verno tempore e Juniperis pendula, luteo-viridis; sicca nigricans. Convexa facies, tuberculata, aspera, subtus lævis.
2. *Noctoc*. T. plicata, undulata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 835. f. 1. Dill. musc. tab. 10. f. 14. b. tab. 10 f. 15.*
Linkia &c. Mich. gen. tab. 67. f. 1.
In pratis post pluvias.
 Corium gelatinosum, corrugatum, sordide rufescens; ex siccitate membranaceum. Ab initio exiguis constat nunc globulis, nunc bracteolis; quæ corpuscula augentur, & crassiora fiunt variz figuræ, nunc rotundiora, nunc angulotiora, sibi invicem incumbencia, & conglomerata, col. nunc pallidius, nunc obli-
 cius ex livido virescente. Per siccitatem tenuissima, e fusco nigricans, & fragilis fit.
3. *mesenteriformis*. T. in plicas multiplices, amplas intorta. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 13.*
Noctoc &c. Vaill. bot. tab. 14. f. 4.
Habitat in sylvis ad fol. semiputrida.
 Frondes flavicantes, gelatina solidiores, *Mesenterium* referentes.
4. *rufa*. T. longitudinaliter dimidiato--infundibuliformis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 14.*
Habitat
5. *Lichenoides*. T. est *Lichen crispus*, movente Vahl.
6. *verrucosa*. T. tuberculosa, solida (lobata), rugosa. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 10. f. 16.*
Linkia &c. Mich. gen. tab. 67. f. 2.
Supra lapides, in rivulis.
 Obscure rubra, concava, gelatinosa. Rami longi, & angusti, plani, & pellucidi, tubercul. hinc inde foliosis.
7. *difformis*. T. subrotunda, sinuata, difformis, gelatinosa. *Syst. veg. ed. 14.*
In Oceani Conservis.
 Simil. priori, sed mollis, & loco natali.
8. *hydnoidea*. T. compresso-plana, difformiter digitata, hirsuta. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 16.*
Habitat

9. *hemisphærica*. T. hemisphærica, sparsa. *Syst. veg. ed. 14.*
Weig. Off. 39. tab. 2. f. 3.
In rupibus, & Conservis submarinis.
 Granula lapidibus copiose, & sine ordine insidentia, globosa, gelatinosa.
10. *purpurea*. T. subglobosa, sessilis, solitaria, glabra. *Syst. veg. ed. 14.*
Sphæria &c. Weig. Off. tab. 3. f. 1.
Lichenoides &c. Dill. musc. 106. 18. f. 6.
Valsa miniata. Fl. Carn. Scop.
In Arborum ramis maribundis, & emortuis.
 Tubercula Piscæ magnitudine, glabra, miniata, aut rosea.
Ad Valsam frænt. Scop.
11. *adnata*. T. rotunda, imbricata, livida. *Syst. veg. ed. 14.*
In Oceanis rupibus submarinis.
 Tota sua substantia, facie *Agarici* arborum, sed fere membranacea, rupibus arcte adhærens.

T. (*Agaricum*) gelatinosa, granulosa, flavo-rufa. *Hall. helv. n. 2257.*

Ad trabes, & in corticibus arborum.

Caro tremula: tubercula pene sessilia, col. mali Armeniaci.

T. (*Agaricum*) gelatinosa, coccinea, lobis crassius, dentat. *Hall. helv. n. 2258.*

Crusta planiuscula, per terram putridam, & arborum tabescentia fol. spargitur. Ex ea quasi clavæ eriguntur, sed inæquales, dentatæ, & diffformes. Color undiq. coccineus, elegans.

T. (*Agaricum*) gelatinosa, scutata, obscura flava. *Hall. helv. n. 2259.*

Ad ramos arborum.

Modo sessilis, modo pedunculata. Scuta orbiculata, convexa, lineata, margine plerumq. integro, quandoq. inciso, diametro uncial. Caro tremula.

T. (*Agaricum*) gelatinosa, imbricata, villosa, zonis superne diversicoloribus; inferne unicolor, rugosa. *Hall. helv. n. 2261.*

Agaricum &c. Mich. gen. tab. 66. f. 3. Schaff. t. b. 168.

Ad trabes humidæ, & arbores emortuas.

Ex arboribus prodit squamis ellipticis, imbricatis, superne convexis. Convexa superficies

arcibus ellipticis, concentricis, diversicoloribus pingitur, villo adspersis sericeo, in aliis zonis longo; in aliis perbrevis. Color fuscus, etiam albidus, alias varicolor, ut sibi succederet viridis zona, cinerea, nigra, glauca, nigerrima, albida. Inferior facies ad *Pezizium* modum rugis ramosis percurritur, continuo violaceo, & spadiceo col. villo tenerimo, quasi polline. Caro tremula, quæ *Pezizæ*. Præcedens non subtus, sed tota crispatur, neque supernam convexitatem ab infer. venosa distinctam habet; neque adeo conspicuum villum.

crispa. T. Dill. musc. tab. 10. f. 11.

Ad radices arborum.

viscaria. T. multistida, frondibus linearibus, sub 3-fid. Neck. Gallo-belg.

In truncis arborum castis.

Frondes gelatinosæ, visci in modum ad digitum lentescentes, utrimq. atro-purpur. in 3-4. phalanges divisæ.

cornuta. T. fronde tereti; ramulis subdichotomis. Neck. Gallo-Belg. Dill. musc. tab. 10. f. 10.

In fossis limosis.

Frondes ramulosculæ, cinereo-viridulæ, nitidæ, punctul. albidis. Rami vix lineares, obtusi.

Pisiformis. T. petiolat. subglobosa, nivea. Scop. Fl. Carn. In lignis.

Massa subrotunda, rugosa, breviter stipitata.

alveolata. T. cespitosa, candida, alveolata, diffuens. Scop. Fl. Carn.

In Abietibus.

Passa candida, favum referens, in sulphuream gelatinam diffuens.

Coralloides. T. cespitosa, nivea; frondibus suberectis, subulatis, ramosis. Scop. Fl. Carn.

In sylvis, ad radices arborum.

Cespitulus papillarum albarum, cohærentium, & ramosarum.

coccinea. T. cespitosa, coccinea; frondibus erectis, cylindricis, obtusis. Scop. Fl. Carn.

In truncis.

Acervus convexus fibrarum coccinearum, vermiculos referentium, succo pariter coccineo.

T. plana difformis, ramosa, Hall. helv. n. 2126.

An. Dill. musc. tab. 54. f. 48? videtur.

In Helvetia.

Caulicul. ramosus, sed difformis, ramis planis, subinde quasi capillaris filamenta emittentibus.

2431. FUCUS. Mas. Vesiculæ villis intertextæ.

Fem. Vesicul. adpersæ granis immerfis, apice prominulis. Sem. solitaria. Substantia coriacea, vesicularis.

1. *uvarius*. F. caul. filiformi, ramoso: fol. confertis, ovatis, fornicatis. Syst. veg. ed. 14.

In Oceano asiatico.

Fol. conferta in racemum, retrorsum fornicata, parva, membranacea, purpurascentia.

2. *natans*. F. caul. filiformi, ramoso: fol. lanceolat. serratis: fructificationibus globosis, pedunculatis. Syst. veg. ed. 14.

Lenticula &c. Dalech. hist. 1397.

In Pelago libere natans, nec radicans.

Fructificat. in aliis muticæ, in aliis filo brevi aristatæ; in quibusdam individuis ex alis folior. racemi brevissimi, siliculis minutis, verrucosis.

3. *acinarius*. F. caul. filiformi, ramoso: fol. linearibus, integerrim: fructificationibus globosis, pedunculatis. Syst. veg. ed. 14.

Lenticula &c. Lob. ic. 2. p. 256.

Acinaria &c. Donat. marin. tab. 4. f. 1.

In Italia, & Oceano austral.

Priori adfixis. Cartilagineus, compressus, rubens. Fructificat. ad ramorum summorum margines, magnitudine sem. Brassicæ, sæpe ad basin foliolo subulato.

4. *lendigerus*. F. caul. filiformi, ramoso: fol. lanceolatis, serratis: fructificationibus racemosis; siliculis tuberculosis. Syst. veg. ed. 14.

Ad insulam Adseensionis.

Caul. spirham. fuscus; fol. alternis, deciduis. Rami axillar. caule longiores, laxi, simplices.

Fol. pellucida. Cyma ex singulis alis superioribus pedunculata, fructificationibus fuscis, sessilibus, subulatis, nodosis, foliis brevioribus.

5. *turbinatus*. F. caul. filiformi, subramoso: fructific. racemosis; una vesiculari turbinata, fol. cordato,

crenato peltata. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. fuc. tab. 5. f. 1. Sloan. Jan. hist. 2. tab. 20. f. 6.*

In Amer. rupibus marinis, & in Oceano Sumatram alluente.

Racemi priori similes, e filiculis verrucosis, sed obtusiores. In quovis racemo vesica magna. Fol. præter velicularia dicta, nulla visa sunt.

6. *serratus*. F. fronde plana, dichotoma, costata, serrato-dentata: fructificat. terminalibus tuberculosis. *Syst. veg. ed. 14. Moiss. hist. 3. f. 15. tab. 9. f. 1. Ad. gall. 1711. tab. 9. f. 1.*

In Oceano, & Mediterraneo.

Frons nervo longitud. noli, pollicem lata, margine dentato, & serrato, utrimq. pilifera.

7. *volubilis*. F. fronde plana, spirali, perfoliata, repando-dentata. *Syst. veg. ed. 14.*

Epilica &c. Giran. adriat. 1. tab. 27.

Alga &c. Boccon. sic. tab. 38. f. 2.

In Mari Mediterraneo.

Frons 2-3. unc. longa, tenuis, & angusta, simpl. vel ramosa, fusco-nigra, nitida.

8. *vesiculosus*. F. fronde plana, dichotoma, costata, integerrima: vesiculis axillaribus geminis; terminalibus tuberculatis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. gall. 1711. p. 288. f. 2.*

In Mari Atlantico, & Mediterraneo.

Fol. dodrantal. aut pedalia, mollia: recentia atro-viridia; sicca nigrescentia, & glutinis instar nitida.

9. *divaricatus*. F. fronde plana, dichotoma, integerrima; axillis divaricatis; vesicul. axillaribus (plerumque) geminis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 5.*

In Anglia, Lusitania.

Priore tenuior. Vesicula passim solitaria. Caul. semiped. & ultra; in culus apice fol. in orbem disposita, 1-fesquipalmar. angusta, compressa.

10. *inflatus*. F. fronde plana, dichotoma, ovato-lanceol. inflata, integerrima, punctata, apice diviso. *Syst. veg. ed. 14.*

In Oceano Atlantico.

Spitham. Frons ultra dimidiam partem 2-fid. Contrahitur in spiram oblique ascendentem.

11. *ceranoides*. F. fronde plana, dichotoma, integerrima, punctata

clata, lanceol: fructificat. terminalibus bifidis, tuberculatis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 13. Gmel. fuc. tab. 7. f. 1.*

In Oceano, & Mediterraneo.

Priori adfuit, sed angustior, magisq. ramosus, utrimq. punctatus. Minor, & lator F. vesiculoso. Var. magnitudine, & col.

12. *spiralis*. F. fronde plana, dichotoma, integerrima, punctata; inferne lineari-caniculata: fructificat. geminis, tuberculatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 186*

In Oceano, & ad mare Nicænsi.

Frons membranacea, inferne angustior. Fructific. terminal. peduncul. oblongæ, crassiusculæ. Dum crescit in mari, contortus est in spiram.

13. *canaliculatus*. F. fronde plana, dichotoma, integerrima, lineari, canaliculata; fructificat obtusis, 2-part. tuberculatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. fuc. tab. 1. a f. 2.*

b. Moris hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 11.

In Oceano Europæo, & Mediterraneo, ad rupes litoris.

Multoties dichotomus, lævis; latere altero convexo, altero canaliculato. Vesiculæ terminal. sessiles.

14. *distichus*. F. fronde plana, integerrima, dichotoma, lineari: fructificat. mucronatis, tuberculatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 351.*

F. filiformis. Gmel. fuc. tab. 1. f. 1.

In Oceano septentr.

Differt a priore, quod frons minime altero latere canaliculata; & vesiculæ siquæ instar, longæ, & acuminatæ. Frons nervo medio; textura herbacea.

15. *nodosus*. F. fronde compressa, dichotoma: fol. distichis, integerrimis; vesiculis innatis, solitariis, dilatatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 146. Gmel. fuc. tab. 1. B. f. 1. Baster. opusc. 6. tab. 11. f. 5. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 2. Dod. pempt. 781.*

In Mari Adriatico &c.

Fol. lanceol. obrusa, angulis frondis distiche insidentia. Vesicul. acutæ, medio ramorum innatæ, ramis latiores.

16. *pyriferus*. F. stirpe filiformi, dichotoma: frondibus membranaceis, ensiformibus, solitariis, ferratis; terminalibus petiolo inflatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Oceano æthiopico.

Stirps omnium longissima, & maxima, compressa. Frondes alternæ, petiolat. remotæ, erectæ, productæ. Vesiculæ fig & magnitudine *Pari.*

17. *siliquosus*. F. fronde compressa, ramosa: fol. distichis, alternis, integerrim. fructificat. pedunculat oblong. mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 106. Gmel. fuc. tab. 2. f. 1. Dod. pempt. 4^{to}.*

In Oceano, & Mediterraneo, ad rupes litoris.

Frons filiform. flexuosa, utrinq. angulis dentata rudimentis petiolor. aut fructificationum. Fructific. alternæ, fusiform. rostratæ. Fol. lanceol. fructificat. minora.

18. *filiculofus*. F. fronde filiformi-compressa: fol. alternis, subferratis: fructific. subglobosis, pedunculat. mucronatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat

Frons vix ramosa. Fol. lineari-lanceol. Pedunc. axill. filiform.

19. *elongatus*. F. fronde filiform. compressa, dichotoma, articulata, geniculis tumidiusculis. *Syst. veg. ed. 14.*

Inter Angliam, & Hispaniam.

Frons longissima, aphylla, versus apicem sensim angustior, articulis per ætatem evanescentibus, glabro-mucida, 1-3. ped. superficies punctis verrucosis undiq. tecta. Color in viva planta eleganter rubens, punctis pallidioribus.

20. *loreus*. F. fronde filiform. compressa, dichotoma, undiq. utrinq. tuberculata: *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 710.*

Habitat

21. *feniculaceus*. F. fronde filiform. ramosissima; vesiculis ovatis, terminatis foliol. multipartit. obrutis, apice fructificantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. fuc. tab. 2. a f 3.*

In Oceani, & Mediterranei rupibus litoris.

An var. F. burhatt? Statura Lichens Urtæ.

22. *triqueter*. F. fronde ancipiti, ramosa: fol. petiolat. den-

ticulatis: fructicar. immerfis, oblongis, triquetris. *Syst. veg. ed. 14.*

In mar. Capensi.

Frons membranacea, linearis, continuata, ramis lateralibus. Fructific. vesicular.

23. *granulatus*. F. fronde filiformi, ramosissima; ramulis acuminatis: vesicul. cumulat. subrotund: ramis, foliisq. acutis, omnibus innatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 251.*

In Oceano indico.

Vesiculæ absq. ordine confertæ.

24. *salaginoides*. F. fronde filiform. ramulosa; ramis dichotomis: fol. subulatis, alternis, basi reticulosis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. fuc. 2. a. f. 2. Barr. ic. 1250. Boec. mus. tab. 12.*

In Oceano norvegico, & Mediterraneo, ad litus.
Caul. flexuosus, ramis imbricatis. Fol. brevissima.

25. *concatenatus*. F. fronde filiform. ramosissima; ramulis dichotomis; vesicul. moniliformibus, distinctibus, innatis: fol. subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Oceano.

Vesicul. ovatæ, cauli, ramulisq. innatæ, cum fol. subulato ad latus cuiusvis vesiculæ.

26. *aculeatus*. F. fronde filiformi, compressa, ramosissima; dentibus marginalibus subulatis, alternis, erectis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 355. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 9. f. 4.*

b. *Gmel. fuc. tab. 12. f. 1. A. d. Nordoff. 4. tab. 7.*
In Oceano Norvegico, & Mediterraneo.

Refert caudam equinam. Dividitur in pl. divaricationes longas, tennes.

27. *lycopodioides*. F. fronde filiform. tereti, subramosa; obrecta undiq. fenis. *Syst. veg. ed. 14.*

Conserva &c. *Fl. Dan. tab. 357.*

Habitat

Frons vix ped. erecta, tecta foliolis setaceis, semipollic.

28. *hirsutus*. F. fronde filiform. tereti, dichotoma, obrecta undiq. hirsutie. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pelago.

Facies tere Spongiæ. Caul. ped. ramosissimi, villo denso, quasi cervino. Proxime accens ad F. ericoidem.

29. *discors*. F. fronde tereti, inermi aculeatissima: fol. distichis, subpinnatis, lineari-lanceolat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*
Habitat
 Caul. palmar. teres, undiq. vestitus ramentis confertissimis, non pungentibus. Fol. plana, lævia.
30. *Tendo*. F. fronde filiformi, simplici, cartilaginea, subdiaphana. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 184. f. 3.*
In China.
31. *Filum*. F. fronde filiformi, subfragili, opaca. *Syst. veg. ed. 14. Amæn. ac. 4. tab. 3. f. 2. Bosc. mus. 1. tab. 9. f. 9.*
In Oceano Atlantico.
 Ligulæ teretes, primum teneriores, dein firmiores, ulnares, cavæ. Per fœcilitatem nigrescit.
32. *lanosus*. F. frondibus capillaceis, dichotomis, ramosissimis. scabris. *Syst. veg. ed. 14.*
In Oceano Islandico.
 Palmaris; refert lanam atram.
33. *fœstigiatus*. F. fronde filiformi, dichotoma, ramosissima, fœstigiata, obtusa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 393. Gmel. fuc. tab. 6. f. 1. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 9. f. 9. Loef. prus. tab. 15.*
In Oceano Baltico, & ad rupes maris Nicæensis.
 Cinereus. Caul. palmar. linearis, aphyllus, ramis terminalibus.
34. *furcellatus*. F. fronde filiformi, dichotoma, ramosissima, acuminata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 499. Ad. nidros. 4. tab. 5. f. 4. Gmel. fuc. tab. 6. f. 2. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 9. f. 4.*
In Oceano Anglico.
 Priori accedit, sed altior; ramis crassioribus, apice acuminatis. Color ruber.
35. *palmatus*. F. fronde palmata, plana. *Syst. veg. ed. 14. Ad. nidros. 4. tab. 9. Gmel. fuc. tab. 26. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 1.*
In Oceano, & ad rupes maris Nicæensis.
 Caul. breviss. substantia herbacea, viridis, 3-4. digit. long. palmæ humanæ ad instar divisa.
36. *buccinalis*. F. stipe fistulosa, fronde pinnato-palmata, coriacea: foliol. ensiformibus, integerrimis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Oceano.

Culmus sublignosus, sursum sensim incrassatus
Frons terminalis, lanceol. *Maximus*. *A. F.*
digitato differt, foliol. basi adtenuatis, nec la-
cinatis.

37. *digitatus*. F. fronde palmata; foliol. ensiformibus; stirpe
subtereti. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 392.*
Gunn fl. tab. 3. Gmel. fuc. tab. 30.

In Oceano Atlantico.

Caul. longissim. 3-4 cubit. durus. Frons sim-
plex, caule altior, 1-2. cubitos lata, confi-
scentia vehicæ bubulæ. *Planta recens subfusca.*

38. *esulentus*. F. fronde simplici, indivisa, ensiformi; stirpe
tetragona pinnati, folium percurrente. *S. fl.*
veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 417. Gmel. fuc.
tab. 29. f. 1. Ad. nudo. 4. tab. 8. f. 1.

In Mari Atlantico.

Frons maxima. Stirps crassa, lata, cui intra
folium utrinq. insident pinnul. ensiform. pla-
næ. *Esulentus hominibus, & equis. Differt a*
sequenti, nervo folii, & pinnulis.

39. *saccharinus*. F. frond. subsimplici, ensiformi; stirpe tere-
ti, brevissima. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.*
416. Gmel. fuc. tab. 27. E. Nat. C. 1748.
tab. 9. f. 1 2.

In mari Atlantico.

Coriaceus, 4-ped. oblongus, valde latus, basi
angustior, undulatus viscidus, madidus. Caul.
sempalm. Frons convoluta, tortuosa, sinuosa,
obscurè virens.

40. *sanguineus*. F. frondibus membranaceis, ovat-oblong: in-
tegerim. petiolat: caule tereti, ramoso. *Syst.*
veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 349. Gmel. fuc.
tab. 24. f. 2. Giseh. ic. fasc. 1. tab. 24. Mo-
rif. hist. 3. f. 13. tab. 8. f. 6.

In Oceano Atlantico.

Color purpuro-sanguineus. In adulta fronde ra-
chis, frondesq; partiales quandoq. complican-
tur, ut prolifera evadat planta.

41. *ciliatus*. F. frondibus membranaceis, lanceolat prolife-
ris, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab.*
353. Gmel. fuc. tab. 20. f. 2.

In Oceano Atlantico.

Color ruber.

42. *crispus*. F. frondibus membranaceis, dichotomis; laciniis

dilatatus, crispis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 6.*

In Oceano atlantico.

Lacinix purpureæ. aut albidæ, superne latiores, apice obtuse dent.

43. *crispatus*. F. frondibus membranaceis, sublinearibus, ramosis. crispis, coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 826.*

Habitat

Tenerrimus, sanguineus.

44. *alatus*. F. frondibus membranac. subdichotomis, costatis; lacinis alternis, decurrentibus, lifidis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 352.*

In Oceano septentr.

Purpur. diaphanus; lacin. linearibus, subdentat.

45. *dentatus*. F. frondibus membranaceis, enerviis, alternatim pinnatifid: sinibus obtusis; lacinis apice eros. *Syst. veg. ed. 14. Fl. D n. tab. 354. Gmel. fuc. tab. 10. f. 1. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 8. f. 5.*

In Oceano atlantico, & in Mediterraneo.

Frons rubra, diaphana.

46. *rubens*. F. frondibus membranac. oblongis, sinuatis, undulatis: stirpe tereti, ramola. *Syst. veg. ed. 14.*

Alga &c. *Mart. cent. tab. 32.*

In Oceano.

Col. suaverubens.

47. *venosus*. F. fronde plana, oblonga, picta, venis ramosis, verrucosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Frons sanguinea, linearis, latitudine digiti, lævis, margine dentata, seu laciniata. Venæ saure rubræ.

48. *vittatus*. F. frondibus membranaceis, divisis, ensiformibus, dentato-crispatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 353.*

Habitat

Vur. fronde prolifera.

49. *ramentaceus*. F. frondibus filiformibus, simplicibus: hinc ramentis foliaceis, confertis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ulva &c. *Fl. Dan. tab. 356.*

In Oceano septentr.

Stipit. palmar. ab altero tantum latere ramenti linear. colorati. Stirps tubulosa.

50. *plumosus*. F. frondibus cartilagineis, lanceolat: 2-pinnat. plumosis: caul. filiformi, compresso, ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 350.*

Fucoides &c. *Roj Syn. tab. 2. f. 5*

In Oceano atlantico, & in Mari Nicænsi &c.

Simil. sequenti, sed H. pni instar pinnatus, parvus. Col. purpur.

51. *abrotanifolius*. F. fronde filiformi, compressa, 2-pinn. apicibus vesiculosus, dilatatis, terminatis fructificat. hinc tuberculatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. sequenti.

52. *cartilagineus*. F. fronde cartilaginea, compressa, supra decomposito-pinnata; laciniis linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Giseck 1c. fasc. 1. tab. 25. Gmel. fuc. tab. 17. f. 2. Gunn. Fl. norv. tab. 3. f. 5.*

Frutices &c. Seb. mus. 3. tab. 102. f. 1. 2.

Ad cap. b. Spei, copiosissima, incrustata; & ad rupes maris Nicænsis.

Denus cespes ramulorum rubentium, mollium, attenuatorum, segmentis ultimis exiguis, attenuatis. Caul. breviss. compressus, vix articulatus, dentatus, ruber, aut viridis.

53. *gigartinus*. F. fronde cartilaginea, filiformi-compressa, dichotoma: fructification. globosis, terminalibus, pedunculatis; subiacente arista. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat . . .

Erectus, palmar. rigidus, diaphanus, coloratus, subramulosus. Fructific. parvæ, instar seminis Brufficæ min.

54. *spinosus*. F. aphyll. cartilagineus, ramosus, denticulis verticillato-ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Stirps palmar. teres, varie ramosa, diaphana; dentibus inermibus.

55. *spermophorus*. F. fronde membranacea, dichotoma, compressa, capillacea; fructificat. later. libus pedunculat. fol. linearibus, multitudine. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat . . .

Stirps palmar. laxis. Fructific. globosa, magnitudine sem. Thyvi. Ad basin Hipitis fol. membranacea, obtusa, caule latiora.

56. *conservoides*. F. frondibus membranaceis, linearibus, compressis, ramosis: fructificat. sparsis, sessilibus, sub-

rotundis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. fuc. tab. 14. f. 1.*

In Mari anglico, & ad rupes maris Nicæensis.

Color rubens. Frons ramis longis, subulatis: vesicul. lateralibus, rotundis.

37. *flavus.* F. spongiosus; ramis erectis, sub 5-angularibus, laciniato-dent. areolatis, nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

Raro in fundo sit i Zeylanici.

Crassus, & porosus est. More *Corallit* crescit, sed non durus.

38. *pinnatus.* F. caul. repente, ramosissimo; frondibus simplicipinnatis: pinnis approximatis, æqualibus, obtusis: fructificat. verticillatis, peltatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Zeylona: in freto Chilæ sub mare.

Subcartilagin. viridi-opacus. Frondes longæ, tenues; pinnis lanceol.

- abrotanoides.* F. fronde ramosa, capillari, multifida, fasciculata, vesicul. globosis. *Neck. met. muse. All. Fl. Ped.*

In Mari Nicæensi &c.

- linearis.* F. dichotomus, planus, linearis, acutus; vesiculis ovatis, spatis. *Huds. Fl. Angl. All. Fl. Ped.*

Ad rupes maris Nicæensis.

- rotundus.* F. teres, subdichotomus, uniformis, ramis obtusis, verrucosis. *Huds. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Gmel. fuc. tab. 6. f. 3.*

In Mediterraneo &c.

- pseudo-ceratoidea.* F. parvus, cauliculis teretibus: summitatibus membranaceis, dilatatis, & laceris. *Huds. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Gmel. fuc. tab. 7. f. 4.*

Ad rupes maris Nicæensis.

- Tamariscifolius.* F. caul. tereti, ramosissimo; fol. alternis, subulatis; vesiculis rotundis, imbricatis, sessilibus, axillaribus. *Huds. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Gmel. fuc. tab. 11. f. 2.*

Ad rupes maris Nicæensis.

- Helminthochortus.* F. De la Tourt. diff. helmint. All. Fl. Ped. Mucus &c. *Barr. ic. 276. n. 3.*

In ruptus maris Nicæensis.

Magnum efficax anthelminticum: dosis a dr. semisse ad dr. 1.

- longissimus*. F. teres, rubens, minus ramosus; in longum protensus. *Raj. Sinop. All. Fl. Ped. Gmel. fuc. tab. 13.*
In mari Nicænsi &c.
- purpureus*. F. filiform, teres, ramosissimus; ramis alternis; ramulis confertis, fruct. feris; fructibus globosis. *Huds. Fl. Angl. All. Fl. Ped.*
Ad mare Nicænsis.
- plicatus*. F. capillaris, uniformis, ramosissimus, implicatus, subliaphanus. *Huds. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Gmel. fuc. tab. 14. f. 2. Pluk. phyt. tab. 184. f. 2.*
Ad rupes maris Nicænsis.
- corneus*. F. cartilagineus; caul. teretiufculo, compresso, ramosissimo, ramis subinnatis, laciniis acutis, fructiferis. *Huds. Fl. Angl. Gmel. fuc. tab. 14. f. 3.*
Ad rupes maris Nicænsis.
- pinnatifidus*. F. frondibus planis, ramosis, ramis dentato-pinnatifidis, marginibus callotis. *Huds. Fl. Angl. Gmel. fuc. tab. 1. 3. All. Fl. Ped.*
Ad rupes maris Nicænsis.
- ferrulatus*. F. caulibus teretibus, ramosis: fol. simplicibus, linearibus, ferrularis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Totus viridis. Caul. spitham. angusti. Fol. pollicar. quandoq. in medio divisa in 2-3. laciniis.
- acerosus*. F. caulibus teretibus, ramosis, ramis confertis, distichis, undiq. teris filiformibus, patentibus; fol. nullis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Caul. spitham. exteriores decrescentes, & demum filum æquantes. Ramuli pollic. Color flavido-fuscus.
- papillofus*. F. caul. tereti, ramoso, undiq. seriebus spirali-bus circa caulem, & ramos, papillorum, apice dilatato-multiloborum: fol. nullis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Color aliis fuscus; aliis flavus. Caul. pedal. conferte ramosi.
- linearis*. F. frondibus linearibus, dichotomis, planis, sensim angustioribus: apicibus acutis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.

Planta

Planta mollis. Frond. spitham. tenues, pellucidæ, flavido-fuscæ, apice sæpe furcato. Ramuli supremi prope apicem lanceol.

caespitosus. F. caul. tereti, ramoso, conferto, papilloso; papillis adrenuatis, simplicibus, ramulosis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Fuscus. Rami complicati, denuo connati. Vescicæ nullæ.

seticulosus. F. teres, ramosus, papillis sparsis; ramis basi in vesicam papillofam dilatatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Caul. spitham. fili crassitie, papillis setiformibus, sine ordine ramosus.

fragilis. F. caulibus filiformibus, dichotomis, fastigiatis, fragilibus: fol. nullis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Simil. Licheni fragili, faciens cespitem subglobosum, conferte ramosum.

Caul. rufescentes, sicci fragiles.

plumaris. F. caul. repente, tereti, sursum ramoso; ramis plumiformibus: foliis distichis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Color gramineo-virid. Caul. flavescent, ramis sparsis, 2-pollic. confertis, plumiformibus. *Singularis profus structura.*

debilis. F. caulibus teretibus, ramosis, subfastigiatis, tubulosis, debilibus: fol. nullis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Caul. sesquiped. lividus, apice furcato, acuto. F. frondibus planis, dichotomis, sensim latioribus, margine nudis. *Forsk. Æg.*

laminosus.

In Arabia.

Sequenti simil. & forte variet. Caul. e media basi frondis exit subulatus, ad semipollic. spatium, utrimq. convexus, tomentosus. Fol. nulla ad marginem frond.

foliifer. F. frondibus planis, dichotomis; ultimis margine, & apice foliiferis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Frond. basi fuscæ, angustæ, dein sensim dilatatae; extimæ verucul. fulcis, utrimq. numerosis, sparsis. Fol. parva, lineari-lanceol. integra, in eodem plano cum fronde sua. Caul.

Tom. VI.

6

semipollic. spatio a rad. extenditur: convexitas utrimq. in media basi frondis.

denticulatus. F. caul. tereti, ramoso: fol. linearibus, denticulatis: vesicis globosis, pedunculatis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Ultra tres ulnas sæpe longus, flavescent.

racemosus. F. caul. repente, tereti, ramoso: vesicis conferte racemosis, obovatis: fol. nullis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Totus viridis. Racemi vesicul. 3-pollic. undiq. vesiculis viridibus imbricari.

articulatus. F. ramis alternis, articulatis, triquetris, articulis cuneiformibus: angul. subulatis, dentatis: fol. nullis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Cartilagineus, viridi-flavicans.

conoides. F. caul. tereti, ramoso, ramis conoidibus; vesicis deltoidibus, dentatis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Caul. pollic. flavescent. durus. Rami inæqualiter spatio distantes; pollic. crassi, 3. longi. Omnium 4-laterum margines carinati, dentato-spinosi. In vesicularum alis novi ramuli Uvis parvis similes; maturi conoides.

subrepandus. F. caul. compresso, ramis alternis: fol. lineari-lanceolat. subrepando-dentat. vesiculis pedunculat. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Simil. F. natanti, sed fol. dentata, non serrata, neque vesicæ aristata. Caul. cubital. flavescent; Fol. conferta, alterna, obtusa, quædam etiam integra. Vesicul. axillar. globoso-acutæ.

trinodis. F. caul. tereti, ramoso; ramulis in 3. vesiculas inflatis, apice subulatis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Caul. flavescent. Rami 2-pollic. Ramuli filiform. basi, medio trinodi, latiores. Fol. nulla.

uvifer. F. teres, ramis sparsis: glandulis confertis, ovatis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Refert uvas puniceas, parvas, pellucidas.

viscidus. F. caulibus teretibus, dihotomis, ramosis, fastigiatis, apicibus bicornibus. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Totus albidus. Facies, & magnitudo *Lichenis rangifert*. Vilcidus etiam intus.

prolifer. F. frondescens, virid. articulis obovatis, planis, proliferis. *Forsk. Æg.*

In Ægypto.

glacialis. F. *Pall. it.* 3.

In Danuvia.

Statura, & color ruber F. *alsti*, sed nervus plane nullus, & substantia magis cartilaginea. Frons plana, linearis, ramosissima, dichotomo multifida, laciniiis acutissim. subserrata, apice latiuscula. Pars, quæ maxime viget, marginibus est ciliata ramentis subtilissim. quæ in novos ramulos excrescunt.

cruncatus. F. *Pall. it.* 3.

In Danuvia.

F. *crispa* consistentia, colore, & facie similis, sed magis subdivisus, & crispatus, laciniiis latissim. Frons versus stipitem teretiuscula, angustiss. 3-4-chotoma, versus apicem sentim latissima, membranac. rubra, vel alba. Sinus ad omnes divisiones rectilinei: lacinia extremæ crenato-cisipæ. Fructificat. globulosæ, in ipso margine recto inter lacinias novissimas medix, confertim sessiles, rubellæ.

1432. *ULVA.* Substantia membranacea, longa, tubulosa, vel campanulata, laxa, diaphana.

1. *pavonina.* U. plana, reniformis, sessilis, decussatim striata. *Syst. veg. ed.* 14.

Fucus &c. *Moris. hist.* 3. f. 15. tab. 8. f. 7. *Ellis. cor. tab.* 33. f. C.

In Mari Europæ austral.

Vericolor, Gallo-pavonis pennas referens.

2. *umbilicalis.* U. plana, umbilicaris, sessilis, peltata, coriacea. *Syst. veg. ed.* 14.

Tremella &c. *Dill. musc. tab.* 8. f. 3.

Ad rupes maris.

Leviter concava, col. obscure fuliginoso, sicca obscure purpurea.

3. *intestinalis.* U. tubulosa, simplex. *Syst. veg. ed.* 14.

Tremella &c. *Dill. musc. tab.* 9. f. 7.

In omni Mari.

Membrana intestinum colum referens, col. albicante, dein luteo, tuberibus, & brevibus cæ-

cis appendicibus passim intumescens. Sæpe tota crispatur, & in rugas collecta pedalis evadit.

4. *lumbricalis*. U. tubulosa, isthmis intercepta. *Syst. veg. ed.* 14.

Ad Cap. b. spei.

Culmi pl. digitales, parum subdivisi, erecti, teretes, membranacei, intus articulati, flavescentes. Fasciculus papillarum vesicalium, seu rudimentorum ramorum ex apice culmi. *Diversa a priore.*

5. *compressa*. U. tubulosa, ramosa, compressa. *Syst. veg. ed.* 14.

Tremella &c. *Dill. musc. tab. 9. f. 8.*

In Europæ mari, & tectis maritimis.

Inæqualis, flexuosa, quandoq. simplex. Variat ludit fig. In maris litoribus, & fluviis prope ipsum conferta nascitur brevior, capillacea. In fluviis a mari remotis, longior, latior, tenuis, compressa.

6. *rugosa*. U. tubulosa, ramosa, rugosa. *Syst. veg. ed.* 14.

Ad Cap. b. spei.

Stipit. pl. digital. tenuissimi, erecti, membranacei, ut U. *intestinalis*, rugosissimi, apice aperti.

7. *confervoides*. U. filiform. articulata, articulis alternatim compressis. *Syst. veg. ed.* 14.

Conferva &c. *Dill. musc. tab. 6. f. 39.*

In Mari.

Semi-1-palm. col. ex viridi-flavesce. in sicca obsolete albido. Rami nunc geniculati, nunc nodosi.

8. *latissima*. U. oblonga, plana, undulata, membranacea, viridis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Mari Europæo.

Frons magnitudine folii *Musæ*, tenuis, virid. margine undato, & plicato.

9. *Lacuca*. U. palmata, prolifera, membranacea; ramentis inferne angustatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Tremella &c. *Dill. musc. tab. 8. f. 1.*

In Oceano, & Mediterraneo.

Fronde. aggregatæ, pallidæ, segmentis obovatis, obtusis, undatis.

10. *papillosa*. U. lanceolato-subulata, undiq. papillis muricata. *Syst. veg. ed.* 14.

Fucus &c. *Gmel. fuc. tab. 6. f. 4.*

In Mari Æthiopico.

Vix digital. altero latere longitudinaliter conni-
vens, quasi canaliculata, flava. Papillæ car-
nosæ, obtusæ, subdecurrent. flavæ.

11. *lanceola-* *U. lanceolata, plana. Syst. veg. ed. 14.*

ta. Tremella &c. Dill. musc. tab. 9. f. 5.

In Oceano.

12. *labyrinthi-* *U. cellulis labyrinthiformibus, prominentiisque*
formis. clavatis. Syst. veg. ed. 14. Vand. therm. 120.
tab. 2.

In Thermis Pataviis.

Membranæ binæ, horizontales, distantes. In
membranis, & cavitatibus dispersa sunt grana
plurima, concava.

13. *Linga.* *U. fronde oblonga, bullata. Syst. veg. ed. 14.*
Fl. Dan. tab. 889.

Tremella &c. Dill. musc. tab. 9. f. 6.

In Oceano, & Mediterraneo.

Ex lamina complicata, in posteriore parte con-
iuncta, & æquali, antèrius aperta, sinuosa,
& crispa ab aliis differt.

14. *prunifor-* *U. subglobosa, solitaria, intus succulenta. Syst.*
mis. veg. ed. 14. Weig. Obs. tab. 2. f. 4. Gunn.
norv. tab. 2. f. 6. 7. & tab. 9. f. 4. 6.

In locubus Sveciæ, Borussiæ.

Magnitudo, & fig. fructus *Pruni* (plerumq.).
Cortex atro-virid. glaber, pulpam includens.
Fig. variè ludit; uno vel altero latere com-
presso.

15. *granulata.* *U. globosa, fæcta, viridis. Syst. veg. ed. 14. Fl.*
Dan. tab. 660. f. 2.

Ad ripas paludum, fontiumq. Europæ.

Reiicitur ad litora paludum, natans, viridis,
magnitudine sem. *Cannabis*, copiosissima, fæ-
cta pulpa subviscosa.

javanica. *U. filiformis, articulis torosioribus: fol. qua-*
ternis, connatis. Burm. Ind. Dill. musc. tab.
10. f. 8.

In India.

Differt tantum a citata fig. *Dill. fol. quaternis,*
linearibus, semipoll. connatis; caule vix ramo-
so.

- reticulata*. U. subglobosa, solitaria, rugoso-plicata, intus vacua. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Foramina mæ: pollicis diametro: rami foraminibus oblongis, inæqualibus, unius seriei.
- savernosa*. U. subglobosa, solitaria, rugoso-plicata, intus vacua. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Diameter 2-pollic. Color cinereo-viridis. Plicæ sine ordine: cutis hinc inde contracta, depressa; intus formans locula plura, vacua, sine pulpa.
- Oryzaformis*. U. articulis vesicularibus, congestis, cohærentibus. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Soli exposita refert pulvrem *Oryza* coctæ.
- ovata*. U. caule tereti, undiq. imbricato; vesicis cuneiformibus, compressis, apice perforatis, limbo dilatato, concavo. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Caul. angustus, subteres. Limbus reniformis.
2433. CON-
 FERVA. Substantia capillaris, fibrosa, tuberculosa; filamentis longissim. uniformibus, sæpe intertextis constans, substantiis tubercula inæqualia. *A Byssō differt potissimum vita in aquis.*
 * *Filament. simplicibus, æqualibus, geniculis destitutis.*
1. *rivularis*. C. filament. simplicibus: longissim. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 881. Dill. musc. tab. 2. f. 2.*
Byssus &c Mich. gen. tab. 89. f. 7.
In Europæ rivulis, fluviiq. pacatioribus.
 Filam. 1-2-cubit. & ultra, fluitantia, valde tenuia, indivisa, virid. nitida, & veluti sericea.
2. *fontinalis*. C. filament. simplicibus, æqualibus, digito brevioribus (undiq. divergentibus). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 651. f. 3. Dill. musc. tab. 2. f. 3.*
Byssus. Mich. gen. tab. 89. f. 8. 10. 11.
In Euro:æ fontibus.
 Celsiores crustacei. Filam. uncial. circa centrum congregata. Fascicul. in ambitu atro-virens, in medio flavesceus.

** *Filamentis ramosis, æqualibus.*

3. *bullosa*. C. filament. æqualibus, ramosis, bullas aereas includentibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 3. f. 11.*
Muscus &c. *Locs. pruss. tab. 55.*
In Europæ aquis stagnantibus.
Imbricata bombycinum tetan refert. Virid. alba, lata, crassa, multorum stratorum, adulta for-
dide flava.
4. *canaliculata*. C. filament. æqualibus, basi versus ramosiori-
bus (intricatis, fascis). *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 15.*
In Europæ rivalis, canalibus &c.
Obscure virens, subnitida. Ramuli primum her-
bacei; per siccitatem veluti lapidei. Substan-
tia mollis, spongiota, velutinum pannum re-
ferens. Filam. 1-2. unc. longa, tenuia, api-
ce integro, aut subramoso.
5. *amphibia*. C. filament. æqualibus, ramosis, exsiccatione
coeuntibus in aculeos. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 17.*
In Europæ udis, fossis umbrosis.
Obscure virid. supra reticulata. Fibræ rigidulæ,
intertextæ in formam spongiæ, tenuissimæ,
repentes, terræ dense infiltræ, virid.
6. *litoralis*. C. filament. æqualibus, ramosissim. elongatis,
scabriuscul. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 19.*
In Europæ marinis rupibus.
Filam. longitudine palm-dodrant-pedali, col. ex
luteo-viridi. Substantia mollis, & tenera.
7. *æruginea*. C. filament. ramosis, mollibus, digito brevior-
ibus, viridissim. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 20.*
In Anglia foliata: in mari Adriatico &c.
Ex cœruleo-virid. Rami ramosi.
8. *dichotoma*. C. filament. æqualibus, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 3. f. 9.*
In Angliæ fossis pratorum.
Obscure virid: Fila pedalia in ramos longos di-
visa, & subdivisa. Geniculi incrassati, rubri,
sæpe piliferi.
9. *scoparia*. C. filament. fastigiatis, proliferis, hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 23.*

In mari Europæo.

Rami ramulosi, undiq. sparsi, villosi, hirsuti, denticulati. Racens obscure viridi: sicca col. nunc pullo, nunc rubiginoso. *Caudam vulpinam refert.*

10. *sancillata*. C. filis ramosis; filamentis alternis, brevibus, multipartitis, digitatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 22.*

In mari Europæo.

Color sordide pallens. Surculi nervosi, ramosi. Filam. lateralibus quasi intra totidem vesiculas aerem recondunt.

*** *Filamentis anastomosantibus.*

11. *reticulata*. C. filament. reticulato-coadunatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 4. f. 14. Pluk. alm. tab. 24. f. 2. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 4. Muscus &c. Loef. pruss. tab. 54.*

In Europæ fluviiis, ad eorum litora.

Substantia tenera, e viridi-sublutea, reticulum referens, areolis 4-5. angulis. Sericea, & splendens, sæpe natans.

**** *Filamentis nodosis.*

12. *fluvialis*. C. filis simplicissimis, setiformibus, rectis: geniculis crassioribus, angulatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 7. f. 47. 48.*

In Europæ fluviiis confluentibus.

Filam. digital-palmar. capillacea, super. angustiora, internodiis oblongis ad instar *Equiseti*, col. obscure, & fusco-purpurea.

13. *gelatinosa*. C. filis ramosis, moniliformibus: articul. globosis; gelatinosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 7. f. 42. 43. an 44. 45. 46? E. N. C. cent. 5. app. 60. tab. 13. f. 3.*

Corallina &c. Vaill. paris. tab. 7. f. 6.

Chara &c. Weis. crypt. 33. fig. C.

In Europæ fontibus limpidis.

Tota planta substantia est gelatinosa. *Var. col. viridi, rubro, cærul. luteo, nigro.*

Cespitosa, tremula, ramosa; lapides, & alveos obducens. Globuli sunt crassiori filo coniuncti.

***** *Filament. geniculatis.*

14. *capillaris*. C. filis geniculatis, simplicibus: articulis alternatim compressis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 5. f. 25. Pluk. alm. tab. 84. f. 9. Morif. hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 3.*
In Europæ lacubus, stagnis, fossis.
 Filiform. hyalina, geniculis atro-viridibus intercepta. Fila prælonga, invicem implexa, & varie contorta.
15. *corallina*. C. filis geniculatis, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 6. f. 36. an f. 37?*
In mari Europæo.
 Substantia lubrica, fugax, col. nunc albente, nunc eleganter rubente. Fila ramosa, compressa, articulata, pellucida: articuli fascia rufa, opaca.
16. *catenata*. C. filis geniculatis: articulis cylindricis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 5. f. 27.*
In mari Europam austral. & Americam meridional. alluente.
 Color obscure viridis. Filam. ramosa, crassiuscula, geniculis oblongis, vulgarium catenarum articulos referentibus, alter nempe latiore, alter, qui huic imponitur, angustior, & compressam partem monstrat.
17. *polymorpha*. C. filamentis geniculatis; ramis fascicularis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. angl. 1767. vol. 57. tab. 18. Fl. Dan. tab. 395. fig. A. B. Dill. musc. tab. 6. f. 35. a. b. c.*
Corallina &c. Pluk. alm. tab. 47. f. 10.
Muscus &c. Bocc. musc. 1. tab. 5. f. 11. musc. tab. 7. f. 1.
Fucus &c. Barr. rar. tab. 1301.
In mari Europæo.
 Primum rubens, dein fusca, tandem nigrescit, & aliam figuram induit. Primo radii undiq. sparsi, & valde divisi; dein infer. filamenta cadunt: cætera, quæ remanent, *Palma* instar congesta, & expansa: per ætatem duriuscula evadens, *Fuci speciem refert.*
18. *vagabunda*. C. filamentis geniculatis, flexuosis; ramis, ramulisque brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 5. f. 32.*
In mari Europæo.
 Libera vagatur in medio aquarum, velleris in-

flar expansa, valde ramosa, col. pallide viridi.

19. *glomerata*. C. filament. geniculatis; ramulis brevioribus, multifidis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 651. f. 2. Dill. musc. tab. 5. f. 31. & f. 28. 29. Moris hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 2.*

In Europæ fontibus, fiffis, rivulis.

Varie ludit. In glomeres est congesta col. luteo, vel obscure viridi; palmar-ped. & ultra. Sicca pilinatam fig. refert.

20. *rupestris*. C. filament. ramosissim. geniculatis, viridibus. *Syst. veg. ed. 14. Ginn. norv. 2. tab. 3. f. 3. Dill. musc. tab. 5. f. 29. Pluk. mant. tab. 182. f. 6.*

In Europæ marinis rupibus copiosa.

Rami crebri, subplumosi.

21. *agragropila*. C. filament. ramosissim. geniculatis, e centro confertissimis, globum constituentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sverig &c. lacubus.

Ex æt. spherica, magnitudine *Nucis juglandis*.

- abbreviata*. C. palust. filament. brevioribus, & crassioribus. *Schreb. Lipf. Dill. musc. tab. 3. f. 20.*

In fiffis.

- navicularis*. C. seticulata, ramis lateralibus, simplicibus, congestis; primordialibus convolutis. *Neck. musc. Dill. musc. tab. 5. f. 3.*

Habitat

Palmar-setquiped. late virid. Filam. tenuissima. Ramuli ex utroq. latere virgulam simulant.

- plana*. C. frondibus compressis, rubro-violaceis; ramis confertis, distichis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Digiti longitudine. Frond. coacervatæ, membranæ. Caul. maj. longitudine magni fili, coriacei. Rami pollicar. ramulosi.

- seticulosa*. C. caulibus teretibus, ramosis, viridibus: seticulis sparsis, numerosis. *Forsk. Æg.*

In Arabia aqua marina.

Caul. spitham. pellucidi. *Aliquantum differt a fig. Dill. musc. tab. 4. f. 15.*

- thermalis*. C. *Forsk. Æg.*

In thermis Arabia.

- ramosissima*. C. filament. fuscis, duriuscul. non articulatis, ramolissim. ramorum apicibus multifidis. Scop. Fl. Carn. Dill. musc. tab. 5.
In litoribus maris.
Planta refert agmen radicularum.
- filiformis*. C. filo simpliciss. articulato; articulis brevibus, cylindricis. Scop. Fl. Carn.
In litoribus maris.
C. capillaris Lin. habet articulos alterne compressos; & habitat in aquis dulcibus.
- nodosa*. C. dura, ramosa, fusca, articulis oblongis, in medio crassioribus. Scop. Fl. Carn.
In litoribus maris, cum prioribus.
Fuso accedit; & diversis. C. Dill. musc. 40. 41. quibus articuli rotundi.
- paniculacea*. C. filamentis æqualibus, ramosissimis; ramis, ramulisque longissimis, sparsis. Hudf. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Dill. musc. tab. 2. f. 8.
In rupibus maris Nicænsis.
- tomentosa*. C. filamentis æqualibus, ramosissimis, ramis simplicibus, confertis, fuscis. Hudf. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Dill. musc. tab. 3. f. 12.
Ad litus maris Nicænsis.
- elongata*. C. filamentis, geniculatis, ramosissimis; ramulis longissimis, distantibus, acutis. Hudf. Fl. Angl. All. Fl. Ped. Dill. musc. tab. 6. f. 38.
In litore Nicænsi &c.
- fusca*. C. filamentis geniculatis, ramosissimis; ramulis alterne simplicibus. Hudf. Fl. Angl. All. Fl. Ped.
In litore Nicænsi &c.
C. purpurea, aquis innatans. Hall. helv. n. 2109.
Super stagna aquarum.
Læte purpurea, ramosa, & non ramosa.
C. globosa, gelatinosa. Hall. helv. n. 2110.
In Helvetia.
In fundo purissimorum fontium globuli fere pollic. diametri, racemosi, aqua graviores.
C. crustacea, gelatinosa. Hall. helv. n. 2111.
Ex alveis lignis aquas salvas susipientibus, quæ de spinis stillat.
Latissime effruserunt, cum primum aquæ in eos alveos immixta fuissent; crustæ manu amplio-

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

res, aliquot linearum crassitie, gelatinosæ, polline violac.

C. natabilis, tenuissima, Iridis coloribus. Hall. helv. n. 2112.

In Helvetia.

Pollen in crustas latas diffusus, aquis stagnantibus innatans; col. eximo flavo, tunc aureo, inde rubro, porro cœruleo, centro sordide viridi.

C. filament. simpliciss. duriusculis. Hall. helv. n. 2116. Mich. gen. tab. 89. f. 6. Dill. musc. tab. 2. f. 2.

In Helvetia &c.

Fasciculos, & crustas facit. Fila pedalia, viridia; nitida; per siccitatem alba.

C. crusta &c. pilis planis stipatis. Hall. helv. n. 2121.

In Helvetia.

Pellis est rhomboideis nigris lineis varia, cæterum alba, parum crassa, tonta quasi, & artificiosa, inferne sublivide viridis.

C. filis crassiuscul. rigidioribus, subarticulatis. Hall. helv. n. 2122. Dill. tab. 4. f. 16. & 5. fig. 25. non differre videtur.

In rivis puris.

Tactu aspera, filament. longiusculis intextis, pallidis, subtuteis, ramosis.

C. coriacea, obscura. Hall. helv. n. 2123. Dill. tab. 10. f. 17.

In Helvetia.

Crusta nigerrima, corii similis, pene lineam crassa, in aqua mollescens, & demum longo tempore in fila discedens, nigra, sed alternis tamen pellucidis, & fuscis sedibus varia.

1434. **BYS-** Lanugo, aut pulvis simplicissim: vel filamentum
SUS. simplex, enode.

* *Filamentosa.*

1. *septica.* *B. capillacea, mollissima, paralella, fragilissima, pallida. Syst. veg. ed. 14.*

In domibus, sub pavimentis.

Simil. lanæ tenuissimæ gossypinæ, longitudinaliter contextæ filis araneorum tenuioribus, albidocinerascentibus, non tenacibus, lævissimis, fomitis instar accensibilibus.

Mucoris septici pessima furor, corrodens, tamquam menstruus, aere mephitico domos ligneas, durissimosq. truncos. Variet. Agriici.

2. *Flos aquæ*. B. filament. plumosis, natantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

b. *Dill. musc. tab. 1. f. 1.*

In mari, & omni aqua, verno tempore, & prima aestate: nocte descendit parum; die natat fere.

Constat farina, cuius moleculæ, *Conservæ* instar, capillares, ramosæ, mollissimæ, plumæ simil. omni gossypio tenuiores, nivæ, lineæ vix longiores.

Per nonnullos auctores non est planta, sed congeries e particulis plantarum aquaticarum, putredine destructarum.

3. *cancellata*. B. filis exacte undiq. cancellata. *Syst. veg. ed. 14. Lederm. micr. tab. 72.*

In aquis dulcibus.

Natans tamquam mucor virescenti-luteus.

4. *phosphorea*. B. lanuginosa, violac. lignis adnascens. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 1. f. 6.*

In Europæ lignis putrescentibus.

Gelatinam refert. Primo lanuginosa, tenerrima, brevis, surrecta, ex violaceo-albicans, dein crustæ subtilis instar adparet, & tunc fusco-violacea.

5. *velutina*. B. capillacea, viridis; filamentis (vix conspicuis) ramosis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 1. f. 14. Mich. gen. tab. 89. f. 3.*

In terra, & ad muros septentrioni expositos.

Holosericeum viride, Tapeti instar, terram argillolam tegens, & arborum cortices, virore suo oculos afficiens.

6. *aurea*. B. capillacea, pulverulenta; fructificationibus sparsis; filamentis simplicibus, ramosisque. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 718. f. 1. Dill. musc. tab. 1. f. 16. Pet. gaz. 1. tab. 13. Mich. gen. tab. 89. f. 2.*

In rupibus Italiae, Arvonie, & supra lapides.

In recenti color croceus; in sicca cinereus. Planta miniata, filis brevissimis, ut velleris cuiusdam tenerrimi substantiam referat. Pulvilli convexi.

7. *cryptarum*. B. capillacea, perennis, cinerea, tenax, rupi innata. *Syst. veg. ed. 14.*

In spelunca rupestri Medelpadiæ.

** *Pulverulenta.*

8. *antiquitatis*. B. pulverulenta, atra. *Syst. veg. ed. 14. Dill. musc. tab. 1. f. 18.*
In muris antiquis.
 Fila tenuissima, tecta pulvere atro, quæ late per cinereum lapidem disperguntur.
9. *saxatilis*. B. pulverulenta, cinerea, rupe operiens. *Syst. veg. ed. 14.*
In omni saxo, diutius acri exposito.
 Nudis saxis tenacibus adhæret, col. cinereo.
10. *jolithus*. B. pulverulenta, sanguinea, saxis innascens. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 89. f. 3. Fl. Dan. tab. 899. f. 1.*
In Europæ frigidiæ sive opacis, supra fixa.
 Crusta minima, odore *Violæ maritæ*; junior ruberrima; adulta luteo-virens.
11. *candelaris*. B. pulverulenta, flava. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 899. f. 2. Dill. musc. tab. 1. f. 4.*
In toto orbe; in corticibus arborum, particulis vetustis, tectis vento humido expulsiis.
 Acevi sunt informis pollinis. *Var. ochroleuca.*
Speçt. ad Lichenes.
12. *botryoides*. B. pulverulenta, viridis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 899. f. 3. Dill. musc. tab. 1. f. 5.*
In terra drutius humida, umbrosa, ut in ollis Hortulanorum.
 Crusta glebosa, subsæpera, viridis, admixta quandoq. flavedine. *Speçt. ad Tremulas.*
13. *incana*. B. pulverulenta, incana, farinæ mitis strata (glebis difformibus). *Syst. veg. ed. 14.*
In solo glauco, ad latera fossularum, iuxta vias publicas.
 Crusta lata, farinosa, friabilis, col. albo, vel cinereo-glauco, quandoq. flavo-virescente. *Speçt. ad Lichenes.*
14. *lætea*. B. pulverulento-crustacea, albißima. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 840. f. 4. Dill. musc. tab. 1. f. 2.*
In Muscis, & arborum corticibus.
 Crusta globulis minutissimis undiq. referta, calcis mista *Mycus*, & arborum cortices invadens.

- æruginea*. B. *Weis. crypt. Dill. musc. tab. 1. f. 7.*
In truncis.
Dignoscatur col. eleganter viridi, ærugini simili.
 Crusta tenuissima, tam arcte adhærens truncis
 cæcis, ut niti lenis ope, minutissimo pul-
 vere distinguatur.
- cellaris*. B. *Weis. crypt. Dill. musc. tab. 1. f. 9.*
In cellis, & ad vasa lignea, in locis humidis.
 Tenerrima, his telæ Araneæ similis, 1-2-pol-
 lic. col. nivei, latos tractus investiens. Fila sub-
 uncial. simplicia, aggregata, hinc inde ex-
 pansa. Levissimo attactu facillime destruitur.
- doliaris*. B. *tenerrima, murina, doliaris. Dill. musc. tab.*
1. f. 12.
In cellis vinariis.
 Lanuga alba, dein aurea, deniq. fulva, doliis
 vini innascens.
- coccinea*. B. *caespitulis rotundis, parvis, coccineo col. ele-*
gantissime tinctis. Scop. Fl. Carn.
In Cannis marinis, udo loco vitatis.
 Filamenta plerumq. ramola, structura tenerri-
 ma.
- miniata*. B. *Scop. Fl. Carn.*
In Caseo ovino.
 Structura B. aurei, sed color Minii.
- coriacea*. B. *perennis, densissima, albicans. Schreb. Lips.*
Mich. gen. tab. 90. f. 6. Dill. musc. tab. 1.
f. 13.
In Quercubus anthesis.
 Planta ochroleuca, corio subtiliori, tenuiq. si-
 milis, e fibris capillaribus, lubrissimis, den-
 se intertextis.
 B. *nigra, vellutina. Hall. helv. n. 2104. Dill.*
musc. t. b. 1. f. 18.
In rupibus.
 Pulvillos format, ambitu pollic. pannum veluti-
 num atrum referentes.
 B. *cœrulea, caespitosa, crispa. Hall. helv. n.*
2102. Mich. gen. t. b. 90. f. 8.
In lapideis derelicta.
 Filamenta maiuscula, curva, & crispa, latos
 caespites f. bul. sarum rupium obducunt.
 B. *spadicea, crispa. Hall. helv. n. 2103. Mich.*
gen. tab. 90. f. 4.
Ad lapides jabulosos.

Mollities lanæ: color spadiceus.

B. rupestris aurantiaca. Hall. *helv.* n. 2105.
In Helvetia.

Silvæ fol. Aurantiorum, distinctissimorum, quasi crinium vomeres, non cespitosorum.

B. longissima, filament. cervinis, ramosis. Hall. *helv.* n. 2107.

In Fungis putridis.

Serici similis, filis duriuscul. in aquosam tamen molliem degenerantibus, ramosis. Uncialis, subspadicea.

F U N G I.

1435. AGARICUS. **F**ungus horizontalis, pileatus, orbiculatus, vel dimidiatus, pileo subtus lamellato; stipitatus, raro sessilis.

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

1. *Cantharellus*. A. stipitatus; lamellis ramosis, decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 264. Schaff. fung. tab. 82.*

Fungus &c. *Vaill. parif. tab. 12. f. 9. 10. b. f. 12. 13. 7. fig. 14. 15.*

In pratis, & ad oras sylvarum in collibus &c.

Color unliq. flavus, odore grato *Prunorum*. Junior stipite, & pileolo orbiculari, in medio depresso: adultior ora undulata, & crispa. Stipes brevis. Pilei lamellæ crassæ, ab ipsa substantia fungi non distinctæ.

Elulis; sed coctura, & condimentis vite paratur; alius tormina, & diarrhas excitat.

2. *quinquepartitus*. A. stipitatus; pileo 5 part. subflavescente; lamellis albidioribus, interne dentato-connexis. *Syst. veg. ed. 14.*

In pratis.

Stipes oblongus, cylindricus. Pileus planiuscul. umbilico prominulo.

3. *integer*. A. stipitatus; lamellis omnibus magnitudine æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

A. roseus. Schaff. tab. 75. *crassipes* tab. 87. 88. *ruber*

ruber: tab. 92. *cynoxanthus* tab. 93. *virescens* tab. 94 *huius* varietat.

A. rufula. Schæff. fung. tab. 38.

A. maior &c. Buxb. cent. tab. 19.

In sylvis apricis, & gaudet arborum umbra.

Stipes humilis, non bulbosus, farctus, albus.

Pileus usque 4-unc. pulvinatus, ad oras rugosus, striatus; plerumq. albo-roseus, vel violac. puniceus, sanguineus, cœrul. viridis, flavus, leoninus, ochroleucus, terreus. Lamellæ albæ: adultæ flavescunt. *Caro acris, sed edulis.*

4. *muscarius*. *A. stipitatus*; lamellis dinidiato-solitariis: stipite volutato; apice dilatato; basi ovato *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 78. f. 2. Schæff. fung. tab. 27. & 28. var. absque verrucis tab. 214. 215. Clus. hist. 2. p. 280. 12. n. 4.*

Vulgo Uovolo, o uocco malefico.

In pratib.

Stipes crassus, albus, anulo membranaceo. Pileus amplus, campanulatus, inde planus, minimatus, verrucosus. Verrucæ, & lamellæ albæ. *Caro flavescens. Noxius.*

Cimices necat, & eradicat promptissime.

5. *dentatus*. *A. stipitatus*; pileo convexo; lamellis basi mucrone dentatis. *Syst. veg. ed. 14.*
A. psittacinus. Schæff. fung. tab. 301. coccineus. tab. 302.

In sylvis.

Pileus flavescens, lævis, non rimosus, subviscidus. Lamellæ firinacæ, basi a stipite distidentes, ubi denticulo acuminato instructæ. Stipes cylindricus, fistulosus, angustus, nudus, confestim natus, versus pileum striatus, col. pilei.

6. *deliciosus*. *A. stipitatus*; pileo testaceo, succo lutescente. *Syst. veg. ed. 14. Schæff. fung. tab. 11.*

Omphalomyces &c. Batt. tab. 16. H.

In montibus sterilibus sylvestris.

Stipes 2-unc. col. lateritii. Pileus orbiculatus; junior ochroleucus, flavus, vel ex imbricato-viridis; tandem spadiceus, & umbrinus. Lamellæ flavæ, vel cineræ. *Gustus suavis.*

7. *lactifluus*. *A. stipitatus*; pileo plano, carneo, lactescente; lamellis rufis: stipit. longo, carneo (lacte

croceo). *Syst. veg. ed. 14. Schaff. fung. tab. 3.*

In sylvis, & locis humidis sub arboribus, æstivo tempore.

Edulis.

8. *piperatus*. A. stipitatus; pileo planiusculo, lactescente; margine deflexo; lamellis incarnato-pallidis. *Syst. veg. ed. 14. Schaff. Fung. tab. 83.*

In pascuis, sylvis.

Albus, dein cervinus, rufus, castaneus. Stipes cylindric. nudus. Pileus magnus, villis pubescens. *Noxius.*

9. *campestris*. A. stipitatus; pileo convexo, squamato, albido; lamellis rufis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 714. Schaff. fung. tab. 33. 310. 311. Bosarra fung. tab. 7. A.*

In pratibus collinis.

Fungus magnus. Stipes brevis, anulatus. Pileus primo ovatus, dein convexus, tandem planus; & tunc lamellæ rubescentes. *Edulis.* *Multiformis: iunior totus albus, anulo amplo membranæ.*

10. *Georgii*. A. stipitatus; pileo flavo, convexo (oris striatis, & lanuginosis): lamellis albis. *Syst. veg. ed. 14.*

Fungus &c. *Sterb. tab. 11. f. 3. Bauh. hist. 3. p. 824. Schaff. fung. tab. 35.*

In sylvis apricis montanis, & collinis.

Stipes brevis, crassus, villosus. Pileus 4-unc. latus, flavus. Lamellæ albæ. *Edulis. Adultus ex flavo-ovulchre rubet.*

11. *violaceus*. A. stipitatus; pileo rimoso, margine violaceo, tomentoso: stipite cærulescente, lana ferruginea (iuniore bulbo, anulato). *Syst. veg. ed. 14. Schaff. fung. tab. 3. cærulescens tab. 34. amethystinus tab. 36.*

Fungus &c. *Mich. gen. tab. 74. f. 1. Buxb. cent. 4. tab. 11. 22.*

Vulgo *Grumato.*

Ad margines sylvarum.

Stipes brevis, crassus. Pileus amplus, ad pedem utque latus, primum pulvinatus, mox concavus, margine subreflexo, quandoq. terreus. Lamellæ albæ. *Edulis.*

12. *cinnamomeus*. A. stipitatus; pileo sordide flavo: lamellis luteo-rufis (stipite anulo araneoso). *Syst. veg. ed. 14.*

In sylvis.

Stipes quandq; albidus terreus, cinnamomeus, Pileus convexus, aut planus.

13. *aurantiacus*. A. stipitatus; pileo supra aurantiaco; lamellis teneris ex aurantiaco-rubris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. tab. 14. f. 3.*

Habitat

Facies A. *cantharelli*, sed natura diversa. Illi caro copiosa, firma; lamellæ crassiuscul. costatum instar, parciore, & plerumq; irregular. tori fungo concolores: huic nostro contra caro paucissima; pileus, & lamellæ regulares, copiosiss. teneræ, tenues, aurantiaco-rubrae. Ille habet stipitem pileo continuum, crassiuscul. plerumq; diametro pilei longo em, copiosa carne fectus: at stipis noster gracilis, exsuccus, nec tamen fistulosus, vix unquam diametrum pilei æquans, potius lamellis, quam pileo concolor. Stipes raro pollic. excedit, gracilis, teres, æquabilis, fectus, exsuccus, tandem ex aurantiaco-ruber, volva, & anulo destitutus. Pileus primum convexus, tum orbicularis, planiusculus, denique umbilicatus, exsuccus, carne vix ulla, glaber, aurantiacus, ætate dilute pallescens. Lamellæ confertæ, papyraceæ, teneræ, bis, terve dichotomæ ex aurantiaco rubrae, persistentes.

14. *sanguineus*. A. stipitatus, sanguineo-ruber, unicolor; anulo araneoso, fugaci, aurantiaco. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 15. f. 3.*

Habitat

Speciosus, totus extus saturæ ruber, pileo, lamellis, stipite. Primum sit exiguus. Pileus convexus, integerr. glaber, segmentum sphaeræ refert, diametri, in maximis, semi-altiusve pollic. primum peripheria ad stipitem anulo araneoso aurantiaco contract; dein fugax hic anulus evanescit. Lamellæ integræ, dimidiatæq; coloris intensioris. Stip. cylindricus, æquabilis, fectus, non fistulosus, sub pileo primum aurantiaco-sericeis filis præditus

ex dilacerato, araneoso anulo. Bulbus radicis nullus, nec volva. Caro non copiosa, eaq. sicca, col. rubro-aurantiaci, Vetulus trilem col. induit. *Non edulis.*

15. *viscidus*. A. stipitatus; pileo purpurascens-fusco, viscido; lamellis fulco-purpurascens. *Syst. veg. ed. 14.*

In sylvis.

Stipes 2-3-unc. ex rufo, & fusco pallidus. Pileus 2-4-unc. latus, orbicular. planus, col. obscuriore. Lamellæ rufæ.

16. *equestris*. A. stipitatus; pileo pallido; disco stellatim luteo; lamellis sulphureis. *Syst. veg. ed. 14.*

In pascuis, sylvis montanis.

Stipes 3-4-unc. albus. Pileus margine inflexo.

17. *mammosus*. A. stipitatus; pileo convexo, acuminato, griseo; lamellis convexis, griseis, crenatis: stipite nudo. *Syst. veg. ed. 14.*

Fungus &c. *Buxb. cent. 4. tab. 21. f. 1.*

In sylvis.

Stipes subpalm. striatus, hirsutus, obscure fulvus. Pileus ad unum latum plerumq. inclinat, e cinereo-obscure fulvescens.

18. *clypeatus*. A. stipitatus; pileo (primum) hemisphærico, viscido, acuminato, lamellis albis: stipite longo, cylindrico, anulato, albo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 772. Schaeff. fung. tab. 22. 23.*

In pratis sylvaticis.

Stipes inferne tumidus, quasi bulbosus, cavus, etiam ped. maculis spadiceis, anulo crasso. Pileus primo globosus, inde conicus, deniq. planus, amplus, etiam albus, lacerus, squamis ex ruto-fuscis. Lamellæ per ætatem flavescens.

19. *virginus*. A. stipitatus, niveus; pileo hemisphærico; lamellis arcuatim per stipitem decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 15. f. 1.*

Habitat . . .

Totus candidus ut cera virgo, lævis, opacus, post pluviam illico pelluciditate vitri, non tamen viscidus, carne præca, firma, sicca. Stip. 1-tesquipoll. cylindricus, fortis, lævis, anulo, volvaq. destitutus. Pileus hemisphæricus, integer, post pluvias planus, aut umbilica-

tus. Lamellæ firmæ, laxiusculæ, integræ, & dimidiatæ, a peripheria pilei per arcum in stipitem defluentes, saporis, & odoris experts.

20. *ceraceus*. A. stipitatus; pileo hemisphærico, stipiteq. sub-bifistuloso, flavis; lamellis aquosæ luteolis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 15. f. 2.*

Habitat

Stip. subpollic. cylindricus, æquabilis, crassiusculus, sature flavus, copiosiore, & concol. carne præditus, fistulosus, sed non factus, anulo, volvaq. destitutus, superficie sicca, non viscosa. Pileus hemisphæricus, siccus, lævis, nec viscosus, & striatus, sature flavus, carne concolore. Lamellæ satis distitæ, tenues, integræ, dimidiatæq. col. pallide luteoli. *Accedit A. coccineo. Non edulis.*

21. *coccineus*. A. stipitatus, pileo hemisphærico, stipiteq. sub-bifistuloso, coccineis; lamellis aurantiacis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. Schæff. fung. tab. 302.*

Habitat

Stip. fere 2-pollic. cylindricus, æquabilis, crassiusculus, carnosus, fistulosus, anulo, volvaq. destitutus, intus aurantiacus, extus coccineus, in senio flavus. Pileus hemisphæricus, tandem flavescens, siccus, nec viscosus, aut striatus, carne pauca, aurantiaca. Lamellæ diffusæ, profundæ, tenues, integræ cum dimidiatis alternantes, primum ex albo-flavescent. tandem aurantiacæ. *Non edulis.*

22. *extinctori-us*. A. stipitatus; pileo campaniformi albido, lacte-ro; lamellis niveis; stipite subbulbofo, subulato, nudo. *Syst. veg. ed. 14.*

Fungus &c. *Buxb. cent. 4. tab. 30. f. 2.*

In fimetis, & ad pagos.

Planta tenera. Stipes 4-unc. inferius flavescens-niger; superius flavus.

23. *crinitus*. A. stipitatus; pileo infundibuliformi piloso; lamellis æqualibus; stipite filiformi. *Syst. veg. ed. 14. Pocellaria &c. Brown. Jam. tab. 15. f. 1.*

Fungoides &c. *Plum. sp. 14. filic. tab. 227. fig. B. In Amer. merid.*

Purpur. Stipes lævis, crassitie pennæ. Pileus cavus, margine revolutus. Lamellæ tenuissimæ.

24. *finetarius*. A. stipitatus; pileo campanulato, lacero (cinereo); lamellis nigris, lateraliter flexuosis: stipite fistuloso. *Syst. veg. ed. 14. Schmid. ic. tab. 10 Fl. Dan. f. sc. 14. tab. 834. Schaeff. fung. tab. 7. v. 46 47.*

Fungus &c. *Mich. gen. tab. 80. f. 3 & tab. 74. f. 6. Sterb. fung. tab. 22. fig. 1. K. L. Buxb. cons. 4. tab. 27. f. 1.*

Fungorum &c. *genus 14. sp. 3. Clus. hist. 2. p. 282.*

In finetis.

Gregarius nascitur: junior ovi fig. refert. Stipes longus, fistulosus, villo farinaceo tectus, tandem terreus, & spadiceus. Pileus junior floccis lanuginosis hirtus; adultior secedit a petiolo, & tunc campanulatus. *Noxus.*

25. *campanulatus*. A. stipitatus; pileo campanulato, striato, pellucido (murino); lamellis adscendentibus, cinereis: stipite longo, nudo. *Syst. veg. ed. 14.*

Fungus &c. *Vaill. parif. tab. 12. f. 1. 2.*

In pratis.

Stipes brevis, crassus. Pileus circinnatus, 3-unc. latus.

26. *allianus*. A. stipitatus; pileo convexo, opaco, supra fusco, subtus albo: stipite fistuloso, nigro, nudo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 82.*

Habitat . . .

Variet prioris. Fætor Allii. Stipes rectus, semiped. intus sordide pallens. Lamellæ patentes.

27. *separatus*. A. stipitatus, pileo lævi, albo-livido; lamellis separatis, nigricantibus: stipite bulboso, volvato. *Syst. veg. ed. 14.*

In stercoreis.

Stipes longus, cylindricus, pallidus. Pileus patens.

28. *fragilis*. A. stipitatus; pileo convexo, viscido, pellucido; lamellisq. luteis: stipite nudo (procero, gracili). *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 230.*

Fungus &c. *Vaill. parif. tab. 11. f. 16. 17. 18.*

Ad ambulacra, & ligna putrida.

Stipes rectus, vel curvatus. Fungus flavo-cinnameus.

29. *esulentus*. A. stipitatus; pileo convexo, argillaceo: stipite gracili, fistuloso, ex albo-sordide flavescente:

lamellis albis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 14. f. 4.*

Habitat

Stip. plerumq. pollic. etiam brevior, gracilis, teres, æquabilis, nitulosus, albo-ford-de-flavens, tandem fuscescens, anulo, volvaq. destitutus. Pileus hemisphæricus, convexus, carne vix ulla, eaq. alba; in senio pliniatulus, extus flavescens, tandem ex nigro-fuscesc. nudus, epidermide sicca, lævi, ad peripheriam per exsiccationem substriata. Lamellæ albæ, tenues.

Videtur Schæff. tab. 39. Ratione nominis vulgaris, & quod sit edulis, videtur qui apud Lin. A. clavus dicitur, sed obstat fig. Vullantū; & quod stipitem dicitur sacrum.

30. *muscoïdes*. A. stipitatus, cinereus; pileo pulvinato, umbilico prominente, oris inflexis, & integris: lamellis albis, adscendentibus, bis, terq. dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 16. f. 1.*

Habitat

Multiplex. *Stip.* etiam 3-pollic. cylindricus, æquabilis, diamet. 1-2-lin. fæctus, siccissim. lævis, aquose cinereus, nec bulbosus, nec anulatus, nec volvarus, neque squamosus. Pileus primum diamet. 2 3 lin. pulvinatus, cum umbilico prominente, & acuriusculo, oris peripheriæ deorsum revoluti-inflexis, integerr. siccus, cinereus, lævis; tum planus, circularis, umbilico tamen nonnihil preuberante; tandem infundibulif. & tunc cinereo-fuscesc. Lamellæ semper albæ in senio, bis, terve dichotomæ. Caro perpauca, sicca, alba. *Non edulis.*

31. *umbelliferus*. A. stipitatus; pileo convexo, plicato, membranac. lamellis remotis, basi latioribus: (stipite procero, capillaceo, nudo). *Syst. veg. ed. 14. Schæff. fung. tab. 309.*

Fungus 8cc. *Mich. gen. tab. 80. f. 11. Buxd. Cent. 4. tab. 32. f. 3.*

Inter fol. cungetta, semipatrida.

Parvulus, corruptibilis, tener, albus, corticinus. Pileus *Cannabis* sem. vix maior.

32. *androsace*. A. stipitatus, albus; pileo convexo, plicato, membranaceo; (Lamellis remotis) stipite nigro, procero, capillac. nudo. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 239.*
Fungus &c. *Bucc. mur. tab. 104. Vaill. paris. tab. 11. f. 21. 22. 23.*
In fol. deciduis Pini, Abiegnis, & lignis putridis.
Stip. uncial. capillar., atro-rubens, aut nericus.
Pileus non maior Lente, exsuccus, umbilicatus, vertice obscuriore. Lamellæ tenuissimæ.
33. *clavus*. A. stipitatus; pileo luteo, convexo, striato: lamellis, stipiteque albis. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. t. b. 59.*
Fungus &c. *Vaill. paris. tab. 11. f. 19. 20.*
In nemoribus, inter fol. decidua.
Stipes vix unc. curvulus. Pileol. 3 linear. circa stipitem contractus, ut clavorum c. pira.
34. *niveus*. A. stipitatus, totus niveus; pileo dimidiato, glabro: stipite brevi, ad basin hirsuto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 288.*
Lignis putridis parasiticus.
Totus unicolor, lacteus, tenellus. Stipes brevissim. ore inflexo. Pileus pellucidus. Lamellæ lacteæ, dein modice sordentes.
35. *ostreatus*. A. stipitatus? pileis dimidiatis, imbricatis: stipitibus in unum corpus concretis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 204.*
In putrescentibus arboribus, potissimum Juglandis.
Fungus edulis, odoratus, f. re insipidus. Stipites parvi, aut nulli. Pilei multi, ostreatum valvis similes, magnitudine varii, convexi, integerrimi, sibi mutuo imbricatum incumbentes, in verticis postica parte nivei, cæterum superne leucophæi, senescendo fusci, inferne lamellis albis, intus nivei.
- ** Parasitici, acaules, dimidiati.
36. *quercinas*. A. acaul. lamellis laticrinthiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 57. Batarr. fung. tab. 38. fig. A. Buxb. vent. 3. tab. 4. f. 1.*
In Quercubus &c.
Siccus, & imman. escibilis. Facies semicircularis, convexa, hirsuta, col. vario, alba, ochroleuca, virid. purpurasc.
- Ad escum parandum pro conciplendo igne adhibetur.*

37. *betulinus*. A. acaul. coriaceus, villosus, margine obtuso; lamellis remotis, anastomosantibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 7-6. f. 1.*

In Betulis, & truncis arborum emortuarum.

Tremulus, & mollis. Vx carnosus, zonis variis albus, subtus croceus, aut miniatus, vel leoninus. Lamellæ firmæ, inter se connexæ.

38. *alneus*. A. acaul. coriaceus, villosus: lamellis bifid. pulverulentis. *Sylt. veg. ed. 14. Weig. Obi. 41. tab. 2. f. 6. Batarr. fung. tab. 38. f. D. An Schreff. fung. tab. 246?*

Alne truncis insidet.

Nuce Juglandis raro maior, lobatus, fig. semi-elliptica, superne convexus, albido-cinereus. Laminæ cineræ, subviolac.

39. *ochraceus*. A. acaul. flabelliform. supra pulvinatus, ochraceus; lamellis albidis, margine cinerascens. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 16. f. 2.*

Habitat . . .

Esti parasiticus, tamen substantiæ non coriaceæ, aut semiligneæ, uti pleriq. congeneres, verum fungosæ. Squamæ, seu laminæ simplic. aggregatæ, horizonti parallelæ, sessil. oblong. flabellifor. obovatæ, versus basin contractæ in brevem, & crassum petiolum, in quem subtus lamellæ omnes convergunt. Pars super. convexa, glabra, lævis, pellucida, subtiliss. nec villata, in squamulas tamen furfuraceas diffrumenda, obducta, col. tristè flaventis. Caro copiosa, fungosa, alba. Lamellæ non coriaceæ, nec rigidæ, sed tenues, molles, albidæ, ora cinerascens. *Non edulis.*

- myctenterus*. A. *Pall. it. 1.*

In Duuria.

Mediocris, fugacissim: Stipes sesquipollic. filiform. nudus, cinereo-albidus. Pileus tenuis, planiuscul. supra nigerrim. convexus, centro impresso, margine integro, expl. nudo. Lamellæ tenues, latæ, inæquales, cinereo-albidæ.

- bulbosus*. A. *Pall. it. 1. tab. G. f. 2.*

In Duuria.

Fungus sæpe 3 pollic. Stipes basi ampullacea.

- Pileus hemisphærico-conoideus, margine subinflato. Lamellæ confertæ, brevissimæ, æquales.
- rubens.** A. pileo plano, verrucoso, rubro; lamellis albis: stipite albo, volvato, bulboso, anulato, longo, apice dilatato. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Stipes adultus pallescit.
- pustulatus.** A. caulescens; pileo convexo, cinereo; verrucis, lamellisq. albis: stipite basi crassiusculo. *Lin. Fl. Svec. Schæff. fung. tab. 90. Batt. tab. 6. b. p. 28. Stebek. fung. tab. 20. K.*
In pascuis, & sylvis montanis.
 Pileus fulvus, pallide murinus, spadiceus, cinereus, floccosus, non striatus. Anulus marginis, albus: ruber crassus.
Omnino hæc pertinent Fungi albi, venenati, viscidit JB. est neget Mich.
- albellus.** A. volva exceptus, fordide albus: pileolo orbiculari, maculis lacteis distincto, margine striato: stipite anulato, in basin tuberosam desinente. *Gledits. Fung. p. 84. Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Totus albus, verrucis lacteis, volva campanulata. Stipes 3-unc.
- scandicinus.** A. *Scop. Fl. Carn. Mich. gen. p. 188. n. 5.*
In sylvis.
 Pileus luride ferrugineus, viscidus, non striatus, verrucis rubris; lamellis albis. Anulus latus, striatus, albus.
- procerus.** A. pileo plano, papillari; stipite convergente, procero, anulato, fistuloso; anulo peculiari inserto. *Scop. Fl. Carn. All. Fl. Ped. Schæff. fung. tab. 23.*
In sylvis humidioribus.
 Lamellæ anulo adfixæ, cui stipes insertus. Anulus amplus, membranaceus alatus.
- stramineus.** A. *Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 189.*
In sylvis.
 Statura A. muscarii. Pileus citrinus, viscidulus, planus. Lamellæ, & stipites albi. Anulus crassus.
- Cesareus.** A. *Mich. tab. 77. f. 1. Schæff. fung. Tom. 4. tab. 258.*
Vulgo Uovolo, o Cocco.

In sylvis, & locis pinguibus, humidis.

Statura *A. muscarii*. Junior hemisphaericus, pallide fantalino col. tinctus. Pileus fructificans convexus, aureus. Lamellæ densæ, flavæ. Stipes extus flavescens, intus albus, anulo magno, flavescente cinctus. Volva alba.

pratensis. *A. Mich. pag. 74. n. 1. 2. & pag. 174. sola atque diversus adparet.*

In pratis, & pascuis.

Lamellæ non dissimiles distinguunt hunc ab *A. campestris*. Albus. Pilei diameter 2-unc. Lamellæ carneæ, a stipite secedentes.

putridus. *A. cespitosus*: lamellis pileo concoloribus, & adnatis stipiti fufcescenti, rigido. *Scop. Fl. Carn.*

In Carniola.

Var. 1. pileo striato, & pallide testaceo. Mich. tab. 81. f. 2.

Pileus 3. digit. transversos latus, vertice fusco, ad oras substriatus. Lamellæ congestæ, pallide testaceæ. Stipes subsemiped. fuscus, plenus, interne albus, nirdulus.

Var. 2. pileo, lamellisq. fulco-rubris.

Pileus iunior planiusculus, in senio concavus fit. Lamellæ magnæ. Stipes longus, anulo lacero cinctus.

Dryadens. *A. cespitosus*, rigidus, flavicans; lamellis pallide fuscis; anulo filamentoso. *Scop. Fl. Carn.*

In trabibus quercinis.

Lente crescit, diuque vivit. Odor *Boleti bovini*. Crassus admodum vertice prominulo, & viscido. Lamellæ crassæ, albæ. Stipes durus, & pollic. humani crassitie. Primum ovatus, albus; dein convexus.

Limacinus. *A. pileo convexo; lamellis ramosis: stipite voluto, volva gelatinosa. Scop. Fl. Carn.*

A. glutinosus. Schæff. fung. T. 4. tab. 36.

In nemoribus umbrosis, autumno.

Undiq. obductus glutine limacino. Pileus fufcescens, diametro 4. digit. transversorum, crassus, convexus. Lamellæ albæ. Stipes longus, crassus, albus.

macrourus. *A. pileo plano: stipite nudo, procero, tuberoso, pleno; radice caudata. Scop. Fl. Carn.*

In sylvis.

Var. 1. pileo viscido.

Odor debilis *Ranae*. Pileus cervinus. Lamellæ crassæ, albæ. Stip. spitham.

Var. 2. Pileo villosus, aut lana fusco-ferruginea, una cum stipite adperso.

Pileus murinus, in sesio concavus: lamellæ albæ.

ferrugineus. A. totus ferrugineus: stipite subovato, pallidior. *Scop. Fl. Carn.*

In sylvis.

Pilei diameter 3-unc. Superficies convexa, lævis. Caro alida. Lamellæ stipiti adnexæ. Stipes solitarius, plenus.

leucophaeus. A. pallide luteus; pileo filamentoso; lamellis subdecurrentibus: stipite brevi. *Scop. Fl. Carn.*

Circa Idriam.

Pilei diameter 4-unc. Superficies humida: caro pauca: lamellæ una cum stipite pallidiores. Stipes solitar.

inclusus. A. pileo murino, viscido; lamellis repandis, una cum stipite albis. *Scop. Fl. Carn.*

In fundo trunci intus cavi.

Stipitis crassities ad basin pollic. longitudo fere semiped.

Elytroides. A. pileo convexo, cute licero-papilloso; lamellis unico puncto stipiti adfixis. *Scop. Fl. Carn.*

In sylvis.

Pileus 2-unc. diametr. fuscus, vertice obscurior, non striatus, fuscus: lamellæ multæ, albæ. Stipes solitar. filamentosus, subfistulosus.

purpurascens. A. caulescens; pileo convexo, purpurasc. viscido; lamellis albis: stipite adnervato, pallido. *Lin. Fl. Svec.*

In Svecia.

Pilei diameter 2-unc. rubellus: lamellæ, & stipit. albi.

ovatus. A. cespitosus, pileo ovato, striato; lamellis diluentibus: stipite cylindrico, fistuloso, longo: anulo fugaci. *Scop. Fl. Carn. Vail. par. tab. 12. f. 10. 11.*

In Carniola &c.

Cespitosus, albus, vertice rufescente. Stipes cylindricus. Pileus junior simil. ovo Gallinaceo.

- truncorum*. A. Scop. Fl. Carn.
Fungus ex uno pede &c. Mich. p. 195. tab. 79.
t. 5. Schaff Fung. tab. 6.
Ad truncos salicinos, aliosque, & ad arborum ramos corruptos.
Vix differt a priore. Pileus pulverulentus, rufescens, cum diffuit campanulatus, striatus, vertice tumido, glabro.
- quisquiliarum*. A. pileo cylindrico: stipite longissimo, basi attenuato. Scop. Fl. Carn.
In Carniola.
Var. pileo typhoideo, semiunc. & altera var. pilei vertice papilloso; lamellis in aqueum succum diffluentibus.
- lignorum*. A. caespitosus; pileo campanulato, obsolete flavo, pulverulento, striato, vertice glabro, tumido, lamellis dein atris: stipite subulato, procero, fistuloso. Scop. Fl. Carn. Schaff. fung. tab. 66.
In lignis putrescentibus.
Albidus, aut fulvescens, pollinem feminalem cum fragore aliquo explodens.
- stercoriaceus*. A. solitar. pileo campanulato, albedo, pulverulento, striato, vertice glabro, tumido; lamellis dein atris, diffluentibus: stipite procero, fistuloso, basi rostrato. Scop. Fl. Carn.
In stercore bovino.
Fungus solitar & albus. Stipes 2-unc. debilis, fistulosus. Pileus tubilis, dein planus, margine fillo.
- cocolla*. A. pileo plano, striato; stipite volvato, anulato, cylindrico, plano. Scop. Fl. Carn.
In montanis, secus agros.
Stipes solitar. aequalis, diametro pilei. Pileus primum ovatus, dein convexus, & planus, diametro 4. dig. transversorum. Volva ampla: annulus durabilis. Edulis.
- mugnatus*. A. pileo plano; lamellis crispis: stipite procero, cylindrico, fistuloso, nudo. Scop. Fl. Carn.
In Carniola &c.
Stipes apice squamosus. Pileus viscidus. Volva nulla. Edulis.
- valens*. A. albus, tener, pileo convexo, viscido: stipi-

te plano, cylindrico, anulato, sæpius cespitoso. *Scop. Fl. Carn.*

In truncis arborum, in silvis.

Stipes longus. Pileus diametro 3. digit. transversorum. Lamellæ remotæ; viscidulæ.

niveus scopoli. A. albus, pileo convexo, glabro, viscido: stipite cylindrico, fistuloso, nudo. *Scop. Fl. Carn.*

In silvis frigidioribus.

Minor priore; solitarius. Lamellæ remotiores.

Jozzolus. A. albus; pileo convexo, viscido; lamellis remotis: stipite procero, nudo, cylindrico, tandem fistuloso. *Scop. Fl. Carn.*

In silvis collium.

umbilicatus. A. caudatus, ex una basi multiplex: pileolo umbilicato. *Scop. Fl. Carn.*

Ad arborum radic. post pluviam.

Stipes 2-unc. fistulosus, nudus. Pilei diameter 2. digit. transversorum. Lamellæ distitæ a stipite divulsæ.

aromaticus. A. stipite tortili, fistuloso, nudo, odore radic. *Acori Calami.* *Scop. Fl. Carn.*

In Carniola &c.

Cessitosus. Color ceræ albæ, pileo convexo, subdepresso, & obliuriore; alibi lineolis subramosis, striatis, margine demum inciso. Stipes longus.

collinus. A. stipite sicco, planiusculo, non striato: stipite nudo, fistuloso. *Scop. Fl. Carn.*

In collibus herbida, florente Colchica.

Plerumq. multiplex, terrestris, rigidulus. Stipes longus, firmulus. Pileus lævis. Lamellæ adscendentes.

Trichopus. A. exiguus, albus; pileolo hemisphærico: stipite setaceo, longissimo. *Scop. Fl. Carn.*

Inter Hypnum, ad arborum radices.

Stipes unci. l. setaceus. Pileol. campaniform. magnitudine sem. *Cannabis.*

Gallinaceus. A. pileo convexo, sicco, non striato; lamellis subdecurrentibus: stipite longo, nudo, plano. *Scop. Fl. Carn.*

In Carniola.

Substantia duriuscula. Diameter pilei semiunc. Lamellæ congestæ. Stipes solitarius, *Sapor subacris.*

- pyramidalis*. A. pileo conico, aut hemisphærico, lævi; carne p. uca; stipite pyramidal, pallidiore. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Stipes uncial. nudus, plenus, firmulus. Pilei diameter 3-4-lineas.
- roridus*. A. pileolo filamentoso; lamellis continuis: stipite ad apicem aqueis guttulis semper rorido. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
Multiplex. Stipes 2-unc. nudus, basi incurvus, adtenuatus. Pileus convexus, non striatus, diamet. uncial. aut paulo ultra.
- grumatus*. A. pileo convexo, sicco, filamentoso; lamellis amplis: stipite longo, nudo, fistuloso. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Stipes solitar. Pilei diameter semunc. Caro pauca.
- leccinus*. A. pileo plano, glabro; lamellis continuis: stipite convergente, basi rubello, anulo amplo cincto. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Stipes 3 unc. Pilei diameter 2-unc. Albedo flaveline inquinante. Anuli margo striatus, & rubellus.
- variegatus*. A. pileo convexo, versus oram rubro-variegato: stipite æquali; nudo, pleno. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Stip. solitar. diametro pilei æqualis. Pilei diameter fescuncial: margine striato. Lamellæ a stipite secedentes.
- amianthinus*. A. pileo filamentoso; lamellis congestis, continuis: stipite pilei concolore, apice dilatato, anulo amplo, & peristite cincto. *Scop. Fl. Carn.*
In Carniola.
 Stip. 2-uncial. subdivergens, plenus, firmus, substriatus. Pilei diameter fescuncial. Lamellæ tenues. Anulus patens, & subtus flavicans.
- pulverulentus*. A. pileo, & stipite polline albedo, & farinaceo adpersis. *Scop. Fl. Carn.*
In truncis, & radicibus.
 Cespitosus. Stip. longus, nudus, rigidus, ple-

- nus. Pileus diamet. uncial. convexus, non striatus, albo-luteus, nec filamentosus. Lamellæ multæ, decurrentes.
- coccineus.* A. pileo coccineo, campanulato; lævi; lamellis cum procero, setaceo, caudato stipite albis. Scop. Fl. Carn.
- Inter Hypn.*
Stip. unci-l. Pileus hemisphæricus, non striatus, magnitudine sem. *Cannabis*.
- janthinus.* A. pileo hemisphærico, margine striato, vertice depresso. Scop. Fl. Carn.
- Inter muscos.*
Stip. solitar. unci-l. nudus, fistulosus, rubellus. Pilei diameter 3-linear.
- roseus.* A. pileo roseo, convexo, non striato; stipitis anulo filamentoso, fugaci. Scop. Fl. Carn.
- In sylvis.*
Stip. solitar. longus, lamellis concolor. Pilei diameter 1-2-unc.
- amethystinus.* A. pileo juniore cœulescente; adulto margine albicante, & maculis cœulescentibus variegato: stipite brevi, basi tenuiore. Scop. Fl. Carn.
- In sylvis.*
Stipes nudus, plenus, albus. Pileus 3. digit. transversus latus, in margine striatus; adultus plenus. Lamellæ continuæ.
- virens.* A. pileo convexo, viridi; lamellis una cum stipite æquali, nudo, cylindrico, pleno, albis. Scop. Fl. Carn.
- In sylvis.*
Stipes pilei diametro non longior. *Edulis.*
- prunulus.* A. pileo convexo, murino, lamellis a bis: stipite nudo, cylindrico, pleno, albo. Scop. Fl. Carn. *Basarr. tab. 19. fig. M.*
- In Pineto.*
Stip. longus. Pilei diameter vix 2-unc.
- caprinus.* A. pileo planiusculo; lamellis amplis, continuis, simplicibus, & ramosis; stipite filamentoso. Scop. Fl. Carn.
- In locis herbidis.*
Stipes solitar. basi tenuior, nudus, plenus. Pileus 3-unc. diamet. lævis, murinus, a Capris avide quaesitus.

- elegans*. A. pileo filamentoso, murino: stipite amethystino. *Scop. Fl. Carn.*
In a-huribus.
 Stip. solitar. 2-unc. nudus, fistulosus. Pileus diametro lin. 6-7. convexus, siccus, non striatus, vertice fusco. Lamellæ continuæ, integræ.
- jacobinus*. A. pileo amplo; lamellis sæpius ramosis: stipite brevi, crasso, hispido. *Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
 Stipes fuscus, basi tenuior. Pileus 5-6. digit. transversos latus, margine deflexo; carne alba, vermiculante.
- trifidis*. A. pileo fusco, campanulato, dein convexo, sicco; lamellis rarioribus: stipite fistuloso; annulo fugacissimo. *Scop. Fl. Carn.*
In Carniola.
- laceratus*. A. pileo fusco, vertice depresso, margine demum lacero; lamellis subcrenatis. *Scop. Fl. Carn.*
Inter Abietes.
 Cespitosus, tener. Stipes fuscus, fistulosus, nudus, medio tenuior. Pileolus unciam cum dimidio latus. Lamellæ abscedentes.
- isericus*. A. pileo convexo, croceo: stipite cylindrico, annulato, pleno, nitido, squamoso, flavo. *Scop. Fl. Carn.*
In Carniola &c.
 Fungus odoratus. Stipes solitar. Caro etiam flava.
- mutabilis*. A. luteus; pileo convexo; lamellis congestis: stipite nudo, cylindrico, pleno. *Scop. Fl. Carn. Schaeff. fung. tab 9.*
In horiis, ad sepes, & ligna, & truncos aborum.
 Modo multiplex, modo solitar. Stip. longus, durus. Pileus junior adigatus stipiti, pilis evanescentibus, figura planiuscula, vertice obscuriore, superficie non striata, diamet 1-2-unc. Lamellæ umbrino-lactæ, obscuri-virescentes, aut nigricantes, a stipite demum secedentes.
- villosus*. A. pileo planiusculo, ad lentem piloso: stipite nudo, croceo-rubro, splendente. *Scop. Fl. Carn.*

In foliis marcidis.

Stipes solitar. longus, apice dilatatus. Pileus diamet. uncial. non striatus, fordide flavus, vertice fusco. Lamellæ magnæ, a stipite secedentes.

tirignus. A. pileo lacero: stipite nudo, filamentoso, æquali. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Stip. 4. digit. transversos longus, sicuti diameter pilei. Pileus planus, obscure luteus. Lamellæ secedentes.

foderellus. A. pileo plano; vertice depresso, margine denique lacero. Scop. Fl. Carn.

In Carniola.

Stipes solitar. longus, nudus, plenus, fuscus. Pilei diameter 7-linear. Lamellæ simplic. & ramosæ, transversus rugis convexæ.

inanis. A. pileo convexo, stramineo, sicco, non striato; lamellis remotis, cum longo, & nitidulo stipite flavis. Scop. Fl. Carn.

In Carniola &c.

Stipes solitar. nudus, plenus. Pilei diameter uncial. Lamellæ continuæ, integræ. *Edulis.*

filamentosus. A. pileo cuticulæ filis hirtus; vertice tumido. Scop. Fl. Carn. An Schaeff. fung. tab. 209?

In sylvis.

Stipes solitar. longus, nudus, plenus. Pilei diameter 2-unc. Lamellæ continuæ, obscuriores. Color ex luteo-rufescens.

viscidus Scopoli. A. pileo convexo, non striato, gelatina obducto; lamellis congestis: stipite nudo, cuticula filamentosa recto. Scop. Fl. Carn.

Inter Muscos.

Stip. solitar. longus, plenus, lamellis concolor. Pilei diameter 3 unc. margo inflexus, & pallidior. Caro flavescens. Lamellæ pileo pallidiores.

albipes. A. pileo plano, sicco; lamellis crebris: stipite nudo, albo. Scop. Fl. Carn.

In montibus.

Stipes solitar. 2-unc. plenus. Pileus ochroleucus. Lamellæ continuæ, pallidiores.

crassus. A. lamellis creberrimis: stipite nudo, diametro pilei brevior, crasso, plano. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

- Stip. solitar. primum ventricosus. Pileus 6 7. transversos digitos latus, primo pulvinatus, dein convexus. Caro alba: lamellæ continuæ.*
- miniatus. A. pileo convexo, non striato, col. pomi Lycoperfici: stipite supra medium rubro, inferne flavescente. Scop. Fl. Carn.*
In Carniola &c. pascuis montanis.
- Stip. solitarius, pilei diametro duplo longior, basi attenuatus, fistulosus, in senio striatus. Pilei diameter 1-2-unc: superficies madida. Lamellæ remotæ, crassæ.*
- conicus. A. pileo Coralli rubri colore; ambitu flavescente. Scop. Fl. Carn. All. Fl. Ped.*
In sylvis.
- Stip. solitar. longus, rubro, flavoq. col. varius, in senio fistulosus. Pilei diameter etiam 2 unc. figura conica, dein planiuscula. Caro flavescens.*
- spadiceus. A. pileo spadiceo, aut pallide rufo; lamellis citrinis: stipite longo, lamellis concolore. Scop. Fl. Carn.*
In sylvis elatioribus.
- Stip. solitar. digiti medii longitudine, plenus. Pileus tres digitos transversos latus, convexus, mollis, non striatus. Caro flava. Lamellæ a stipite secedentes.*
- flammeus. A. flammeo-croceus, dein flavescens: pileo convexo: stipite cylindrico, nudo. Scop. Fl. Carn.*
An Schæff. fung. tab. 3?
In gramineis sylvarum.
- Stipes plenus. Adulti pilei vertex depressus; margo vero sublobatus. Lamellæ remotæ, decurrentes, obtusæ.*
- santalinus. A. totus colore Santali rubri. Scop. Fl. Carn.*
In sylvis.
- Stip. solitar. fistulosus, longitudine digiti indicis. Pileus convexus, nitidulus, non striatus, diametro sub 2-unc.*
- vinaceus. A. pileo vini rubri aquosi colore: lamellis undularis, pallidioribus: stipite ab basi flavicante. Scop. Fl. Carn.*
In foliis Fagi.
- Stip. solitar. 3-unc. debilis, nudus, fistulosus, pileo concolor. Pilei diameter uncia. fig. pla-*

- nuscula, margine non striato. Lamellæ latæ, integræ.
- laccatus*. A. colore pallido *Lacca*: lamellis remotis, continuis; apice quandoq. ramosis. Scop. Fl. Carn. Schæff. fung. tab. 13.
- In sylvis*.
Stip. solitar. longus, nudus, fistulosus. Pileus convexus, non striatus. Lamellæ crassiusculæ, in senio fungo subdecurrentes.
- hispidus*. A. pileo convexo, papillari, rubro: lamellis rubris: stipite cylindrico, lato, pleno, supra anulum album, persistentem, pileo concolore. Scop. Fl. Carn.
- In sylvis*.
Stipes infra anulum rubens. Pileus, & stipes filamentis cutaneis hispidi: multiplex; pileus non striatus, diamet. uncial.
- Berulinus*. A. pileo convexo, filamentoso, rubro: lamellis
Scopoli. rubris: stipite flavo, nudo, cylindrico, pleno. Scop. Fl. Carn.
- In Carniola*.
Pileus diametro uncial.
- rubellus*. A. pileo convexo, & lamellis roseis: stipite albo, cylindrico, fistuloso, nudo. Scop. Fl. Carn.
- Inter Fagos*.
Stip. solitar. Pileus diametro uncial. viscidulus.
- inversus*. A. pileo infundibulif. glabro; margine erecto, lobato: stipite brevi, nudo. Scop. Fl. Carn.
- Inter Fagos*.
Totus sordide ruber. Stipes plenus, diametro pilei brevior.
- squamosus*. A. pileo vertice depresso, squamulis cutaneis hirsuto: stipite nudo, fistuloso. Scop. Fl. Carn.
- In Carniola*.
Stip. solitar. longus, filamentosus, striatus. Pilei diameter semiunc. superficies sicca: lamellæ amplic, remotæ.
- coriaceus*. A. pileo infundibulif. coriaceo, hispido, margine deflexo: lamellis decurrentibus, rufescentibus: stipite brevi, nudo. Scop. Fl. Carn.
- In strabibus, & lignis verno tempore*.
Plerumq. multiplex, siccus, incorruptibilis. Stip. sentunc. plenus, glaber, pallidior. Lamellæ integræ.

- tabescens*. A. cespitosus, hispidulus, centro depressus: lamellis laxis, rufescentibus: stipite longo, fistuloso, nudo. Scop. Fl. Carn.
- In Carniola.*
- longipes*. A. pileo flavescente, glabro: lamellis pallide ferrugineis: stipite procero, nudo, pleno. Scop. Fl. Carn.
- Inter Fagos.*
- quadricolor*. A. pileo vertice flavo, margine albido, & striato: lamellis pallide cinnamomeis: stipite subviolaceo. Scop. Fl. Carn.
- Inter Fagos.*
- Stip. solitar. procerus, nudus, subfistulosus. Pileus diametro uncial. convexus, dein planus. Lamellæ latæ, contiguæ.*
- crustatus*. A. pileo convexo, crassis squamis adperso: stipite cylindrico, striato, nudo, fistuloso, nitido. Scop. Fl. Carn.
- In Carniola.*
- Stip. pileo concolor. Pileus crassus, flavus. Lamellæ virid.*
- lubricus*. A. pileo viscido, rufescente; in prima ætate blagelatinosa e margine pendula, & stipiti adfixa, gerente. Scop. Fl. Carn.
- In sylvis.*
- Stip. solitar. 3-unc. viscidulus, apice albus, alibi flavus. Pileus iunior campanulatus, dein convexus, postea planus, tandem inversus. Lamellæ fuscescent. simplic. & ramosæ.*
- acuminatus*. A. pileo convexo, cœruleo, centro acuminato; lamellis umbrinis: stipite pileo concolore, cylindrico, anulato, pleno. Scop. Fl. Carn.
- In Carniola.*
- Figura, & diameter ut in A. valente; a quo differt col. & centro pilei in acumen elevato. Anulus parvulus, & lacerus.*
- extenuatus*. A. pileo convexo, paleaceo, tenui; lamellis murinis: stipite nudo, cylindrico, pleno. Scop. Fl. Carn.
- Ad radices Abietum.*
- Pileus magnitudine Nucis moschatae, valde tenuis, stramineus, stipiti concolor. Caro pauca.*

maculatus.

A. pileo convexo, viscido; lamellis ramosis, decurrentibus, crassis, umbrinis: stipite brevi, cylindrico, flavo. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Stipes diametro pilei brevior, medulla rubente.

Pileus diametro 3-unc. albus, maculis nigris in senio variegatus. Caro alba, & crassa.

speciosus.

A. pileo incarnato: stipite longo, albo; anulo fugaci cincto. Scop. Fl. Carn.

In Carniola.

Stipes solitar. plenus. Lamellæ fuscescentes, simplic. & ramosæ, subdecurrentes.

hemisphæricus. A. pileo hemisphærico, lævi, flavo: stipite solitario, pleno, nudo. Scop. Fl. Carn.

Ad ligna putrida.

Stip. 2-unc. pileo concolor. Pileus diametro semunc. Lamellæ fuscescentes. Var. pileo min. & ferrugineo.

carpsus.

A. totus fuscescens, & filamentosus, pileo convexo: lamellis laxis: stipite longo, anulo fugaci cincto. Scop. Fl. Carn.

In Carniola superiore.

Stip. solitar. fistulosus. Pilei diameter uncial.

eristatus.

A. pileo campanifor. vertice squamulis prominulis hirsuto. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Stip. multiplex, vel solitar. longus, nudus, plenus, rigidus, rarioribus squamulis dispersus. Pileus diametro semunc. margine inflexo, vertice obtuso, cuti non striata. Lamellæ fuscescent. stipiti adnexæ.

concauus.

A. pilei vertice admodum depresso, margine inflexo; lamellis fuscescentibus, crebris, tenuibus, decurrentibus. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Stip. solitar. fescunc. 2-lin. crassus, plenus, nudus. Pileus diametro uncial. colore fusco, striis nullis. Lamellæ pileo pallidiores.

serobiculatus.

A. pileo sulphureo, concavo, lactescente; lamellis pallidioribus, ramosis: stipite brevi, lacero, fistuloso. Scop. Fl. Carn. Batar. Fung. tab. 4. f. H.

In sylvis.

Statura prioris. Stipes cicatricibus, & foveis variolosus. Pileus sæpe sulphureus. Lac album,

deia mox sulphureum, non tam acre ut in pro-
re, & sensim linguam urens.

- rufus.* A. pileo ferrugineo; lamellis pallidioribus: sti-
pitate longo. Scop. Fl. Carn. Batar. Fung. tab.
16. f. H. huic proximus.

In sylvis.

Stip. fistulosus, vix lactescens. Pileus diamet.
1-2-unc. in medio elevatus; senilis marginem
attollit. Lac album, acrimoniam suam non sta-
tim prodit, & sensim flavescit.

- ruficaneus.* A. pileo fusco: lamellis, stipiteq. dilute flave-
scentibus. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Lac album. Stip. uncial. dilatatus, fistulosus.
Pileus diametr. 2-unc. centro depresso. La-
mellæ pleræq. simplic.

- rudibundus.* A. pileo terreo; pileo, lamellisq. testaceis; la-
cte, & carne albidis, sensim rubescentibus.
Scop. Fl. Carn.

Inter Fagos.

Lac acerrimum. Stip. 2-unc. Lamellæ simplic.

- Tithymalinus.* A. lacte albo, urente. Color totius fungi pa-
leaceus. Scop. Fl. Carn.

Habitat cum A. rufo.

Stipes æqualis, plenus. Pilei vertex depressus,
diamet. unc. superficies sicca; margo inflexus.
Lamellæ creberrimæ, repandæ.

- hybridus.* A. testaceus, albo, & subacri lacte abundans.
Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Habitus A. speciosus. Color A. testacei.

- Ermineus.* A. pileo fusco; lamellis, stipiteq. albis. Scop.
Fl. Carn.

In Carniola.

Stip. quandoq. flavescens. Pileus non concavus,
Lamellæ simplic.

- indematopus.* A. pileo rufescente; lamellis albidis: stipite lon-
go, crasso, flavicante. Scop. Fl. Carn.

In sylvis elatioribus.

Stip. pollice duplo crassior. Pileus fusco-ferru-
gineus; lacte copioso, albo, dulci manans.

- alliaceus*
Scopoli. A. stipitatus, pileo convexo, glabro, e fusco-
palescente; lamellis albidis: stipite atro, ni-
tido. Scop. Fl. Carn. Mich. tab. 78. f. 4.

Scharff. fung. tab. 99.

In sylvis apricis.

Olor allii. Stipes junior sanguinem fundit e rupta basi; senior nigrescit, nitet, digitorum longus. Pileus junior flavicans, conicus, striatus; adultior fuscescens, dilatatur, convexus fit, & strias amittit, diametro vix unc. & quarta parte longitudinis pedunculi. Lamellæ albidæ.

sulphureus. A. odore sulphur. aut pulveris pyrii. Scop. Fl. Carn.

Ad truncos inter Hypnæ.

Sæpe aggregatus, nunc albitus, nunc fuscescens, tener. Pileus diametro semunc. campanulatus, striatus.

zingiberatus. A. odore Zingiberis, pileo flavo, non striato; lamellis flavis: stipite anulo fugaci cincto. Scop. Fl. Carn.

In Carniola.

Stip. solitar. uncial. rigidus, flavus. Pileus diamet. unc. obscurioribus lituris variegat.

galericulatus. A. pileo fusco, campanulato, lævi: stipite procerò, nudo, cylindrico, fistuloso, flavo, cespitoso. Scop. Fl. Carn. V. ill. parit. tab. 12. f. 3. 4. Batar. Furg. tab. 17. fig. G. Schæff. Furg. t. b. 52.

In putridis Ugnis, & truncis.

Cespitosus; pileus ad oras striatus.

epiglyptus. A. solitarius; pileo viscidulo, obtuse conico, ad oram striato. Scop. Fl. Carn.

Ad arborum radices muscosas, super truncos.

tener. A. solitarius; pileo non viscoso, & inodoro. Scop. Fl. Carn.

H. hitus cum priore.

Semper mollis. Stipes longus.

fasciatus. A. pileo pallide murino, fascia fulva verticem ambiente; lamellis rufescentibus. Scop. Fl. Carn.

In Carniola.

Stipes longus, plenus, nudus, pileo concolor.

Pileus diametr. fere unc. convexo, substriato: lamellæ remotæ.

rigidus. A. pileo spadiceo; anulo filamentoso, stipiti aligato, margine striato: lamellis ferrugineis. Scop. Fl. Carn.

Inter Abietes.

- Junior similis turcico*. Stip. solitar. longitud. digiti, plenus, firmus. Pileus diametro unc. odore acidulo, & cruto; carne solidi.
- rotula*. A. pileo inverso, rotulae simili &c. Scop. Fl. Carn. Mich. g.n. tab. 79. f. 7.
In aridis Coryli, & aliarum arborum ramis.
 Stip. unc. fulco-rubens, nitidus. Pileolus albidus, in medio depressus, non maior operculo capsulae *Hyojeyami*. Lamellae latae, pileo concolores.
- eufescens*. A. pileo colore Cinnamomi pulverizati, cuticula filamentosa: lamellis subrubris. Scop. Fl. Carn.
In Carniola.
 Pilei vertex subcompressus. Pileus diametr. 2-unc. Stip. paulo longior, nudus, pileo concolor. Lamellae amplae, subrenatae, stipiti adligatae.
- compressus*. A. pileo albo, viscidulo; lamellis decurrentibus: stipite brevi, compresso. Scop. Fl. Carn.
Inter Abietes.
 Pilei diameter 4-unc. Lamellae pileo obscuriores.
- hispidulus*. An degeneratio alterius Fungi?
 A. (*Merulius*) plerumq. multiplex, pileo fusco, plicato, lobato; lamellis decurrentibus, ramosis, venosis, flavis: stipite brevi, compresso, flavo. Scop. Fl. Carn.
 A. degener. Schaeff. fung. tab. 243.
In tuncis putridis, & ad radices arborum.
 Arboreus, fasciculatus, superne fuscescens, & villosulus. Pileus diametr. 4. digit. transversorum.
- infundibuliformis*. A. (*Merulius*) caespitosus, luteus, pileo plicato, lobato; lamellis ramosis, venosis: stipite procero. Scop. Fl. Carn.
 Fungus &c. Vautl. parif. tab. 11. f. 10.
In lignis putridis.
 A. (*Merulius*) violaceus. Hall. helv. n. 2327.
In Helvetia.
 Simil. A. *cantharello*, sed color violaceus, absq. flavi vestigio.
 A. (*Amanita*) semipetiolat, niveus. Hall. helv. n. 2337.
In Helvetia.

Tremulus, mollis, collo angustiore, supra convexus, subtus cavus.

A. (*Amanita*) semipetiolat. albidus, subtus terreus. *Hall. helv. n. 2338. Mich. gen. tab. 65. f. 1. accedit, & fig. 5. 6. Buxb. cent. 3. tab. 10. f. 1. 2. Vail. parif. tab. 10. f. 7?*

Ad ligna fœca vulgaris.

Cespitosus, & imbricatus, quandoq. ad *Mesenterii* similitudinem. Collus brevis, angustus, ventriculus, lamellatus. Ambitus squamarum fere circularis; diameter uncial. Caro dura, sicca: supra convexus, albus, terreus, rufus, vacuus, subvillosus, aut granulis albescentibus asper. Laminae leoninae, vel terreae, aut cinnameae.

candidus.

A. (*Amanita*) maximus, albus, infundibuliform. *Hall. helv. n. 2339. Buxb. cent. 4. tab. 1. f. 1. Schaeff fung. tab. 225. Butar. Fung. tab. 17.*

A. *Gl-d. Fung. p. 99. n. 10. var. b.*

In folijs.

Magnitudo, & fig. A. *piperati*. Stipes brevis. Moles maxima. Quandoq. flavescit. *Edulis.*

A. (*Amanita*) albus, oris repandis, & lacceris. *Hall. helv. n. 2340. Sterbæk. tab. 13. B. B. Buxb. cent. 4. tab. 32.*

In silvis.

Differt a n. 2338. absentia lactis; striis; & pileo undulato.

A. (*Amanita*) albus, petiolo gracili: pileo campanulato, striato, farinoso. *Hall. helv. n. 2347. Mich. gen. tab. 79. f. 6. nostro maior. Buxb. cent. 2. tab. 50. f. 5. Butar. Fung. tab. 27. C?*

Inter Muscos non rarus.

Stipes sæpe curvus, ad terram hirsutus. Pileus albus, vel ochroleucus; senior cinereus, vel umbrinus.

A. (*Amanita*) pileolo campaniformi, albo, superne violaceo; petiolo concolore. *Hall. helv. n. 2350.*

In Helvetia.

Stip. uncial. violac. Lamellæ albæ. Diameter 2. lin. ad 4.

A. (*Amanita*) albus; lamellis crassissimis. *Hall. helv. n. 2352.*

In sylvis.

Fungus parvus, stipite 2-unc. & ultra. Pileus 2-unc. pulvinatus, aut campanulatus, sed planus, albus, non ochroleucus, flavus, rufus, cinereus, umbrinus, aquose pellucidus, per oras striatus. Caro sicca, pene coriacea, edulis. Laminæ rososæ, albæ, etiam cervinæ. Anulus arenosus. Etiam cespitosus, & ramosus.

bulbosus.

A. (*Amanita*) albus, lævis, pulvinatus, anulatus. *Hall. helv. n. 2353. Batar. Fung. tab. X. C. Schæff. Fung. tab. 241. f. 4.*

In Helvetia, Pedemontio &c.

Stip. inferne bulbosus, crassus, farctus, albus. Anulus constans, non longe a laminis. Pileus 3-unc. & ultra, & æque alto stipite. Etiam omnia subcinerea, deniq. tota glauca. *Esauts.*

A. (*Amanita*) albus, squamosus, pulvinatus: petiolo crasso, anulato. *Hall. hist. n. 2354.*

In Helvetia.

Stipes dimidio brevior pileo. Anulus membranaceus. Pileus campanulatus, inde pulvinatus, totus villosus, squamis fuscis in centro congestis. Omnia alba, aut subcinerea.

A. (*Amanita*) albus, squamosus, petiolo gracili, anulato. *Hall. helv. n. 2355. Batar. Fung. tab. 8. D. E. optima est; & pro pusillata var. tab. X. A. B.*

In Helvetia &c.

Stip. 4-unc. bulbosus, fistulosus. Anulus membranac. non longe a laminis. Pileus 4. unc. latus, & ultra, planus, non striatus, cutis coriacea. Plerumq. tamen squamulæ copiosæ, fuscæ elevantur in medium umbonem pileoli coacervatæ. Hæc omnia ochroleuca.

A. (*Amanita*) albus, squamosus, striatus: petiolo gracili, anulato. *Hall. helv. n. 2356. Mich. tab. 7. 8. f. 7.*

In sylvis.

Stip. 3-unc.-semiped. sub laminis latus; & anulus constans. Pileus pene planus, in centro umbonatus, squamisq. cutaneis, castaneis variis, ad oras striatus, *Michelio* conicus. Lamellæ trium ordinum, breves. Omnia alba, per ætatem cinerea, glauca, Stipes quandoq. subellus.

A. (*Amanita*) sanguineus; laminis albis: petiolo bu bolo. *Hall. helv. n. 2361. Accedit ad tab. 87. Schaeff. fung. & tab. 9. C. F. Batar. In Helvetia &c.*

Stip. spadiceus, & sanguineus, superne gracilis, & albus. Pileus umbonatus, media papilla elevata, cæterum modice convexus, pulvinatus, col. cervino, subluteo, spadiceo, sanguineo. Lamellæ etiam ochroleucæ, in pulchram flavedinem degenerant. Diameter sub 3-unc. Etiam cespitosus provenit.

A. (*Amanita*) campaniform. cervinus; reticulatus; lamellis albis. *Hall. helv. n. 2362. In Helvetia.*

Solitar. vel cespitosus, etiam villosus, succulentus, fragilis. Stipes spadiceus, aut rufus, etiam rugosus, & difformis. Pileus 4. unc. latus, col. vaccino, quantoq. squamis laceris asper, & globulis flavescentibus reticulatus. Laminæ albæ.

melleus.

A. (*Amanita*) viscidus, pileo flavescente; laminis albis. *Hall. helv. n. 2363. Schaeff. Fung. tab. 45.*

Videatur *Batar. XXII. c.*

In Helvetia minime rarus.

Stip. debilis, fistulosus, spadiceus, cinereus, terreus, superne flavo pallescens. Pileus fuscunc. planus, centro saturiore. Lamellæ albæ, in cervinum degeneres.

A. (*Amanita*) petiolo gracili, anulato: pileolo convexo, tuberculoso, cervino; lamellis albis. *Hall. helv. n. 2364. An Batar. tab. X A?*

In Helvetia &c.

Stip. 2-unc. firmus, duriuscul. fistulosus, inferne ligneus, superste albus, farinosus, anulo membranac. Pileus fuscunc. diametro, campanul. papilla media eminente, glaber, ambitu rugoso. Color umbrinus, flavus, aut ligneus.

Tuberculis, & anulo differt a n. 2362.

A. (*Amanita*) petiolo crassissimo, anulato, spadiceo, laminis albis, præcrassis. *Hall. helv. n. 2365.*

In sylvis Abiegnis.

Stipes 2-unc. squamosus. Anulus membranaceus, albo-fuscus. Pileus 3-unc. spadiæo-cervinus, squamis elevatis. Caro alba. *Odor singularis, non malus.*

A. (*Amanita*) petiolo bulboso, anulato: pileolo convexo, spadiceo. *Hall. helv. n. 2366.*

In Helvetia.

Multiform. compositus, biceps, transversim latus. Stipes 2-unc. crassus, tartus, carne albissima. Pileus 3. unc. latus. Anulus membranac. *Edulis odore farinæ.*

flavidus.

A. (*Amanita*) pileo pulvinato, flavo; oris, & lamellis albis. *Hall. helv. n. 2368. Buxb. cent. 3. tab. 45. f. 2. Schaeff. fung. tab. 35. All. Fl. Ped.*

In sylvis frequens.

Stipes striis contortis pictus, cum flavedine albus, sub pileo subsquamosus. Pileus hemisphaericus, etiam difformis. Maturus in leoninum colorem cum umbrino alterne striatum degenerat, oris tamen flavis; & lamellæ albo col. diluto pinguntur.

A. (*Amanita*) petiolo gracili, anulato: pileolo albo, squamis sanguineis aspero. *Hall. helv. n. 2372. An Mich. gen. tab. 8. f. 8?*

In Helvetia &c.

Concinus fungus cespitosus, multa cum n. 2368. communis habet; differt tamen squamis, & coloribus. Stipes 2-unc. subrubellus, squamosus; anulo membranac. Pileus 2-unc. flavus, quandoq. maturus; nam iunior conicus est, oris striatis, albus. Laminae albæ, & subrubellæ.

A. (*Amanita*) pediculo anulato; pileo viridi, striato; lamellis albis. *Hall. helv. n. 2375. Sterbeck. tab. 3. E.*

In Helvetia &c.

Albus, anulo fugaci. *Edulis.*

A. (*Amanita*) pileo umbilicato, striato, viscido, obscure viridi; lamellis albis. *Hall. helv. n. 2376.*

In Helvetia.

Stip. humilis, albus. Lamellæ numerosæ, tenues, etiam cœrul.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

A. (*Amanita*) pileo pulvinato, viridi. Hall. helv. n. 2377.

In Helvetia.

Stip. solidus, albus. Pileus vix uncial.

A. (*Amanita*) petiol. farinoso: pileo subcinereo, viscido; lamellis albis, torosis. Hall. helv. n. 2379. Mich. gen. tab. 73. f. 2.

In Helvetia &c.

Stip. inferne bulbosus, superne angustior, 2-unc. Pileus grandis, etiam cum violac. col. mixtus. Laminæ crassæ, albæ.

A. (*Amanita*) petiol. brevissimo, bulboso, laterali: pileol. hemisphærico, spadiceo, lamellis albis. Hall. helv. n. 2380. An Scharff. fung. tab. 71?

In sylvis.

Gregarius. Stipit. in latera pileorum inserti, col. lurido, pene nigro. Lamellæ albæ, inde ochroleucæ.

multiformis. A. (*Amanita*) petiolo farto, gracili: pileo plano, murino, sericeis lineis striato; lamellis albis. Hall. helv. n. 2381. Scharff. fung. tab. 14. 64. All. Fl. Ped.

In Helvetia &c, ad radices arborum verno tempore.

Gregarius. Stip. cylindric. solidus, cinereus, nitens. In pilei ambitu filamenta omnia educuntur. Ora fungi frequenter lacera. Lamellæ albissimæ.

A. (*Amanita*) petiol. gracili, farto: pileo squamoso, murino; lamellis albis. Hall. hist. n. 2382.

In Helvetia &c.

Stip. digital. ad 3. unc. altus, fistulosus, albus. Pileus conicus, sed lator, aut hemisphæricus. Laminæ in senio rubentes.

A. (*Amanita*) petiol. farto, gracili: pileo hemisphærico, cinereo-purpur. lamellis albis, cervinis, subrubellis. Hall. helv. n. 2383. An Buxb. cent. 4. tab. 12. f. 2?

In Helvetia.

Stip. 3-unc. non bulbosus, inferne crassior, superne angustior, siccus, sulcatus, albus. Caro sicca, firma. Pileus campanulatus, oris at-

tractis, & rub nribus, col. murini, & cervini. In senio viscidus est.

- A. (*Amanita*) petiol. furto, gracili: pileo pulverinato, cinereo; lamellis albis. *Hall. helv.* n. 2384.

In Helvetia.

Stip. 1-3 unc. albus. Pileus conicus, absq. velere sericeo.

- A. (*Amanita*) petiol. gracili, fistuloso, spadiceo: pileo plano cinereo, oris luteis striato; lamellis albis. *Hall. n.* 2385. *An Buxb. cent.* 4. tab. 18? sed videtur anulatus. *Schaff. fung. tab.* 45.

In Helvetia &c.

Stip. semunc. etiam cinnameus, nitens. Pileus etiam umbilicatus, semunc. latus, murinus, cum nitore violaceo, centro saturatus umbrino, oris per ætatem lutescentibus, & striatis. Laminæ numerosæ, albæ, inde ochroleuæ. Celeriter magno cum fœtore putrescit.

- A. (*Amanita*) petiol. procero, cylindrico, fistuloso: pileo plano, umbonato, striato, cinereo, subtus albo. *Hall. helv. n.* 2386. *An Buxb. cent.* 4. tab. 18? an *Batar. tab.* 21. F?

In Helvetia &c.

Differt a sequentibus; maior, & speciosior.

Stip. semiped. superne grumosus, sordide terreus, in circulum lamellarum insertus, ad terram crassior. Pileus 3. unc. latus, lacer.

- A. (*Amanita*) radice tuberosa, caudata: petiolo præalto: pileo plano, nigricante; lamellis albis. *Hall. helv. n.* 2387.

In silvis Abiegnis.

Stip 3-unc. & ultra, pene niger. Pileus planissim. umbrinus.

- A. (*Amanita*) tener, petiol. procero, fistuloso: pileo umbonato, plicato, murino; lamellis albis. *Hall. helv. n.* 2390.

In hortis maxime ferotinus.

Succulentus, tener. Stipes compressus, quasi linea divisus, cinereus, murinus, dilute castaneus.

- A. (*Amanita*) minimus, pileolo campanifor. spadiceo; lamellis albis. *Hall. helv. n.* 2392.

Buxb. cent. 4. tab. 13. f. 1. Batar. tab. 27. C.

In ligno putrido.

Stip. uncia non altior, curvulus, albus. Pileus vix 2-lin. albus, murinus. *Proximus sequenti.*

A. (*Amanita*) pileol. conico, spadiceo; lamellis albis. *Hall. helv. n. 2393. Cup. in tab. 52. Schaeff. f. 1.*

In Helvetia.

Stipes inferne bulbosus, cinereo-albicans, firmus, unc-fuscunc. longus. Pileol. acuta, & longe conicus.

A. (*Amanita*) petiol. curvulo: pileol. campanifor. flocculento, striato, farinoso, spadiceo. *Hall. helv. n. 2394.*

In Helvetia.

Stip. e. cinereo-spadiceus, unc. altior. Pileol. unc. brevior. Totus tener, & succulentus.

A. (*Amanita*) volva exceptus; petiol. farinoso: pileo cinereo, striato: lamellis albis. *Hall. helv. n. 2395.*

In silvis Abiegnis.

Stip. 2-unc. non annulatus, volva trifida, membranacea, alba. Pileus conicus, campanitorm. cinereus, oris profunde striatus.

A. (*Amanita*) petiolo gracili, annulato; pileol. hemisphaerico, spadiceo; lamellis albis. *H. ik. helv. n. 2396. Buxb. cent. 4. tab. 3. f. 1. absque anulo.*

In sylvis serotinus.

Stip. unc. albus. Pileol. primo fordide ex cinereo-albidus; dein castaneus, fuscunc. Anulus fugax.

A. (*Amanita*) petiol. bulboso: pileo hemisphaerico, spadiceo; lamellis albis, vel terreis. *Hall. helv. n. 2398. Schaeff. fung. tab. 38.*

In Helvetia &c.

Stip. crassius, vix unc. fatus, albus, aranacea lanugine efflorescente. Pileus viscidus, in medio pallidior.

A. (*Amanita*) petiol. procero, annulato: pileo cervino, squamis fuscis exaspero. *Hall. helv. n. 2399. An Schaeff. fung. tab. 22. 23. 33? & tab. 28. 30, absq. anulo?*

In Helvetia.

Mus-

Marabilis, etiam absq. anulo. Stip. semiped. cervinus, subrubellus, spadiceus. Pileus primo cervinus, inde pulchre villosus, oris in senio striatis: maturus leoninus, & cinnameus, aut olivæ eus, spadiceus. Lamellæ albidæ, inde flavidæ, aut citrinæ, demum spadiceæ, pulline semini alba te adspersæ.

A. (*Amanita*) petiol. fistulosus, anulato: pileo rufus; squamis, & 1 mellis coloribus. *Hall. helv. n. 2400. Schæff. fung. tab. 25. Butar. tab. XI. A?*

In Helvetia &c.

Forte idem prioris. Gregarius.

excoriatus.

A. (*Amanita*) petiol. procero, anulato: pileo, & lamellis cervinis. *Hall. helv. n. 2402. Schæff. fung. tab. 19. f. 1. 2.*

In Helvetia &c.

Accedit ad priores; sed differt pileo non villosus. Stip. ceræ crudæ col. anulo albo: pileus cervinus, flavus. Lamellæ ochroleucæ.

A. (*Amanita*) cervinus; pileo demum pulvinato, oris adtractis. *Hall. helv. n. 2404.*

In Helvetia.

Concinus, succus. Stip. 2-unc. Pileus oris introversis, 1-2. unc. latus, avellaneo-cinereo col. lamellis concoloribus, aut sublignis.

A. (*Amanita*) cervinus; petiol. fistulosus: pileo centro squamoso. *Hall. helv. n. 2405.*

In Helvetia.

Stip. 3-unc. cavus. Pileus planus, pulvinatus, fuscuncialis, avellaneus. Lamell. concolor.

A. (*Amanita*) cervinus; petiol. flavo, curvulo, excentrico: pileo squamoso; lamellis ramolis. *Hall. helv. n. 2406. Schæff. fung. tab. 53.*

In Helvetia &c.

Pileus fuscuncialis: cervinus. ad oras striatus, & serratus. Ora nunquam subcorui.

A. (*Amanita*) ex vacuo, & avellaneo varius, fericeus: lamellis numerosiss. albidis. *Hall. helv. n. 2407.*

In Helvetia.

Stip. 3-unc. fistulosus, crassus, albus. Pileo pulvinatus, fericeus, lineatus, non maculatus.

Tom. VI.

X

CRYPTOGAMIA FUNGI.

A. (*Amanita*) tener, cervinus, per oras striatus, & fissus. *Hall. helv. n. 2409.*

In Ericetis.

Stip. 3-unc. albidus. Pileus planissimus. Totus æquosus.

A. (*Amanita*) pileo flavescente; lamellisburyraceis; anulo araneofo. *Hall. helv. n. 2411.*

In Helvetia.

Stip. procerus, teres, inferne crassus, ochroleucus, flavescens: pileus convexus, inde planus, umbone flavo, ora ochroleuca, & cervina.

Lamellæ col. Isabelleo. Aulus in summo stipite.

Goccosus.

A. (*Amanita*) pileo flavescente, squamoso; lamellis in senio terreis obscuris: anulo araneofo.

Hall. helv. n. 2412. Schæff. 29. 30. forte 61.

Ad Salices in sylvis.

Stipes crassus, cervinus, col. ceræ crudæ, siccus, fartus, etiam villosus. Pileol. diamet. 4-unc. cervinus, aut totus leoninus, seu ex flavo sature fuscus, squamis variis elevatis, oris obiter striatis. Lamellæ juniores Isabelleæ, ora alba, subcœrul; inde Avellanæ ora alba; demum terræ obscuræ. In summo stipite reliquæ anuli araneosi, non membranacei.

A. (*Amanita*) anulatus, cervinus, pediculo superne albo. *Hall. kist. n. 2413.*

In Helvetia.

Stip. 2-unc. teres, inferne cervinus, super anulum albus, anulo cervino, lacero. Pileus ex rufo terreus, oris conspicue sulcatis, centro umbonato.

A. (*Amanita*) pileo plano, lacero; corio cervino; lamellis terreis, obscuris. *Hall. helv. n. 2414. Schæff. fung. tab. 33. 34.*

In Helvetia.

Stipes 2-unc. teres, fistulosus, albus. Volva lacera, alba, persistens. Pileus magnus, oris reflexis, sæpe subfuscis.

A. (*Amanita*) siccus: pileo plano, subcinereo; lamellis lignei coloris. *Hall. helv. n. 2415.*

An Schæff. fung. tab. 83?

In sylvis.

Stip. brevis, uncial, fartus, albus. Pileol. pul-

vinatus, sæpe lobatus, & difformis, non striatus, centro tinctiore, sæpe gemellus. Caro nunquam nitens.

silva.

- A. (*Amanita*) succus: pileolo albido: lamellis crassis, flavescentibus. Hall. *helv.* n. 2416. *All. Fl. Ped. Schaeff. fung. T. 4. tab. 221.*

In sylvis vassim.

Stipes brevis, albus, ochroleucus. Pileus in medio depressus.

- A. (*Amanita*) succus: pileolo hemisphærico, obsolete umbrino: lamellis albis, vel subaraneis. Hall. *helv.* n. 247.

In sylvis uliginosis.

Stip. brevis, fortius, albus.

- A. (*Amanita*) tener; petiol. nigro, procero: pileo striato, terreo; laminis sordide albis. Hall. *helv.* n. 248.

In Helvetia.

- A. (*Amanita*) glutinosus, flavus; pileo umbonato. Hall. *helv.* n. 2420. *Vall. parif. tab. 18. f. 8. 9. Schaeff. fung. tab. 2. Buxb. cent. 4. tab. 28. f. 3.*

In sylvis passim.

Stipes fistulosus, sæpe compressus, quasi geminus. Pileol. planus, umbonatus, tubulatus, flavus, aurantiacus. Vetuli ora late striata.

- A. (*Amanita*) succus, sulphureus; lamellis crassis. Hall. *helv.* n. 2422.

In Helvetia.

Stipes fortius. Caro concolor, quandoq. subvirid. Pileus convexus, subcoriaceus, umbonatus, in centro flavescent; laminis concoloribus.

- A. (*Amanita*) flavus, campanulatus, succus. Hall. *helv.* n. 2423. *Schaeff. fung. tab. 2. Buxb. cent. 4. tab. 19.*

In Graminis.

Stip. iunior solidus, dein fistulosus, flavus. Pileus acutus, clausus, per oras striatus; lamellis crassis, citrinis, carne firmiore.

- A. (*Amanita*) flavus, pileo hemisphærico, squamoso. Hall. *helv.* n. 2424.

In Helvetia.

Succus. Stipes fortius, basi miniata. Lamellæ etiam crassæ, colore *Pemi Auranti*: squamæ

de pilei convexitate elevatæ, quæ princeps nota est.

- A. (*Amanita*) tuberculofus, flavus; petiolo squamoso: lamellis cervinis. *Hall. kely. n. 2427.*

In sylvis Abiegnis.

Siccus, 2-unc. latus; squamis de stipite efflorescentibus, cuius parte summa alba, & glabra.

- A. (*Amanita*) totus flavus, striatus, tenuissimus. *Hall. kely. n. 2428. Mich. gen. tab. 74. f. 8. Schæff. fung. tab. 99. f. 1. 2. 3.*

In ignis putridis.

Stipes unc. sæpe curvulus. Pileol. umbraculo similis, totus striatus, absque carne.

- A. (*Amanita*) leoninus, tericeus. *Hall. kely. n. 2431. An Mich. gen. tab. 74. f. 2. qui campaniform pingui? Schæff. fung. tab. 4. f. 24. 41 & 65.*

In Helvetia &c.

Minime rarus, magnitudine inæquali ab 1. ad aliquot unc. Stip. obscure flavescens, basi bulbosa. Pileus planus, aut subconvexus, flavus, subfuscus, aut fulvus, semper brevi sericeo, & adpresso villo nitens. Anulus araneosus ad initium petioli. Lamellæ concolores, etiam cinnamæ.

- A. (*Amanita*) viridis; pileol. plano; lamellis pallidis. *Hall. kely. n. 2433.*

In sylvis.

Stip. 3-unc. fistulosus, ex albo-virid. Pileus a centro ad ambitum striatus, totus satore virid. seu sordidus. Lamellæ numerosæ, undulatæ, & plicatæ, ex albo-stramineæ, dein in pulchrum col. viridem abeuntes.

profusus.

- A. (*Amanita*) pileo pulvinato, viridi; lamellis obscure luteis. *Hall. kely. n. 2434 Schæff. fung. T. 4. tab. 218.*

In Helvetia &c, locis muscosis, initio Autumni.

Major prioribus. Stip. fartus, crassus, superne magis, flavescens. Pileus diamet. pene 3-unc. Caro copiosa, ut possit esse edulis.

- A. (*Amanita*) pediculo bulboso: pileo hemisphærico, spadiceo; lamellis luteis. *Hall. kely. n. 2435. An Buxb. cens. 4. tab. 8. f. 1?*

In pratis.

Stip. 2-unc. crassus, albus, in flavum languens, aut terreus. Pileus pulvinatus, pene campanulatus, diamet. 3-unc. col. castaneo, etiam fuliginosus, cum nitore. Lamellæ latæ, col. paleæ. Caro tenuis.

A. (*Ananita*) petiol. fistuloso, lineato; pileo convexo, flavo-rufo. *Hall. helv. n. 2436. Schæff. fung. tab. 13.*

In Helvetia.

Fungus concinnus, succus, & firmus, sæpe gregarius. Stipes sæpe incurvus, lævis, ex communi carne multiplex, lineatus. Pileus diamet. 1-fescunc. primo hemisphæricus, adtractus, inde planus, aut modice pulvinatus, & calvus. Hæc omnia sanguineo-rufi; laminæ tamen pallidiores, flavæ, ora cinnamomea.

A. (*Amanita*) petiolo fistuloso, lineato: pileo leolo vaccino, squamoso. *Hall. helv. n. 2437.*

In sylvis.

Villis a priore differt, ni idem sit.

A. (*Amanita*) vaccinus; petiolo farto: lamellis crassus. *Hall. helv. n. 2438. An Schæff. fung. tab. 43. 50?*

Bernæ, & Basileæ.

Edulis videtur. Suilli miniati fig. refert. Caro sicca, & firma. Stip. a priore diversus, brevis, vix 2-unc. pene bulbosus, crassus, albus, etiam sublevis. Pileus hemisphæricus, etiam difformis, demum cavus. Laminæ vaccinæ, ora alba, crassæ, etiam terræ. Caro multa.

A. (*Amanita*) flavo sanguin. lamellis raris; petiolo procero. *Hall. helv. n. 2439.*

In Helvetia.

Elegans, succus, firmulus, superne albicans. Stip. 3-unc. lævis, fartus. Pileus 2-unc. campanifor. lacer, sine striis. Laminæ paucæ, etiam ramosæ, crassæ.

A. (*Amanita*) petiolo albo: pileo ex ochroleuco, & lateritio vario; lamellis roseis. *Hall. helv. n. 2440.*

In sylvis.

Accedit inter albos ad sequentem.

X iij

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Stip. 3-unc. fartus, gracilis. Pileus ad 3-unc. latus, pulv natus. Lamellæ ex roseo-lateritiæ. Caro tenera, & succiplena.

A. (*Amanita*) subrubellus; petiol. procero: pileo campanulato, striato. Hall. helv. n. 2441. In sylvis.

Stipes fartus, col. castanei, inde obscure sanguineus. Pileus ex cinereo-sordide rubens. Laminæ cum obsoleto rubore albidæ. Etiam expanditur, & sequeunt. tunc latus est.

A. (*Amanita*) cupreus; pileo campanulato, striato. Hall. helv. n. 2442. Vaill. parif. tab. 12. f. 3. 4.

In Muscis, & ligno f. ficulatus.

Stipit. unc. farti, teneri. Pileoli exigui, vix unc. dodrantem lati; hæc cuprea, sive sanguinea, obscura. Lamellæ pallidior. albidæ.

A. (*Amanita*) anulatus; pileo convexo, cœrul-viridi; lamellis roseo-cœruleis. Hall. helv. n. 2444.

In Helvetia.

Stip. colore pilei, qui pulvinatus, umbonatus, anulo fugaci, concolore, glutine obductus. Pileus in senio in alborem d. generat, centro subluteo. Caro alba. Laminæ dilute carneæ (col. Lilac) col. cum cœruleo mixto.

A. (*Amanita*) pileo pulvinato, cervino; lamellis cinnameis. Hall. helv. n. 2445.

In Helvetia.

Stip. 3-unc. fartus, inferne bulbosus. Anulus membranaceus, albus, in sequenti spadiceus. Pileus 3 unc.

A. (*Amanita*) cespitosus, ramosus, hemisphaericus, mollis; lamellis cinnameis. Hall. helv. n. 2446. Buxb. cent. 4. tab. 23. ? Mich. gen. tab. 79. f. 1. similis; sed color laminarum recedit, Schaeff. tab. 8.

In Helvetia.

Stip. crassus, terreus, araneosus. Pileus campanulatus, dein explanatus; junior lividus, inde terreus, flavo-rufus, subspadiceus, medio umbone tinctiore. Lamellæ polline seminaud cœrul. tunc sæpe ex cinereo-violaceæ.

A. (*Amanita*) pileo campanulato, squamoso,

cinereo, laminis ruberrimis. Hall. *helv.* n. 2447.

In Helvetia.

Simil. sed diversus ab *A. dentato*, *flavo*. Stip. latus, fistulosus, inferne sanguineus, superne flavus. Pileol. 3-unc. flocculentus, amplior, ex cervino-terreus.

A. (Amanita) pileo plano, flavescens, striato, viscido; laminis roseis. Hall. *helv.* n. 2448. *An idem cum n. 2341?*

In Helvetia.

Stip. fistulosus, flavescens, ora saturiore. Laminæ etiam in umbrinum degenerantes.

A. (Amanita) pileo murino, umbilicato; lamellis subrufis. Hall. *h.-lv.* n. 2449. *Vaill. parif. tab. 14. f. 1. 2. 3. Buxb. cent. 4. tab. 3. f. 1. & forte 2.*

In sylvis, & scrubibus non rarus.

Stip. 3-unc. teres, farrus. Pileus perfecte umbilicatus, in centro depressus, veluti infundibuliform. oris concinne repandis, tota cute recta filis sericeis, extrorsum ex-umbilicatus, cum nitore siccus. Lamellæ diversi col. tandem murinæ. *Fungus gregarius.*

Spadiceus.

A. (Amanita) pileo campanulato, castaneus; lamellis subrufis. Hall. *helv.* n. 2450. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 60.*

In sylvis.

Stip. 2-unc. cavus, subalbicus. Pileus 3-unc. altus, plicis cutaneis signatus, eleganter spadiceus. Lamellæ absq. nitore.

A. (Amanita) pileo hemisphærico, murino; lineis rubellis striato. Hall. *helv.* n. 2451.

In Helvetia.

Stip. procerus, farrus, albus, sublividus. Lamellæ ineleganter carneæ.

A. (Amanita) pileolo spadiceo, subvillosus; lamellis subrufis. Hall. *helv.* n. 2452.

Differt a n. 2450. Stip. fistulosus, albus, vel ex cinereo-nitens. Pileol. subconvexus, spadiceus, villosus adpersus, siccus, diamet. unc. Laminæ col. butyraceo.

A. (Amanita) leoninus; pileo campanulato. Hall. *helv.* n. 2453.

In Helvetia.

Stip. gracilis, cylindricus, fartus, albus, leoninus. Pileus etiam hemisphæric. albus, avelaneus, leoninus, fescunc. Lamellæ cinnamomeæ.

A. (*Amanita*) leoninus; pileo conico, lineato. *Hall. helv. n. 2454. Schæff. fung. T. 4. tab. 48.*

In Helvetia &c. lignis putridis.

Stip. 3-unc. fartus, gracilis, lineatus. Pileus obscure conicus, ex leonino-terreus, totus striis nigris distinctus, & fissilis. Lamellæ terrei, aut cinnamom. coloris. Vidi virgatum potius quam striatum, pileo flavescente, toto tenuis subspadiceis percurso.

A. (*Amanita*) obscure cervinus; petiol. bulboso, areneose anulato: lamellis exius conspicuis, cœrul. *Hall. helv. n. 2456.*

In Helvetia.

Similis A. violacea. Totus concolor, obscure cervinus. Stip. brevis, crassus, teres, fartus, & solidus. Pileus modice pulvinatus, planus, etiam cavus, ad cori modum tuberculofus, 4-unc. lamellæ aliquid subrubelli retinent.

A. (*Amanita*) obscure violac. pileolo conico *Hall. helv. n. 2458. An Buxb. cent. 4. tab. 8. f. 2?*

In Helvetia.

Exiguus: color strure cyanæus. Stip. 3-unc. pileo conico; laminis numericis, violaceis.

A. (*Amanita*) violaceus; petiolo plano, striato. *Hall. helv. n. 2459.*

In Helvetia.

Differt a n. 2457. striis, & teneritate. Fungus aquosus. Stip. 3-unc. fistulosus. Pileol. tenuissim. ab'que carne, campanulatus, inde unbonatus, subplanus. Laminæ paucæ, ex violac-rubellæ, in terreum degenerantes.

A. (*Amanita*) totus viridis. *Hall. helv. n. 2460.*

In Helvetia.

Stip. bulbosus, superne angustior. Pileus diamet. 4-unc. pulvinatus, viscidus, carne e luteo viridi; laminæ sordide olivaceæ.

A. (*Amanita*) ceræ crudæ col. ora striatis *Hall. helv. n. 2461.*

In Helvetia.

Totus concolor. Stip. procerus, 3-unc: striis contortis pictus, cæterum nitens. Pileus unc. in medio depressus.

A. (*Amanita*) pileo umbrino: lamellis obscure cinnamæis. Hall. helv. n. 2461.

In Helvetia.

Minime rarus, & aliquoties depictus. Stip. 3-unc. firtus, gracilis, sæpe curvulus, villosus, albidus. Pileus pulvinatus, etiam umbonatus, unc. latus, umbrinus, etiam albidus. Lamellæ obscure cinnamomæ. Caro ficca.

A. (*Amanita*) pileo umbrino, campaniformi, striato; lamellis obscure ligneis. Hall. helv. n. 2463.

In Syria Abiegnis.

Gregarious, tener. Stip. cavus, ceræ crudæ col. Pileus concinnus, hemisphericus, lobis cinereis, & saturioribus variis, præter nervum umbonem, totus striatus. Laminæ etiam umbinæ. Quandoq. in medio depressus, & squamulis efflorescens.

A. (*Amanita*) minimus; pileo papillato, villoso, albo: lamellis ligneis. Hall. helv. n. 2464.

In Helvetia.

Stip. vix uncial. firtus. Pileus convexus, umbonatus, vix 3. lin. latus. Laminæ etiam obscure cinnamææ.

A. (*Amanita*) cinereo-umbrinus, cute striata: lamellis cinereis. Hall. helv. n. 2465.

In Helvetia.

Stip. fescunc. firtus, albus. Pileol. umbonatus. Laminæ ora alba. Natura ficca: odor spermaticus.

A. (*Amanita*) pulvinatus, cinereus; petiol. superne farinoso. Hall. helv. n. 2466.

In Helvetia.

Junior cinereus, & concolor. Adultus stipitæ ceræ crudæ colore. Pileus hemispheric. subumbilicat. linearis, aquose spadiceus; lamellis ex albo-umbrinis. Forte idem cum prior.

Spadicea-gri-sea. A. (*Amanita*) cinereo-spadiceus, cute striata; lamellis umbrino violac. Hall. helv. n. 2467.

Schæff. Fung. T. 4. tab. 232.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Ad putrida, etiam circa fineta, Autumno.

Stip. fescunc. fistulosus, striis rectis lineatus.

Pileus umbonatus, ex cinereo-sp-diceus.

A. (*Amanita*) cinereus; petiol. c. alfo, & far-to. Hall. helv. n. 2408. Schaeff. Fung. tab. 89.

In Helvetia &c.

Stip. brevis, 2-unc. albus, inferne crassior. Pileus 2-unc. altus, pulvinatus, lobatus, murinus, etiam albus. Lamellæ murinæ, terreae.

Quandoq. gregarius.

A. (*Amanita*) petiolo fistuloso: pileo sericeo, spadiceo, cinereo. Hall. helv. n. 2469. *An Schaeff. Fung. tab. 64. lamellis albidis?*

Berna, & Gottingæ.

Differt a priori, stipite cavo; pileo nitente sericeo: idco. Cæterum ex spadiceo-cinereus; lamellis cineris; qua nota differt a n. 2385.

A. (*Amanita*) cinereo-spadic. petiolo fistuloso, farinoso. Hall. helv. n. 2470.

In sylvis.

Gregarius. Stip. 2-unc. ceræ crudæ col. Pileus 3-4-unc. ex cinereo-subspadiceus, non striatus: lamellæ concolores.

A. (*Amanita*) ferdide ex luteo-cinereus: petiol. bulboso: pileo villoso. Hall. helv. n. 2471.

In sylvis.

Stip. spadiceo-nitens, 2-unc. lineatus, fartus, villosus. Pileus pulvinatus; lamellis pileo concoloribus, diamet. 4-unc.

A. (*Amanita*) murinus; petiol. procero: pileo late conico, striato. Hall. helv. n. 2472. *Videtur Buxb. cent. 4. tab. 29. f. 1. Accedit, præter laminas, ad Mich. tab. 79. f. 4.*

In pratib.

Stip. etiam semiped. lineis contortis striatus, dilute murinus. Pileus brevis, expansus, concolor, torus, præter umbonem, striatus. Lamellæ murinæ.

A. (*Amanita*) pileo plano, subluteo, ora striata: lamellis umbrino-violac. Hall. helv. n. 2474.

In Helvetia.

Stip. 4-unc. albidus. Pileus centro umbonato, furdide terreus, oris sature spadiceis.

A. (*Amanita*) *minimus*; pileo, & petiolo villosis, albis: laminis obscure ligneis. *Hall. helv. n. 2476. An Mich. tab. 74. f. 8. fig. non valde similis, nimis fulva.*

In ligno putrescentia.

Stip. vix unc. Adultus quandoq. pileo hemisphærico, stristo. Lamellarum ora candicans, serrata, col. undiq. murino.

A. (*Amanita*) *cinereus*, prolifer; vagina infundibulifor. *Hall. helv. n. 2477. Mich. gen. tab. 79. f. 3.*

In Helvetia.

Initium forte alterius fungi. Infundibulum cinereum, albidum, laminas habet albas, extrus conspicuas. In eo continetur **Stip.** flavescens, longe gracilis, deinde dilatatus in simile cinereum infundibulum. Ex eo, tum de oris, denique de tumida pariete exterioris infundibuli, sive vaginae, numerosi fungi surgunt, 2-unc. albo pedicillo, capitulo 2-3. lin. lato, cinereo: lamellis albis, aut cinereis.

A. (*Amanita*) petiol. anulato: pileo hemisphærico, albo; laminis murinis. *Hall. helv. n. 2478. Ad A. VII. Gledits.*

In Helvetia &c.

Stip. 3-unc. teres, fartus, inde cavus. Pileus campaniform. modo lævis, modo totus squamis grandibus, elevatis asper. Anulus membranac. Laminæ latæ. Color undiq. murinus; laminis, & carne in senio flavedine mixtis. *Atiquando dodrantal. pileo plano, sordide albo; lamellis umbrinis.*

A. (*Amanita*) *campanulatus*, albus; lamellis subumbrinis; anulo araneoto. *Hall. helv. n. 2480.*

In Helvetia.

Stip. cavus.

A. (*Amanita*) anulo araneoso: pileo pulvinato, livide spadiceo; lamellis ex cinereo-umbrinis. *Hall. helv. n. 2481.*

In Helvetia.

Stip. 2-unc. fartus, albus. Pileus 4-unc.

A. (*Amanita*) *campaniform.* cinereus; lamellis deniq. nigris. *Hall. helv. n. 2483.*

Stip. *Sterbeck. tab. 2. T. Vaill. parif. tab. 12. f. 5. 6. Schaeff. fung. tab. 14. Batar. tab. 27. C.*

In ruderosis, & gramineis.

Alias *b.* caespitose provenit, statura tunc min. 3-unc. pileol. intra unc: alias *a.* solitar. altior., semiped. pileol. campanul. 2-3 unc. lato. Stip. semper fistulosus, albus, & cinereus, fragilis. Pileus obrusus, potius lineatus, quam striatus, etiam glaber. Lamellæ in principio albæ, dein cineræ, tandem nigerrimæ.

cinereus.

A. (*Amanita*) pileo conico, murino: lamellis in senio nigris. *Hall. helv. n. 2484. Sterbeek. tab. 25. A. Buxb. cent. 2. tab. 50. f. 2. & cent. 5. tab. 48. f. 2. Schæff. Fung. tab. 100. Batar. tab. 25. E.*

In ruderosis, macilentis hortis, & in mantibus, locis humidis.

Torus tener, & aquosus. Stip. 3-unc. & ultra, fistulosus, albus. Pileol. iunior conicus, totus plicatus, umbellæ complicatæ similis, ora lacera; unbone dilute spadiceo; cætera cinereo-nitente colore. Laminæ iuniores ex albo-murinae, cute nitida. *Maturus fungus explanatur.*

A. (*Amanita*) tener, conicus, lacer, cervinus: lamellis nigris. *Hall. helv. n. 2485. An Mich. gen. tab. 8 f. 5? Buxb. cent. 2. tab. 50. f. 1. Schæff. Fung. tab. 66. 67. & forte 68. Batar. tab. 26. D.*

In hortis.

Cæspitosus, stipit. procero, semiped. cavo, albo, vel ex albo-purpureo. fistuloso. Pileol. umbonatus, cæterum planus, terreus, aut spadiceus.

A. (*Amanita*) niger. *Hall. helv. n. 2486.*

In Helvetia.

Stip. 3-unc. rugosus. Pileus pulvinatus, pene campaniform. rugosus, subficcus, oris adtractis, niger, laminis nigris. *Haller suspicatur, viridem fuisse.*

A. (*Amanita*) fascicularis; pileol. conico, cervino; undiq. concolor. *Hall. helv. n. 2410.*

In sylvis Abietinis.

Exiguus, ficcus, non striatus, pileol. vix unc.

A. (*Amanita*) sessilis, minimus, albus. *Hall. helv. n. 2355. Buxb. cent. 6. tab. 7. f. 3.*

Ad ligna putrida.

Exiguus, vix semunc. latus; mollis, supra villosus.

A. (*Amanita*) sessil. crustaceus, altissimus. Hall. *helv.* n. 2336.

In Helvetia.

Videtur intum alicuius A. sessil. in ligno putrescente.

Crusta simpl. tota superne lineis profundis divisa, sulcis, & tuberculorum initiis, absq. carne.

A. (*Amanita*) cervinus; petiol. bulboso, farto; pileol. per oram tuberculoso, & striato. Hall. *helv.* n. 2401.

In reiectamentis coriariorum.

Stip. 2-3-unc. albo-cervinus. Pileol. iunior albus, avellaneus, isabelleus, inde flavescens. In summo stipite anulus.

A. (*Amanita*) viscidus; petioli carne flava: pileo plano, fordide luteo; lamellis primo albis. Hall. *helv.* n. 2369.

In Pinetis.

Stip. 3-unc. extus albus, crusta subnigra, basi tuberosa, viscida. Laminæ dein murinæ, tandem fuliginosæ.

A. (*Amanita*) murinus; pileo ovato, adtracto. Hall. *helv.* n. 2473. *Mich. gen. tab.* 81. f. 3. *Batar. tab.* 28. A.

In sterilibus muscosis.

Fungus fescunc. altus, totus murinus. Stipes intumescit quasi in nodum villotum. Pileus glandi penis similis, villosus.

A. (*Amanita*) cervinus, anulatus &c. Hall. *helv.* n. 2403.

In sylvaticis umbrosis.

Stip. 3-unc. albus, pene apice anulatus: pileol. vix 4-linear.

A. (*Amanita*) violac. petiol. gracili: pileolo pulvinato. Hall. *helv.* n. 2457.

In sylvis.

Stip. compressus, striatus, fartus. Pileus semunc. non maior, laminis paucis, crassis. Totus pulchre violac.

A. (*Amanita*) anulo araneoso: pileo flavo; lamellis flavo-fuliginosis. Hall. *helv.* n. 2482.

In sylvis.

Plerumq. fasciculatus. Stip. superne subfulphur.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

ambitu araneosa lanugine obducto. Pileus in semio planus. Caro sublutea.

- A. (*Amanita*) petiol. procero, gracilissimo: pileolo conico, striato, murino; lamellis albis. Hall. n. 2391.

In muscosis sterilibus.

Stip. semiped. fistulosus, Pileus uncial. ora dentata. Lamellæ albæ, aut dilute terreæ.

- A. (*Amanita*) pileo pulvinato, leonino, centro fusco, squamoso. Hall. helv. n. 2360. Schæff. fung. tab. 77. An Mich. gen. tab. 75. f. 4?

In foliis congestis, putridis.

Stip. 3-unc. albus, aut leoninus. Laminæ col. diversi.

- A. (*Amanita*) infundibulif. cervinus; lamellis albis, aut ochroleucis. Hall. heav. n. 2359.

In locis similibus.

Stip. 4-unc. flavo-obscurus. Pileol. dilute vaccinus.

- A. (*Amanita*) petiol. gracili, prælongo: pileol. conico, striato. Hall. helv. n. 2345. Mich. gen. tab. 73. f. 4.

In Hevesta &c.

Stip. 4-unc. flavus, aut fuscus. Pileol. unc. brevior, albus, aut cinereus, centro flavo. Laminæ albæ, aut roseæ.

- A. (*Amanita*) cespitosus: petiolo procero, fistuloso: pileo umbonato, striato, squamoso. Hall. helv. n. 2389. Mich. gen. tab. 79. f. 4.

Ad arborum radices.

Cespitosus, tener. Stip. albus. Pileol. cervinus, in centro umbrinus; adultus conicus, roseus, dein flavus, aut cinereus.

- A. (*Amanita*) rad. caudata: petiol. fistuloso, procero: pileo umbonato, cinereo, striato; lamellis albis. Hall. helv. n. 2388. Batr. t. b. 25. E.

In locis umbris.

Rad. incurva. Fungus succulentus, in putredinem pronus. Stip. semiped. terreus, nitens. Pileus sulcatus, nitidus, etiam murinus. Lamellæ albæ, dein cinereæ.

- A. (*Amanita*) albus; pileo hemisphærico, oris striatis. Hall. helv. n. 2430. Mich. gen. tab. 77. f. 1.

Ad Arborum cortices, & folia arida.

Brevis, vix uncial. stipite tremulo, albo. Laminæ adeo breves ut venæ sint. Margo, & laminæ in senio ochroleucæ.

A. (*Amanita*) flavus, volvarius, anulo latissimo. Hall. helv. n. 2430. Mich. fung. tab. 77. f. 1.

In quibuslibet putrescentibus.

Volva ampla iuniorem fungum totum involvit. Stip. albus. Pileus hemisphæric. aut tubinatus. Color. ubiq. flavus. *Educit saporis gratiasino.*

A. (*Amanita*) albus, omnium minimus: pileol. hemisphærico. Hall. helv. n. 2349. Mich. gen. tab. 80. f. 10.

In fol. fagineis putrescentibus.

Omnium minimus, argenteus.

A. (*Merulius*) sessil. semipetiolatus, convexoplanus. Hall. helv. n. 2328.

In sylvis.

Durus, & solidus, stipitis sine cavo, extus rugoso: pileo orbiculato, per oras sulcato, & squamoso, extus flavo. In senio cinerei Agarici formam induit.

A. (*Amanita*) sessil. hirtus, fulvus; lamellis concoloribus. Hall. helv. n. 2331. Buxb. cent. 5. tab. 6. Schæff. is. tab. 76.

Ad ligna.

Squamæ imbricatæ, non crassæ, rotunde lobatæ, supra villosæ, zonis concentricis variæ, nigris, fulvis, flavis. Laminæ ex albo-flavescent. vel flavæ.

A. (*Amanita*) sessilis, siccus, villosus, albicans; lamellis fulvis. Hall. helv. n. 2332.

Ad ligna deiccta.

Maïuscul. ad 3-unc. latus, imbricatus, siccus, durus, supra villosus, albus, ochroleucus, fulvus. Laminæ fulvæ, subcinameæ.

A. (*Amanita*) sessil: perexiguus, tener, col. cinereo. Hall. helv. n. 2334.

Ad terram, & ligna putrida.

Diameter vix semunc. squamæ supra villosæ. Totus murini col.

A. (*Amanita*) pileo cinereo, semicirculari. Hall. helv. n. 2475.

In Helvetia &c.

laevis.

A. sessil. altus, planus, mollis, glaber: lamellis simplicibus. Scop. Fl. Carn. Schaeff. Fung. T. 4. tab. 213.

In *marcidis arboribus*.

Solitar. & multiplex, convexus, margine repando.

parietinus.

A. rufus, subrus obscurior: polline seminali, copioso, ruto. Scop. Fl. Carn.

In *parietibus, trabibus, & offribus*.

membranaceus. A. sessil. plicatus, membranaceus. Scop. Fl. Carn.

In *truncis*.

Parvulus, modo albidus, modo fuscescens.

brumalis.

A. superne fuscus; subtus albus. Scop. Fl. Carn. In *trabibus*.

Sæpe cespitosus, diamet. palmari; polline seminali, col. cinereo.

flabelliformis. A. flabelliform. villosus; pileoli margine fornicato. Scop. Fl. Carn.

In *lignis aridis*.

Albidus, superne hirsutus, & lineis concentricis, obscurioribus fasciculatus, margine lobato.

Pseudo-Boletus. A. Jacq. Austr. 1. tab. 41.

In *Austria*.

An var. *sensibilis*. A. *quercini*? Oblongus, firmus, durus; ex basi latitacula, & inæquali adsurgit in collum longum, circa mentietatem parum angustatum, inde latescens in caput obtusissimum, & obsolete triangulare. Basis ferruginea, dein diluor: caput sulphureum. Caro pallide fusca, coriaceo-ligneæ.

A. esculentum, cespitosum, album, multifid. & denticulatum, denticulis asperis. Mich. gen. tab. 64. f. 2. Fl. Dan. tab. 450.

In *Hetruria &c.*

Color fuscus. Stip. ramosus, ramis ultimis, subtus echinatis.

plicatus.

A. Schaeff. tab. 31. All. Fl. P.d.

Fungus parvus &c Mich. gen. tab. 73. f. 4.

In *montibus, inter Muscos*.

lacer.

A. caulescens, foliarius, & cespitosus, non carnosus; pileo primum conico, demum planulo, albo, centro latigato, margine limbo, sæpe revolutis, lacero; lamellis concoloribus.

coloribus: stipite tereti, striato, plano, albidulo, velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. tab. 257. 4. All. Fl. Ped.*

In agris, Autumno.

altens.

A. caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo convexo, dein infundibuliformi, vitcido, flavido, albo; lamellis crassis, ramosis, concoloribus: stipite tereti, pleno, curvo, concolore, velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. 238. All. Fl. Ped.*

In sylvis, Autumno.

Edulis.

granulosus.

A. caulescens, plerumq; solitarius, carnosus, pileo aurantio, granulis quasi adperso, medio fastigiato, versus marginem flavo, striato, carnosus, lamellis flavis: stipite tereti, plano, flavo, punctato-variegato, velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. tab. 21. All. Fl. Ped.*

In sylvis aridis, & pratis.

minutus.

A. caulescens, solitarius, non carnosus; pileo campanulato, luteo; lamellis raris, flavidis; stipite tereti, gracili, curvulo, pleno, albidulo; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 308. All. Fl. Ped.*

Super ramos arborum emortuorum, frequentius super Pyrum.

cystiiformis.

A. caulescens, solitarius, vix carnosus; pileo infundibuliformi: luteo, punctato striato, margine repando, subobato, nonnihil imbricato; lamellis pallidis, ramosis, decurrentibus: stipite tereti, brevi, pleno, pallide luteo; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 262. All. Fl. Ped.*

In sylvis, Autumno.

vaccinus.

A. caulescens solitarius, & cespitosus, carnosus; pileo convexo, squamoso-striato, ordine rufo, lamellis pallide rufis: stipite tereti, striato, pleno, concolore, apice dilatato: velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 25. All. Fl. Ped.*

In sylvis.

rubellus.

A. caulescens, subsolitarius, non carnosus; pileo primum subonico, deum planiusculo, cum purpura albidulo, centro fastigiato, margine striato; lamellis pallide purpureis: stipite

- tereti, gracili, curvulo, fistuloso, pilei col. basi crassiusculo; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. T. 4. tab. 307. All. Fl. Ped.
In pratis, agris, nemoribus apricis.
- erinitus.* A. caulescens, solitarius, carnosus, succo flavescente, acri scatens; pileo convexo, piloso, rufo-griseo; cenro concavo, margine fornicato, subverso, lamellis ramosis, concoloribus: stipite tereti, brevi, pleno, concolore; velo spurio, piloso, anulo nullo. Schaeff. fung. T. 4. tab. 228. All. Fl. Ped.
In sylvis, Autumno.
- griseus.* A. caulescens, solitarius, non carnosus; pileo convexo, cinereo, per tempestatem spadiceo, lamellis concoloribus, paucis: stipite tereti, gracili, subtortili, fistuloso, radicato, concolore; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. T. 4. tab. 236. All. Fl. Ped.
In sylvis, ad radices arborum.
- brunneus.* A. caulescens, plerumq. cespitosus, parum carnosus; pileo hemisphaerico, sulcato, fuscescente, vertice tumido, lamellis concoloribus: stipite tereti, gracili, fragili, concolore, fistuloso; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. T. 4. tab. 32. All. Fl. Ped.
In humidis, Autumno.
- fuscescens.* A. caulescens, cespitosus, vix carnosus, hydrophorus; pileo multiformi, primum subconico, dein campanulato; tandem planiusculo, medio fastigiato, fuscescente, margine griseo, tandem lacero, revoluta; lamellis obscure cervinis, demum fuscis: stipite tereti, curvo, fistuloso, albido; anulo fugaci, velo nullo. Schaeff. fung. T. 4. tab. 17. All. Fl. Ped.
Aliquibus edulis.
- lateralis.* A. caulescens, plerumq. solitarius, carnosus; pileo convexo, obscure spadiceo, lamellis decurrentibus, albidis, demum ochroleucis: stipite brevissimo, crasso, laterali, pleno, spadiceo, basi tuberoso; velo, & anulo destitutus. Schaeff. T. 4. tab. 71. All. Fl. Ped.
In truncis arborum casarum.
- guttatus.* A. caulescens, solitarius, carnosus; pileo pri-

mum subconico, demum planiusculo, rubello, lacero-squamoso, squamis trapeziis, rufofuscis, volvæ reliquis, margine striato; lamellis albidis, alternis integris, interne latioribus, dimidiatis, versus ambitum interioribus: stipite brevi, tereti, pleno, albido, basi tuberoso, volvato, volva inferne evanida; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 240. All. Fl. Ped.*

In altis nemoribus, Autumno.

olivaceus.

A. caulescens, solitarius, carnosus, carne sicca, fragili, solida, albida: pileo primum globoso, dein convexo, centro depresso, subriliter punctato, olivaceo, margine tandem sursum reflexo; lamellis crassis, aureis: stipite brevi, tereti, crasso, pleno, roseo-albido; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. tab. 204. All. Fl. Ped.

Amantia &c. Hall. herb. n. 2373. var. n.

In nemoribus, Autumno.

crassipes.

A. caulescens, solitarius, & cespitosus, carnosus, pileo valde mutabili, convexo, inciso, fusco; lamellis albidis, demum fusciscentibus: stipite mutabili, fusco, sursum crassiore, sulcato, plano; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. T. 4. tab. 87. 88. All. Fl. Ped.

In sylvis, ad radices arborum.

strobiliformis. A. caulescens, solitarius, & cespitosus, parum carnosus; pileo planiusculo, lacero, multiflori, cervino; lamellis anastomosantibus, terreo-albidis: stipite brevi, tereti, pleno, albido; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. T. 4. tab. 43. 44. All. Fl. Ped.

In lignis viridibus.

badius.

A. caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum subovato, demum late conico, badio, margine striato; lamellis integris, ochroleucis: stipite longo, tereti, crasso, valde fistuloso, albido, basi tuberoso, volvato; volva coriacea, albida, persistente; velo, & anulo destitutus. Schaeff. fung. T. 4. tab. 245. All. Fl. Ped.

In collibus, Autumno.

fasciatus.

A. caulescens, solitarius, carnosus; pileo con-

vexo, cervino, sæpe deformi; lamellis purpurascensibus: stipite tereti, sulcato, sæpe squamoso, pleno, fuscescente, basi crassiusculo, subpurpureo; velo, & anulo destitutus. *Schæff. fung. T. 4. tab. 223. All. Fl. Ped.*

Monomyces &c. Batar. fung. tab. 20. b.

In sylvis montanis, & umbratis, ad caudices arborum.

varius.

A. caulescens, plerumq. solitarius, carnosus; pileo convexo, planiusculo, vaccino; lamellis flexuosis, purpurascensibus, margine flavidis: stipite tereti, crassiusculo, superne albido, pleno; basi tuberoso, rufescente; velo filamentoso; anulo nullo. Schæff. fung. T. 4. tab. 42. All. Fl. Ped.

In nemoribus, Autumno.

Eduis.

sylvaticus.

A. caulescens, solitarius, parum carnosus; pileo primum subgloboso, demum planiusculo, squamoso, ochroleuco; lamellis fordide carneis: stipite crasso, tereti, fistuloso, anulato, fordide albo, basi tuberoso, sæpe curvo; velo, & anulo persistente &c. Schæff. fung. T. 4. tab. 242. All. Fl. Ped.

In campis apertis, & autumno.

Eduis.

pallescens.

A. caulescens, plerumq. cespitosus, non carnosus; pileo subconico, striato, spadiceo-cinereo; lamellis murinis: stipite longo, tereti, fistuloso, gracili, albido; velo, & anulo destitutus. Schæff. fung. tab. 211. All. Fl. Ped.

Inter muscos, ad radices arborum.

cervinus.

A. caulescens, solitarius, paulo carnosus; pileo cervino, primum fastigiato, dein fere hemisphærico, striato; lamellis pallide testaceis: stipite solido, exalbido, striato, basi tuberoso; velo, & anulo destitutus. Schæff. fung. T. 4. tab. 10. All. Fl. Ped.

Innascitur substantiæ interiori l'opuli.

cylindricus.

A. caulescens, solitarius, volvatus, non carnosus: pileo squamato, striato, cinereo, cylindrico, conico, tandem campanulato, lacero; lamellis umbrinis, per ætatem nigrescentibus, diffluentibus: stipite procero, fistuloso,

albo, basi bulboso; anulo fugaci; velo nullo; volva oblonga, squamosa. *Schaeff. fung. tab. 8. All. Fl. Ped.*

In agris, & pratis sterilibus.

fastigiatus. A. caulescens, simplex, carnosus; pileo conico, longitudinaliter striato, flavo; lamellis fusciscentibus: stipite tereti, pleno, pallide flavo; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. tab. 26. All. Fl. Ped.*

In silvis humidis, Autumno.

margaritaceus. A. caulescens, plerumq. solitarius, carne destitutus; pileo primum fusiformi, dein semiovato, striato, purpureo-griseo, centro fusciscente, tandem campaniformi, margine lacero, revoluti, lamellis nigricantibus, demum atris, fatiscentibus: stipite procero, tereti, fistuloso, fordide griseo, basi bulboso; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. tab. 216. All. Fl. Ped.*

In sylvis inter folia, & in lignis putridis.

rufo-candidus. A. caulescens, plerumq. solitarius, non carnosus; pileo primum cylindraceo, e rufo-candicante, striato, demum planiusculo, fusco, margine lacero, revoluti, fatiscente; lamellis nigrescentibus, demum atris, deliquescentibus: stipite valde procero, tereti, fistuloso, contorto, albido, basi bulboso; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 201. All. Fl. Ped.*

Ad caudices arborum, Autumno.

acuminatus. A. caulescens, solitarius, non carnosus; pileo conico, pallide murino; lamellis nigrescentibus, demum atris: stipite tereti, gracili, fistuloso, atro-rubente, basi bulboso; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 202. All. Fl. Ped.*

helveolus. A. caulescens, solitarius, non carnosus; pileo primum conico, tandem campanulato, squamoso; fordide luteus; lamellis terreis, nigro polline infectis, demum atris: stipite longo, tereti, gracili, fistuloso, fusciscente; velo, & anulo destitutus. *Schaeff. fung. T. 4. tab. 210. All. Fl. Ped.*

Ubique nascitur quovis tempore.

1436. BOLETUS. Pileus subtus porosus.

* *Parasitici, acaules.*

1. *agaricoides*. B. acaulis, coriaceus, lævis: poris angulatis, lineari-oblongis, undulatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Fl. Jap.*

In Japonia.

Fungus rotundatus, vel oblong: angulis integris, ferrugineus. *Ad Agaricos parasiticos acaules refert non potest, cum lamellæ non integre, sed sæpius abruptæ, & poris angulati.*

2. *Favus*. B. acaul. subpulvinatus, scaber; setis erectis, ramosis; poris angulatis, patulis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Danksab. 893?*

In China.

Fungus fuscus, planus, vix pulvinatus, supra undiq. hisp. dus, quasi *Lichene rhinogasterino*, parvo, e setis fuscis. Subtus instar savi *Apum* poris magnis, læpe versus basin inæqualibus.

3. *suberosus*. B. acaul. pulvinatus, albus, lævis; poris acutis, diffornibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Betulis.

Memorabilis magnitudinis. Niveus, mollis ut *Spongia*. Coriaceus, convexus, villosus.

4. *fomentarius*. B. acaul. pulvinatus; inæqualis, obrius: poris tereibus, æqualibus, glaucis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Betulis.

An idem cum frequenti? supra albus.

5. *igniarius*. B. acaul. pulvinatus, lævis, durissimus: poris tenuissimis. *Syst. veg. ed. 14. Schæff. fung. tab. 137. 138. Batar. tab. 37. fig. E.*

In Betulis, aliisque arboribus.

Figura fere ungulæ equinæ. Brevis, non latus, crassus, col. supra umbrino, albo, cinereo, zonis discoloribus, subtus albido, etiam purpur. Caro fulva.

Ad insinuandum escam igniariam preparatus; in taleolos factus, molleq: confusus laudatur; apta ratione applicitus ad hæmorrhagias continendas.

6. *cinnabarinus*. B. acaul. pulvinatus; totus intus, & foris ruber. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 304.*

In arboribus.

Fungus horizontal. sessilis, non profunde tubulolus, coccineus, carne coriacea, subrubella, latitud. 1-4 unc.

7. *sanguineus*. B. acul submembranaceus, ruber; poris impalpabilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Surinami.

Fungus latitudine ovi gallinacei, fig. Europæorum, at non pulvinatus, mollior, supra late ruber, zonis obsoletis, subtus sature croceus, seu ruber.

8. *versicolor*. B. acaulis; pileo coriaceo, villoso; zonis discoloribus: poris albis. *Syst. veg. ed. 14. Seracff. fung. tab. 136. tab. 263. atrofuscus tab. 268. multicolor. tab. 269. var. esse videntur. Bass. fung. tab. 35.*

Ad truncus arborum antiquarum.

Decem, & pl. ex eadem radice oriuntur, 1-2-palmar. supra ex luteo, & coccineo variegati, nigro hinc inde ad latera adperso. Caro alba, sicca.

Var. colore in primis zonarum, luteo-rubro-spaldico, vel cæul. Varietas etiam tota flava; vel tota cinerea.

9. *suaveolens*. B. acaul. superne lævis (pilis gossypinis obtusus), falicius. *Syst. veg. ed. 14.*

In Satice.

Convexus, candidus, odore suavi,

10. *larymans*. B. acaul. coriaceus, aurantiacus, rugoso-reticulatus; fascia marginali, lata, nivea, fornicata. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. n. tab. 8. f. 2.*

Habitas

Crusta corii similis, sæpe ampliff. in pl. semielliptoid. divisa, lenta, sicca, crassitie unius, alteriusve lineæ subtus asseri instrata, alba, sicuti caro, lævis, nullis poris pertusa, superne inæqualis, rugosa, reticulata, aurantiaca, fascia marginali lata, convexa, nivea, guttas aqueas lacrymante. Simil. portiones complures contiguæ visebantur dimidiam spithamam longæ, quandoq. pl. in unam lobatam confluentes.

11. *Medulla panis*. B. crustaceus, albus, effusus, difformis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 11.*

Agaricus &c. Mich. gen. tab. 63. f. 2.

X iv

Polyporus. Hall. n. 2272.

In sylvis, & cisternis, brumali tempore.

Crusta difformis, lute lignum putr. dum obdu-
cens, & terram, col. flavo-albido. *Videtur*
adultus, ob odorem panis.

** *Stipitatus.*

22. *perennis.* B. stipitatus, perennis: pileo utrimq. planiuscu-
lo. *Syst. veg. ed. 14.*

Fungus &c. Vaill. parif. tab. 12. f. 7.

*In sylv. super terram, subiectis candidicibus arbo-
rum putridis.*

Lignosus. Pedem altus, 2-unc. latus, su. erfi-
cie inaequali, cum lineis semicircularibus.

23. *rugosus.* B. stipitatus, perennis: pileo subdimidiato. *Syst.*
veg. ed. 14 Jacq. Austr. 2. tab. 169.

In putridis arborum truncis.

Lignoso-coriaceus. Stip. badius, verni e veluti
obductus. Pileus planus, rugosus, primum ex
rubro badius, & nitidissimus, tandem hepati-
cus, minusq. nitens; intus holosericeus, cin-
namomeus.

24. *leptosephalus.* B. stipitatus; pileo pleno, tenui, supra cervi-
no, subtus albo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc.*
2. tab. 12.

Habitas

25. *vicinus.* B. stipitatus; pileo pulvinato, viscido; poris
teretibus, convexis, immerfis, distinctis: sti-
pite lacero. *Syst. veg. ed. 14.*

In sylvis.

Totus flavus, poris lividis. Stip. anulo lato,
persistente. Pileus crassus.

26. *luteus.* B. stipitatus; pileo pulvinato, subviscido; poris
rotundatis, convexis, flavissimis: stipite (longo,
anulato) plerumq. albido. *Syst. veg. ed. 14.*
Schaeff. fung. tab. 114.

Fungus &c. Bush. cens. 5. tab. 14.

In sylvis, & pratis, Autumno.

Stip. memorabilis magnitudinis, apice dilata-
tus, terrei col. superne etiam flavus, aut
sanguineus. Anulus crassus, latus, viscidus.
Pileus crassus, col. leonino, fusco, vel ter-
reo. Caro trita coerulefcit. *Fidulis.*

27. *bovinus.* B. stipitat. pileo glabro, pulvinato, marginato;
poris compositis, acutis; porulis angulatis.

brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 112. b. tab. 107. c. tab. 103. d. tab. 134. & 104. & tab. 103. f. tab. 103.*

In pratis, & sylvis apricis.

Stip. terreus, vel lineis sanguineis variegatus, & neque purpur. Pileus amplus, parabolicus, supra fulvus, flavus, fuscus, leoninus, terreus, virescens; interne flavo-virecens. Caro mollis, & flava. *Eduis.*

18. *granulosus.* B. stipitat. pileo viscido, pulvinato; poris teretibus, subangulatis, truncatis; anulo granulato. *Syst. veg. ed. 14.*

In foliis.

Stip. flavus, pileo brevior. Pileus carnosus, lividus, margine acuto cinctus: pori diffusi, flavi, margine laterali ad angulos, quasi farinæ particula foliaria, pucti.

19. *subtomentosus.* B. stipitat. pileo flavo, subtomentoso; poris diffusi-
formibus, subangulatis, planis, fulvis; stipite flavo. *Syst. veg. ed. 14.*

In foliis.

Stip. læviscul. Pileus convexus, carnosus.

20. *subsquamosus.* B. stipitat. pileo subalbido; poris diffusi-
formibus, oblongo-flexuosis, niveis. *Syst. veg. ed. 14.*

In foliis.

Irregulariter Agriici more exerceat. Stip. brevis, glaber, aut venoso-reticulatus. Pileus magnus, convexus, carnosus.

21. *ramosissimus.* B. stipitat. ramosissim: pileis numerosis multiens. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 172. Schaeff. fung. tab. 111.*

In Quercubus putridis, & secus vias, locis apricis.

Sæpe magnus; stipite brevi, & crasso. Fungus fuscus, & villosus, extus totus albidus. *Eduis.*

22. *dimidiatus.* B. stipitat. perennis; pileo dimidiato, undulato, lævi; poris albis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 39.*

In Japonia.

Rad. truncata, nodulosa, Stip. flexuoso-erectus, subteres, nodos-inequal. nolis rotundatis, compressis; substantia coriacea, renaci, glaber, ferrugin. sesquidigit l. crassitie digiti crassioris. Pileus margine altero,

nec in centro insertus, subhorizontal raro integer, plerumq undulatus, submarginatus, coriaceus, supra convexus, ferrugineo-nitridus, margine luteo; subtus parum concavus: sesquipoll. long. 2. pollic. latus.

- hirsutus.* B. totus superne rufus; papillis hispidus, margine calvus: porulis tenuissim. albidis, aut albo-rufis. Scop. Fl. Carn.
In truncis, & corticibus arborum.
 Expansio semicircul. 2-unc. lata, solitaria, & multiplex, pulvinata. Quandoq. vix hirsutus, tubulis rufescentibus.
- fulvus.* B. totus fulvus; poris difformibus. Scop. Fl. Carn. Proximus *Po'yporus* Hall. helv. n. 2277.
In Cerasis recenter detruncatis.
 Junior integerrim: adultior margine sinuatus.
- caudicinus.* B. acaul. pileo rugoso, lobato; tubulis tenuissimis. Scop. Fl. Carn. Batt. fung. tab. 34. b. Schaeff. fung. tab. 131. 132.
Ad caudices arborum.
 Multiplex, amplus, carnosus.
- Var. 1.* superne testaceus, & maculis obscurioribus variegatus, subtus albicans.
 = 2 superne flavo-croceo-rubroq. varius, subtus flavus. Batar. tab. 34. fig. B.
In Ceraso.
 Perniciosus. Diamet. spitham. Caro fragilis, alba.
- Var. 3.* superne flavus, subtus obscurior. Stip. unc. Pileus diamet. 4 6. digitorum transversorum: caro fusca.
In Abete.
- fuliginosus.* B. fusco rufus, margine fasciis nigricantibus. Scop. Fl. Carn.
In truncis prope radicem.
 Cespitosus, semiped. latus, fere lignosus, supra hispidulus, margine sinuato, & plicato.
 B. (*Po'yporus*) crustaceus, albus, undis crispatis. Hall. helv. n. 2273. Vaill. parif. tab. 8. f. 1.
In resedis arboribus.
 Omentum *Vituli*, aut *Ovis* expansum omnino refert. Crusta lata, passim in iuga crispa eleganter revoluta, planitie alba, iugis flavescen-

tibus pinguedinosus, strias omenti referentibus.

- B. (*Polyporus*) crustaceus, purpureus. *Hall. helv. n. 2274.*

Lignis rescis adhæret.

Crusta multiformis, plana, rotunde lobata, poris subtilibus plena, supra purpurea. Color purpur. aut albus, limbo purpureo; etiam cœruleus.

- B. (*Polyporus*) crustaceus, albidissimus; poris maximis. *Hall. helv. n. 2275.*

In ligno putridissimo.

Ad Favi modum superne perforatus.

- B. (*Polyporus*) frondosus, cespitosus, imbricatus, spadiceus; poris albidis. *Hall. helv. n. 2276. Sterbeck, tab. 28. A. Barr.-L. ic. 1268. Schæff. fung. tab. 129. & forte 128.*

In Helvetia.

Fungus pulcherrimus. Cespites densissimi, sesquiped. similes ornamentis foliaceis, quæ de cassidibus insignia dependentia pinguuntur: totus lobis planis constans, divisus, & subdivisus, imbricatis, sæpe deflexis. Superficies superior fusca, sæpe cum flavedine mixta, lineata, lævis. Inferne plana, & alba superficies, vel terreo col. Caro succulenta.

- B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus; poris amplissimis, albidis. *Hall. helv. n. 2278. Schæff. fung. tab. 101. 102.*

Ad arbores, & in sylvis.

Pede longior, mollis, supra ochroleucus, cutelacera in squamis efflorescente nigricantes, & reflexas. Pori marginibus serratis; sæpe etiam imbricati, & reticulati.

- B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus, spadiceus; poris fulvis, latioribus, angulosis. *Hall. helv. n. 2279.*

In caudicibus arborum.

Squamæ crassæ, semiellipticæ de ligno prodeunt. Pori laceri.

- B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus, albidissimus, superne hirsutus, poris latioribus. *Hall. helv. n. 2280. Buxb. cens. 5. tab. 5.*

Ad Arbores.

Squamæ grandes, semiellipticæ. Pori difformes.

B. (*Polyporus*) sessilis, hirsutus, superne fuscus; poris albis, tenuissimis. Hall. *helv.* n. 2281. *Videtur Batar. fung. tab.* 35.

Ad arbores.

Minor priore. Pori quandoq. violacei.

annulatus.

B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus, anulis vericoloribus; poris albis, tenuissimis. Hall. *helv.* n. 2283. *Buxb. cent.* 5. *tab.* 1. *Schaeff. fung. tab.* 106. *tab.* 136.

Ad Arbores frequens, præsertim Mali, & Pyri.

Lineæ vericolor. ut in B. *vericolore*. Squamæ latæ, ellipticæ, matura durissima, & immarcescibili. Color in senio in fuscum & nigrum degenerat. Pori parvi, albi, dein fusci. Caro crassa, alba, spongiosa.

B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus, minutus. Hall. *helv.* n. 2285.

In alpibus.

Simil. B. igniario, sed minor. Color utrimq. minutus.

B. (*Polyporus*) sessilis, cespitosus, convexo-planus, hirsutus, fulvus. Hall. *helv.* n. 2286.

In Helvetia.

Ad terram cum Quisquiliis intricata massa, innumeris squamis imbricatis, supra hirsutis, & fulvo colore subvaccino; subtus poris tenuibus, & albis; carne dura, ad fomitem apta.

B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus, farinosus. Hall. *helv.* n. 2287.

In Cerasis non infrequens.

Ambitus semicircular. *Agarici officin.* facie, per ætatem difformis, amplissimus. Facies supra glabra, alba. Caro farinosa, fragilis, albiissima, friabilis, subfoetida, subamara. Tubuli laminis subfuscis, terminati in poros tenuissimos, fuscis.

Nullo modo videtur ex hoc fungo somes parari posse, cui nulla sit tenacitas.

B. (*Polyporus*) sessilis, convexo-planus, laciniatus, flavus, imbricatus, & cespitosus. Hall. *helv.* n. 2291. *Batar. Fung. tab.* 87. *G. Schaeff. Fung. tab.* 110. f. 10.

Pessim in cavis arboribus.

Supra lacte flavus, subhirsutus; subtus concolor.
In centro amat nigricare, col. anthracino.

B. (*Polyporus*) sessilis; petiol. horizontali. Hall.
helv. n. 2292. *Botar. fung. tab. 37. A. Schaeff.*
Fung. tab. 120.

Ad arborum truncos.

Siccus, & immarcescibilis. Priori proximus. Ambitus reniformis, supra cervinus, etiam striatus, ex cervino, & luteo varius. Pori albi, vel lutei, & subvirides.

hepaticus.

B. (*Polyporus*) sessilis; carne secedente, mollis, crassus, sanguineus, obscure lobatus. Hall.
helv. n. 2315. *Mich. gen. tab. 60. Schaeff. tab. 117. 118. 119. 120.*

In truncis mortuis.

Hepati non dissimilis. Cutis striata, sapore rubra. Tubuli rosei, extremi pallentes. Caro purpur. Edulis.

B. *pelliceus*. Dana. *Misc. Taur. T. 4.*

An *Agaricus coriaceus*, faginus, hamathoides. *Gagnebin?* Hall. helv. n. 2290.

Inter fissuras marcescentium *Laricum*.

Pellem ovinam rite præparatam refert mollitie, consistentia, & tenacitate, albidam. Nullis peltis præditus est, aut laminis floriferis. Superficies ligno obiecta, tenuissime est striata, sed hæc striæ sunt impressiones fibrarum lignosarum; cæterum superficies plerumq. lævis est, interdum striata, & rugosa. Interne substantia est fungosa. Soli, aeri aperto, vel pluviae diu exposita, indurescit, & siccatur.

Sapor amarus, & substipticus. Odor vix ullus. Ad sanguinem sistendum in quocumq. casu commendans Incolæ, parti affectæ applicatum, vel intus susceptum; in dysenteria, mensium fluxu nimio, hæmorrhoidibus potissimum, suppositorii modo. Usus præcipuus fit ad emplastrum de Pice burgundica recipiendum adversus dolores quoscumq. rheumaticos, præsertim vero lumbares. Ad Ophthalmiam saliva ipsa emollitum, oculis applicans.

strobiliformis. B. stipitatus, coriaceus; poris tenuissimis: stipite laterali. *Leyser.*

Habitat

Stip. uncial. niger, quasi vernice oblinitus. Pi-

leus lævis, oris undulatis, & contractis, cer-
vinus, avellanaceus, oris albis. Pori obicure
cinnamæi. *Natura dura, & perennis.*

coriaceus.

B. pileo orbiculato, plano, supra lineis concen-
tricis distincto; centro excavato: stipite bre-
vi, tenui. *Scop. Fl. Carn. charff. fung. tab.*
125.

In foliis.

Coriaceus: superficies lanuginosa.

Var. 1. col. *Nicotiana glauca*; pileo centro
depresso. *Mick. gen. tab. 70. f. 9.*

Diameter pilei uncial. stipite brevior.

Var. 2. col. f. f. violac. & atro-castaneo. Pi-
lei diameter 2-unc. ad oras subvirescens:
stipite longo.

In argilla.

Var. 3. Pileo cyathiform. tubulifq. fuscis: fasciis
ferrugineis; extrema tuta.

Stip. brevis, ferrugineus, sericeo nitore nitens.
Pileus latus.

umbilicatus. B. (*Polyporus*) petiolatus: pileo fusco, depres-
so. *Scop. Fl. Carn. Hall. 1299. idem videtur*
Mick. tab. 70. f. 9.

In ramulis aridis.

Solitarius. Pileus diamet. lin. 7. absque fasciis,
glaber, vertice umbilicato, porulis albis. Stip.
longus, pileo corcolor.

rubelliformis. B. subtilis sublignea; circumscriptione renifor-
mi; superficie glabra. *Scop. Fl. Carn.*

Scop. Fl.

Var. 1. pileo rufescente, subtus albo luteo.

Agaricus &c. *Batar. Fung. tab. 37. A.*

In Tiliis.

Diameter 3. digitor. transversum. Stip. late-
ralis, brevis. Margo pilei fulvo-ruber.

Var. 2. pileo; stipiteq. albis; porulis cinereis.

In Aino.

Statura prioris.

imbricatus. B. coriaceus, multiplex, tenuis, margine lobat-
us, superne subhirsutus, & fasciis concentra-
tibus bicoloribus variegatus. *Scop. Fl. Carn.*

Var. 1. Familia in orbem disposita, ad instar
Rosa.

Agaricus. *Batar. Fung. tab. 31. f. A.*

In truncis.

Supra sericeus, subtus albidus.

Var. 2. Familia sparsa, in orbem non expansa; facta lobis flabelliformibus, subtus inperforatis.

Mich. tab. 67. f. 2. videtur.

In truncis.

Superne rufus, hirsutulus, subtus albidus.

B. (Polyporus) petiolat. niveus; alveolis subtus quadrangulis. *Hall. helv. n. 2295.*

In sylvaticis montosis.

Stip. brevissimus. Pileus planus, convexus, crassus. In nigram putredinem continuo dissolvitur.

B. (Polyporus) petiol. & pileo reticulatis, albivirid. alveolis subtrus reticulatis, terreis. *Hall. helv. n. 2296. Mich. gen. tab. 71. f. 2.*

In Helvetia &c.

Simil. priori. *Stip. brevis*, umbrinis lineis pictus. Pileus semiped. convexus. Subtrus pori magni, difformes, quadrati, angulosi.

B. (Polyporus) petiolat. cespitosus, ramosus, lobatus, spadiceus, subtus albidus. *Hall. helv. n. 2297.*

In sylvis Abiegnis.

Stip. cavus, niger. Pileus elegans, lacer, excavatus, oris lacteis; carne pauca; poris, & tubulis brevibus, albidis.

B. (Polyporus) petiol. curvo: pileo pulvinato, albo. *Hall. helv. n. 2300.*

Ad ligna putrida.

Stip. uncial. Pileus rotundus, oris contractis.

B. (Polyporus) semipetiolat. lobatus, spadiceus, subtus cinereus. *Hall. helv. n. 2314.*

In sylvis abiegnis.

Pileus oris albidis: poris parvis, reticulatis, subcinereis.

fulvus Schaeff. B. acaulis, solitarius, lignosus; pileo superne convexo, tuberculato, glabro, versicolore, fulvo, & purpurascens; inferne plano, ochroleuco, seu pallido, tubulis non secedentibus, rotundiusculis, pallidis, seu ochroleucis. *Schaeff. Fung. tab. 262. All. Fl. Ped.*

Ad caudices arborum exsiccatorum.

Agaricum. B. All. Fl. Ped.

Polyporus sessilis, convexo-planus; annulis dif-

coloribus, fulvis: poris ochroleucis. *Hall. herb. n. 2284.*

Azaricum, seu *Fungus Laricis*. *Bauh. pin. Mich. &c.*

Tart. innascitur, frequentius in alpinis.

variegatus. B. tuberculis, solitarius, ligrosus; pileo semieliptico, convexo, punctato, margine repando, lobato, vel etiam plicato, diversicolore, falcis concentricis, pallidis, citrinis, aureis, rufis, fuscis; tubulis sordide albis, seu leucophæis, poris, diffinis, non secunditis: stipite brevi, distorto, crasso, fusco, aut nullo. *Schæff. Fung. tab. 263. All. Fl. Ped.*

Super truncos arborum.

ovatus. B. *Schæff. Fung. tab. 133. All. Fl. Ped. Polyporus &c. Hall. herb. 2305.*

In umbrosis sylvarum positis.

Crassius, superne sordide rubens, inferne dilute luteus. *Edulis.*

1437. *HYDNUM*. Fungus horizontalis, pileatus, subrus echinatus.

1. *imbricatum*. H. stipitatum; pileo dein convexo, imbricato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 276. Schæff. fung. tab. 140. b. tab. 273.*

Erinaceus &c. Mich. gen. tab. 72. f. 2.

In sylvis acerosis, & truncis arborum.

Amplum, a humo, quandoq. fuscum; aculeis ceruinis, cæterum conicis. Stip. cylindricus, ad basin crassiuscul. sæpe tuberosus. Pileus primo rotundiuscul. Sæpe informis. *Edule.*

b. uni-2-color. Stip. invert. conicus.

2. *repandum*. H. stipitat. pileo convexo, lævi, flexuoso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 310. Schæff. fung. tab. 141.*

b. tab. 318.

Erinaceus &c. Dill. giff. tab. 1. Mich. gen. tab. 72. f. 3.

In sylvarum desertis.

Difforme, & laciniatum; liccum, & fragile. Stip. albidus, terreus, vel ex albo flavus; superne albo-pustulatus. Pileus supra dilute rufus, etiam miniatus, tandem flavus. *Edule.*

3. *tomentosum*. H. stipitatum; pileo plano, infundibuliformi (to-

men-

mentoso). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 534. f. 3.*

In sylvis acerosis.

Stip. fulvus. Pileus coriaceus, fuscus, aut cinereus.

4. *auriscalpium.* H. stipitatum; pileo dimidiato. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. Fung. tab. 143.*

Erinaceus &c. *Mich. gen. tab. 71. f. 8.*

Fungus &c. *Buxb. cont. 1. tab. 57. t. 1. Buxb. Hall. helv. tab. 129.*

In sylvis acerosis supra terram, subiacente ramulo, aut strobilo.

As var. H. imbricati?

Color buxus. Parvum, hirsutum, siccum. Stip. basi bulbosa. Pileus reniformis, planus.

5. *gelatinosum.* H. stipitatum, gelatinosum; pileo dimidiato; supra glaberrimo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Aufz. 3. tab. 239.*

In truncis, & deciduis arboribus.

Massa mollis, madida, tremula ad instar gelatinæ, difformis, primum albida, dein glaucescens; aculeis brevibus, & pallidioribus.

6. *parasitum.* H. caule, arcuato-rugosum, tomentosum. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 465.*

In Europæ arboribus.

suaveolens. H. (*Boletus*) pileo coriáceo, plano, rugoso, viscido; aculeis violaceis: stipite brevi, crasso. *Scop. Fl. Carn.*

Circa Adriam.

Odor *Lavandulæ*. Pileus palmar. & ultra, circa medium albicans.

Coralloides. H. stipite ramoso; ramis ultimis subtus echinatis. *Scop. Fl. Carn. Schaeff. fung. tab. 142.*

Erinaceus &c. *Mich. gen. tab. 64. f. 2. huic accedit.*

In truncis arborum, in sylvis collinis.

Variat dentibus erectis, & facie crispis. Edule.

Clathroides. H. *Pall. is. 2. tab. K.*

In truncis putridis Dauriæ.

Stirps cinerascens, strigosa, mollis, subcoriacea, tota altero latere nuda, p. pillis minutis muricata; altero latere per truncum, & ramos omnes villis aliquot hirs. Truncus a basi multifid. ramulissim. ramis fascialibus.

Tom. VI.

Z

H. (*Echinus*) sessile, albicans; squamis ellipticis, superne villosis. *Hall. helv. n. 2316. Plum. Filic. tab. 169. A. Mich. gen. tab. 64. f. 3. 4. 5. Schaeff. Fung. tab. 144.*

Ad truncos arborum, & in sylvis.

Squamæ crassæ, convexæ, subius planæ, imbricatæ. Facies convexa, ochroleuca, aut dilute vaccina, tota villosa. Caro alba. Subtus laminæ sescun. longæ, pendulæ, albæ, apice recurvo, flavo.

K. (*Echinus*) squamis ellipticis; aculeis longissimis. *Hall. helv. n. 2318.*

Circa ramos Pinorum.

Siccus erat niger. Acul. semunc. diffformes, simplices.

cyathiforme. H. (*Echinus*) infundibulif. rufum, intus anulatum. *Hall. helv. n. 2320. Sierbeck. tab. 27. lit. I. Mich. gen. tab. 72. f. 4. Schaeff. Fung. tab. 139.*

In alpinis, & montanis, locis muscosis ad arborum truncos.

Planta cespitosa, lignea. Prima facies est *Clavaria*, dein. infundibulum refert. Stip. cervinus. Infundibulum extus papillosum, dein aculeatum; intus rariter hirsutum, squamosum, ex cinneo-cervino, & nigricante colore alterne distinctum.

H. (*Echinus*) crystallinum; petiolo crasso, pustulato. *Hall. helv. n. 2322.*

In Helvetia.

Stip. fere bulbosus. Pileus obliquus, vel rectus, pulvinatus, lævis, inferne conicis aculeis asper. Totum gelatinosum est.

H. (*Echinus*) petiol. hæmis, hærico; aculeis ovatis. *Hall. helv. n. 2323.*

In sylvis.

Stip. semunc. altus, albus. Pileol. spadiceus, nitens.

1438. PHALLUS. Fungus supra reticulatus; subtus lævis.

1. *esculentus*. P. pileo ovato, celluloso: stipite nudo, rugoso. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. Fung. tab. 199. 298. 299. 300.*

Boletus &c. Tourn. inst. tab. 329. f. A. Mich. gen. tab. 85. f. 1. 2.

Fungi esculenti &c. Clus. hist. 2. p. 164.

h. pileo bicolli. Fl. Dan. tab. 83.

In sylvis antiquis, & pascuis.

Color læne totus fuliginosus, Volva destituitur.

*Ital. vulgo Spugnole, aut Spungignole. Edu-
lia.*

Var. pileo subrotund ovato, vel conico.

2. *Impudicus.* P. volvarius, stipitatus; pileo celluloso, (utrimq.
pervio). Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 175.
Schæff. fung. tab. 196. 198 A 7 t. 1732.
tab. 2 f. 1. Mich. gen. tab. 83. Dalech. hist.
1398.

In sylvis collium.

Stip. semiped. albus. Volva ovalis, lacero-mul-
tistida, alba. Pileus conicus, albus. *Fructifera
est. tempore odor cadaveris.*

3. *Makusii.* P. volva radicali; stipite pentagono; pileo acu-
to, 4-part. laciniis conniventibus. S. H. v. g.
ed. 14. Lin. Suppl. Ad. pictrop. Vol. 19.
tab. 5.

In China, prope Pekin.

Fungus substantia molli, tenella, alba, crescens
sere ut *P. impudicus*. Volva 2 3-fid. stipitem
vaginans. Stip. volva longior. Pileus subu-
latus, subangulatus, ruber, laciniis aequali-
bus, subularis.

Noxius, sed præstans remedium in ulceribus can-
crosis, externe adhibitus.

Vallisnerianus. P. volva ovata, extus purpurasc: pileolo cel-
lulato, ac superne umbilico pervio ornato.
Mich. gen. tab. 83. f. O. P.

In Hetruria.

Antequam e volva erumpat, magnitudo, & fig.
Ovi gallinæ, corrice crasso, subrub-cundo,
& rugoso, quo parte subsidit; albidus qui su-
perest. Quo detracto, orbis sequitur materia
viscida, mucosa, & subalbida refertus, cras-
sus si ad totius diametrum referatur trientem;
separaturq. ab interno corpore membrana ex-
tus albida, intus candida, crassa quidem, &
firma. Hæc radicibus originem præbet diffu-
sis. Alter deinde venit orbis densioris substan-
tiæ, colorisq. obsoleti, & pulli. Porro orbis
inferior, quæ radicibus subest, efficit; &
membrana illa exterior, ex qua radices ori-

untur, toto eo intervallo, quod a materia orbis secundi inane relinquitur, alteri, & interiori membranæ adhæret. Corpusculum inest internum, solidum, oblongum, candidum (nucleus adparens), in cuius centro adest cavea, eodem linco referta, insipido. Ex qua membrana, seu volva pedunculus exit albus, pileo nigro.

exilis.

P. Bator. Fung. tab. XL. f. F.

In agro Romano, inter putrida, Grumataq. folia.

Ex volva erumpit coriacea, albida; in cuius sinu humor albus, mucilagineus. Hinc stipes clavam referens surgit, spongiosus, & interne cavus; in parte super. extus lævis, intus plenus. Circa apicem crusta quædam callosa obducitur, primum rubra, at maturo fungo, apice virescens erat, dein totum instar zonæ rubentis adparebat. Infra hanc zonam reliquum stipitis albo sædo erat tinctum, & variis subrufis maculis superficialibus adpersum. Post maturitatem vero in foetidum liquorem totus abit.

crispus.

P. stipit. crasso, albo, rimoso, & cavernoso: pileo plicato. Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 86. f. 7. Schæff. fung. tab. 154. Batar. fung. tab. 2. f. G.

In silvis.

Monacella.

P. stipit. lævi, cylindrac. fistuloso, lamina fusca, varie plicata, & crispa. Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 86. f. 8. Schæff. fung. tab. 159. 160. 161. 162.

In truncis.

Stip. subunc. rubellus. Pileus est lamina, linteo complicato similis.

1439. CLATHRUS. Fungus subrotund. reticulatus, cancellatus.

* *Acaules.*

q. cancellatus. C. acaul. subrotund. Syst. veg. ed. 14. Schæff. fung. tab. in titulo expressa. Mich. gen. tab. 94. Col. ecphr. 1. tab. 336. Gled. Fung. 140.

Boletus &c. Tourn. Inst. tab. 319. f. 6.

In Europa australiori.

Volva extus alba, intus ferruginea, fere coria-

cea, sublinens craterem ovatum, cinnabarinum. *Odor cadavericus.*

** *Stipitata.*

2. *denudatus.* C. stipitatus; capitulo oblongo, volvato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 6.*

Trichia &c. Hall. helv. tab. 48. f. 6.

Clathroides &c. Mich. gen. tab. 94. f. 1.

In Europa australi.

Plantula cinnabarina. Rupro cortice emergit elegans capillitium, & in Ovi speciem se spargit, semenq. pollineum excutit, eiusdem col. Una pars testæ superior, decedit; manet in stipite pars testæ inferior, inanis, hemisphærica.

3. *nudus.* C. stipitatus; capitulo oblongo, axi longitudinali adnato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 216.*

Clathroidastrum. Mich. gen. tab. 94.

In Italia lignis putridis.

4. *recusitus.* C. stipitatus; capitulo globoso, glande ovali. *Syst. veg. ed. 14.*

In Syria truncis arborum.

Stip. brevis, abis.

- hydriensis.* C. Hacque. *Pl. alp. Carn. tab. 2. f. 4.*

In Carniola, semiputridis arboribus innascitur, ad radices.

Fungus mediocr. magnitudinis, subtriangul. mollis, subcoriac. Stip. crassitie digiti minimi, subovatus, curvus, durus, membrana albida obtusus, substriatus, niger, villosus. Pileus figura triangul. coloris brunneo-nigri, subtus lamellosus, labyrinthifor. superne nodis distinctus, quorum figura fructibus *Pini Pinæ* similis est. Substantia spongiosa. *Odor putridus.*

1440. *HELVELLA.* Fungus turbinatus.

* *Stipitata.*

1. *Mitra.* H. pileo deflexo, adnato, lobato, difformi. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 116. Schaeff. Fung. tab. 154. 159. 162. Gled. fung. 32. C. Fungoides &c. Mich. gen. tab. 86. f. 7. Fungus &c. Menz. pug. tab. 6.*

In truncis putridis.

Fungus albidus, & brevi villo sericeo toso famili aspersus. Stip. crassus, fistulosus, rimosus. Pileus crispus, laciniatus, & varie complicatus, Episcopali Mitræ non dissimilis. *Educis.*

“ *Acaulis.*

2. pineti. H. acaulis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pinu, Abiete.

1441. PFZ1- ZA. Fungus campanulatus, sessilis (plerumque); caveam fere aliquam continens: qua nota ab *Agaricis* differat. Hall.

1. lentifera. P. campanulata, lentifera. *Syst. veg. ed. 14.*

Fl. Dan. tab. 106. Schaeff. fung. tab. 180.

Cyathoides &c. Mich. gen. tab. 102. f. 1.

Fungoides &c. Vaitl. paris. tab. 11. f. 6. 7.

Fungus &c. Pluk. phyt. 184. f. 9. Loes. pruss.

tab. 16. Boeci. mus. 1. tab. 301. f. 1. Menz.

fung. tab. 6.

b. Cyathus &c. *Fl. Dan. tab. 469. f. 1.*

Peziza hirsuta. Schaef. fung. tab. 178.

In aeris, lignis, sepimentis, quæ putrescere incipiunt.

Extus fusca, sericea; intus pallida, glabra, coriacea. Juniori plantulæ globulus est fulvus, villosus, Lycopodii simiis. paulatim secudit superne membrana villosa, quæ infundibulum clauderebat, & nudat caveam glabram. Color dilute cinereus.

2. punctata. P. turbinata, truncata, disco punctato (punctis nigricantibus). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 288*

Elvela &c. Gled. Fung. 44. n. 7.

Muscus &c. Boeci. mus. tab. 107.

In tercore equino solum.

An v. r. Boeci? Stip. niger. Discus 3-lin. diamet. albus.

3. cornucopia-idea. P. infundibuliform. disco patente, reflexo, sinuato, punctato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 384. Schaeff. fung. tab. 165. & 166. Elvela punctata.*

Fungoid ster &c. Mich. gen. tab. 81. f. 5. 6.

Elvela &c. Gled. fung. 41. b.

Fungoides &c. *Vaill. paris. tab. 13. f. a. 3.*

In sylvis.

Fungus cespitosus, membranac. lacunosus. Junior cylindricus, dein infundibulifor. extus subviolac. intus fuscus, punctatus. *Caulescent est cum sequenti.*

Ad Elvela genus spectat.

4. *Acetabulum*. P. cyathiform. extus angularata, venis ramosis. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 150. 155. 156.*

Elvela &c. Gledit. fung. 4. 2.

Fungoides &c. *Vaill. paris. tab. 13. f. 1. Buxb.*

Ad. 4. tab. 29. f. 1. 2. Mich. gen. tab. 86. f. 1.

In Europa australi, iuxta vias, locis humidis.

Fungus variabilis; fulvus, flavus, sanguineus, albus, cinereus; semper pellucidus. *An var.*

A. Cantharelli?

5. *cyathoides*. P. cyathiformis; margine obtuso, erecto. *Syst. veg. ed. 14. Raii. Angl. 3. tab. 24. f. 4.*

In Terra.

Magnitudo sem. *Vicia cracca*. Color aurantiacus.

6. *cupularis*. P. globofo-campanulata; margine crenato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 469. f. 3.*

Fungoides &c. *Vaill. paris. tab. 11. f. 1. 2. 3.*

In Gallia, Helvetia &c.

Glandis cupulam refert. Color extus spadiceus, intus albus. Caro cerea, & fragilis.

7. *scutellata*. P. plana, margine convexo, piloso. *Syst. veg. ed. 14. Raii. Angl. 3. tab. 24. f. 3. Vaill. paris. tab. 13. f. 14.*

Elvela &c. Schaeff. fung. tab. 284. Gledit. Fung. 45. b.

Fungoides &c. *Vaill. paris. tab. 13. f. 13. Mich. gen. tab. 86. f. 19.*

In parietibus putridis, & lignis.

Magnitudo *Lentis*, aut *Pisi*. Discus aurantiacus; in senio coccineus. Margo pilis nigricantibus.

Ad Elvela genus spectat.

8. *minima*. P. plano-convexa, margine nudo: stipite brevissimo. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1772. p. 82.*

Hudib.

9. *cochleata*. P. turbinata, cochleata. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. Austr. tab. 10.*

Fungoides &c. *Vaill. parif. tab. 11. f. 8.*

In umbrosis.

Simil. *Auricula Jude*. Expanditur ad formam palmarem; intus rufescens, extus candicans, & quasi tatinosa.

10. *Auricula*. P. concava, rugosa, auriformis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 334—Vaill. parif. tab. 11. f. 8.*

Elvela &c. *Gledif fung. 39. n. 3.*

Agaricum &c. *Mich. gen. tab. 66. f. 1.*

Fungorum pernicios. genus 1. *Clus. hist. n. p. 276.*

Ad arbores putridas.

Frons cespitosa, membranacea, hinc semelipitica, inde quasi incisa. Fructificationis tempore superne cinerea, & villosula, subtus obscurior, glabra.

Ad Elvela genus sp. d. t.

11. *coronaria*. P. cyathiformis, utrimq. glabra, limbo laciniato, erecto. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 10.*

Habitat . . .

gelatinosa. P. (*Helvella*) stipitata, pileo campanulato; & umbilico depresso. *Necker. Gallia-belg. Vaill. parif. tab. 13. f. 7. 8. 9. optime.*

In sylvis mucosis.

Stip. pollicar. & ultra, fistulosus, flavescent. Pileus obscure fulvus, lævis, margine revolutus.

coccinea. Jacq: P. Jacq: *Austr. tab. 163. Schaeff. fung. tab. 148.*

In tritum putridis ramulis, in sylvis udis.

Sessilis, vel stipitatus. Fig. pilei varia, sæpe Acetabuliformis, plana, aut concava. Magnitudo diversa. Extus pallidus cum lævi flavedine; margo pallidus; intus cinnabarinus.

lubrica. P. (*Helvella*) gelatinoso-fibrosa, uncial. udis, cespitosa, flavescent. *Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 82. t. 2.*

In sylvis.

Stip. cylindricus, apice dilatatus. Pileus flavus,

cum aliquo virore, margine inflexo; centro depresso.

laciniata. P. (*Helvela*). Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Substantia dura, & persistens. Fungus 3-unc. albo, fuscoq; colore varius, margine laciniato, laciniis undiq; spatis. Stip. angulatus.

Coralloides. P. (*Helvela*) cinerea, conica, scythum Lichenis Coralloidæ referens. Scop. Fl. Carn.

In sylvis.

Semine. solitarius, & fascicularis.

flammea. P. (*Helvela*) sessilis, auriformis, gelatinosa, rubra. Scop. Fl. Carn.

In ramis arborum putris.

Tremula, duriuscula, obscure flammæ, terrestris, 1-2 unc. basi pallidior, obusa, aut emarginata; solitaria, & multiplex.

mucosa. P. (*Helvela*) cespitosa, membranacea, uno versu ochracea; altero pallide flava. Scop. Fl. Carn. Schæff. fung. tab. 66. huc accedit.

In sylvis.

Non longior extimo articulo pollicis, fig. vasis fusorii.

coccinea. Scopul. P. (*Helvela*) intus coccinea; extus una cum stioite, alba. Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 86. f. 3.

In cortice ramularum maritarum.

Stip. solitar. simulæ, cortici adfixas. Scyphus hemisphæricus, aciculæ capite non maior.

infundibuliformis. P. (*Helvela*) tota nivea; stioite brevi. Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 86. f. 14.

In stantibus fœcis.

Scyphus papyro tenuior, candidissimus.

campanulata. P. (*Helvela*) tota fusca. Scop. Fl. Carn. Batsch. fung. tab. 3. f. E.

In Carniola &c.

Lycoperdivides. P. (*Helvela*) fusca, hemisphærica, membranacea, glabra. Scop. Fl. Carn.

In collibus gramineis.

Diameter fere uncial. eademq; altitudo.

lutea. P. (*Helvela*) Scop. Fl. Carn.

In hortiis verno tempore recentè stercoreatis.

Cyathus flavus, margine villosus. Magnitudo Lentis. Vita brevis.

leniformis. P. (*Helvela*) aurantiaca, subtus albida, & qua-

si lanuginosa, minime ciliata. *Scop. Fl. Carn.*
Regla: ante tempore innascitur udis, & emortuis
Arietum ramulis.

Junior convexa, dein plana, tandem concava.

crucibuliformis. P. aurantiaca. *Scop. Fl. Carn.*

Cyathoides luteum, crucibulifor. *Mich. gen. tab.*
 02. f. 3. *cha. ff. fung. tab. 179.*

In locis humidis.

Vasculum coriaceum, crucibulo simile refert.

Fungus junior convexus, clavæ similis: adolescens ostendit onerculum flavum, & filamentosum: adultus operculo delapso est campana ungue digiti auricularis non longior, non striata, neque villosa; corpuscula lentiformia sinu suo fovens.

hirsuta.

P. Bellard. *Obs. Botan.*

Cyatoides &c. *Mich. gen. tab. 102. f. 1.*

In Piedemonte.

P. membranacea, tubæ similis; marginibus erectis, laceris. *Hall. helv. n. 2217.*

In Helvetia.

Cespitosæ tubæ adscendant, col. violac. deinde extus calcario, intus fuliginoso, squamis decedentibus. Orificium laterum, difformiter multifidum, nullo labro.

P. sessilis, infundibulif. extus hirsuta, umbrina; intus nigerrima. *Hall. helv. n. 2219. tab. 48. fig. 8. optima.*

In Helvetia.

Pediculi similitudinem habet, brevem, rugosam; inde dilatatur in cylindri, dein coni similitudinem; paulatim superficies definitur, & cavata evadit. *Var. ore plicato, & rugoso.* Tota planta atra, sticite tamen fusco.

P. terrea; petiolo rugos: acerbulo gracili, hemisphærico. *Hall. helv. n. 2214. Buxb. tab. 29. f. 3 sed stilpes gracilior est. An Batar. tab. 3. ic. C.*

In sylvis.

Caro ceræ modo fragilis. Stip. crassus, rugosus, lariusculus, albus, gerit acerbulum frequenter parum cavum. Color albius, vel terreus: superficies exterior granulis adpersa, rugosa, & plicata.

P. sordide lutea, longe pedunculata; cupula pa-

rabolica. Hall. helv. n. 2213. Buxb. Ad. per-
trop. T. 4. tab. 29. f. 2. necedit.

In Helvetia.

Tota concolor, ex terreo-lutea; stipit. fescunc.
gracili; calyce quam hemisphaerium profun-
diori, parabolico, semunc dianet. & ultra,
per oram subtiliter ferrato, quasi punctato.

P. fusca; petiol. longissimo; cupula hemisphaeri-
ca, reticulata. Hall. helv. n. 2226.

In Helvetia.

Differt a priore, solo reticulo. Spithamea.

P. sessil. hemisphaerica, ora subdentata. Hall.
helv. n. 2229. Mich. gen. tab. 85. f. 18. An
Scharff. fung. tab. 167?

In Helvetia &c.

Extus ex flavo-albicans; intus albo-rufa.

P. atra; cupula hemisphaerica, sessili. Hall. helv.
n. 2230.

In Helvetia.

Tota concolor, atra.

albida.

P. sessilis, hemisphaerica, extus villosa, spati-
cea. Hall. helv. n. 2231. Mich. gen. tab. 86.
f. 4. Schaeff. fung. tab. 181. optima. Batar.
fung. tab. 111. E.

In sylvis.

Magnitudo glandis cupulae, & fere figura; ex-
tus vasculum ex spadiceo-luteum, villis lon-
giusculis hisurum; intus glabrum, albidum,
cum laevi adpersa Viola tinctura.

P. sessilis, tota alba, hemisphaerica, extus vil-
losa. Hall. helv. n. 2232.

In sylvis.

Diamet. semunc duriuscula.

P. infundibuliform. umbrina. Hall. helv. n. 2233.
Mich. gen. tab. 86. f. 10.

In Helvetia.

Cal. extus sature ruber; intus croceus, cum ob-
scuro rubore, ex us striis per longitudinem
excurritur.

P. brevissime petiolata, viridis. Hall. helv. n.
2234.

In sylvis, ad terram putridam.

Differt a priore, col. viridi obscuro, aut flave-
scente; statu sessili; acetabulo parum profan-
do, saepe imperfecto.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

P. flavescens, petiolata; scypho infundibulif.
Hall. helv. n. 2233. *At Mich. gen. tab. 86. f. 13?*

Ex cortice vrgultorum ficcorum.

Minor multo priore. Scyphus conicus, plerumq.
erectus, coriaceus, durabilis. Color flavescens, cervinus, aut albidus. Diameter scyphi sesquilineæ, & lineæ.

P. viridissima, petiolata; scypho infundibulifor.
Hall. helv. n. 2236.

In ligno Querno.

Simil. priori, sed viridissima.

P. minima, alba, petiolata; scypho infundibuliformi. Hall. helv. 2238. & forte 2237.

In Virgultis sticis passim.

Var. col. fusco, subumbrino.

P. nivea, infundibulifor. brevissime petiolata.
Hall. helv. n. 2239. *Mich. gen. tab. 86. f. 15.*

In truncis putridis.

Fungus tremulus, glaber. Natura ceracea, firmula. Col. undiq. niveus. Junior planta in globum contracta, villo niveo. Dein oritur stipes brevis, a scypho non distinctus. Scyphus adultus planus; anulus videtur intus perforatus.

P. pluvissima, e glauco-nigricans. Hall. helv. n. 2243.

In locis similibus.

Humilis, orbicularis, col. a putrescente ligno vix diversa. Diameter intra lineam.

P. plana, sessilis, glauca; extus nivea. Hall. helv. n. 2244.

In truncis putridis.

Var. prioris. Unius lineæ diameter. / *Sedes in Polyporo putrido.*

P. plana, sessilis, miniata, oris ciliatis. Hall. helv. n. 2245.

In hororum ambulacris.

Non est var. P. stellata. Scutellæ fulvæ, carnosæ, sessiles, marginatæ; limbo tumido, piloso.

1441. CLAVARIA. Fungus oblongus, lævis.

* *Indivisa.*

1. *pistillaris*. C. clavæformis, simplicissima. *Syst. veg. ed. 14.*

Schaeff. fung. tab. 169. 171. Gledif. fung. 26.
Vaill. paris. tab. 8. f. 5. Mich. gen. tab. 87.
f. 1.

Fungus &c. Boec. mus. 1. tab. 307.

In sylvis umb. osis.

Pollicar. haq. l. apice dilatata, obtusa, mox flavescens, mox rubescens, vel nitide alba.

2. *cespitosa*. C. cespitosa, caulibus simplicissimis. basi nonnumquam unitis, oblongo-clavatis, fæctis, aquosè luteolis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 12. f. 2.

Habitat

Clavæ cespitosæ, aggregatæ, basi sæpius unitæ, erectæ, 1-2. poll. simpliciss. læves, extus col. argillæ aquosæ luteolæ; intus carne fungosa, compacta, albaq. fæctæ, neque filulosæ.

3. *helveloides*. C. cespitosa, caulibus simpliciss. crassissimis, basi unitis, obverte pyramidalis, striatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 12. f. 3.

Habitat

Substantia coriacea, fungosa, firma, sicca, duriuscula. In corpus abit crassum, constans ex pl. conis inversis, aggregatis, adproximatis, erectis, fæctis, apice plano-truncato, lateribus longitudinaliter striatis, extus fuscescentibus; intus carne alba. Edulis.

4. *militaris*. C. clavata, integerrima, capite squamoso. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 657. f. 1. Schaeff. fung. tab. 290. Vaill. paris. tab. 7. f. 4.

In sylvis australibus.

Primo tenera, lutea, clava albida; inde in Pyri speciem intumescit. Caro alba, vel rubra, extus nigricans.

5. *Ophioglossoides*. C. clavata, integerrima, compressa, obtusa. Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 317. Mich. gen. tab. 87. f. 4. Vaill. paris. tab. 7. f. 3.

Musci &c. Pluk. tab. 47. f. 3.

In sylvis australibus muscosis, humidis.

Color niger. Uncial. & ultra, stipite gracili; clava difformis, excavata, rugosa, plicata. Superficies hirsuta, vel glabra.

** *Ramosa*.

6. *digitata*. *C. ramosa* (conica), lignea, nigra. *Syst. veg. ed. 14.*
Sphæria &c. *Fl. Dan. tab. 405. 540. Weig. Obs. tab. 3. f. 6.*
Lichen-Agaricus &c. *Mich. gen. tab. 54 f. 4.*
In sylvis australibus, & in truncis arborum.
Clava uncial sæpe difformis. Cortex asper, totus rimosus: medulla fibrilosa. Ad Valsam spectat.
7. *Hypoxylon*. *C. ramoso-cornuta*, compressa. *Syst. veg. ed. 14.*
Schueff fung. tab. 328. Weig. Obj. in not. tab. 3. f. 5.
Lichen-Agaricus &c. *Mich. gen. tab. 55. f. 1.*
In cellis, navibus, alijsq. numquam sole ululstris.
Stip. planus, coriaceus, villosus, 2-fid. segmentis dilatatis. Truncus niger, 2. lin. latus, unc. longus, supra medium ramosus, ramis summis obtulis, & minus hirsutis, maxima parte albis, aut cinerascens. Nigra pars plantæ gerit sphæulas negras, apice pervias, seminali polline plenas. Ad Valsam spectat.
8. *cornuta*. *C. ramosa*, ramis simplicissim. conoideis, plano-truncatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. a. tab. 14. f. 2.*
H. hist.
Substantia coriaceo-fungosa, firma, sicca, corpus constituit breve, sessile, crassum, digitato-efflorescens in cornua brevina, crassa, simplicia, subincurva, conoidea, aut cylindracea, obtusissima, & plane truncata, lævia. Color extus nigricans, habitu obductus tincturæ aquosæ violac. Caro intus alba, sed brevi subviolac si pellicula externa dissepatur.
9. *coralloides*. *C. ramis cæstis, rancidissimis, inaequalibus (breviser dentatis). Sp. veg. ed. 14. Schaeff. fung. t. 1. 175. 177. Barr. n. 1260. 1262. 1266. Grev. fung. 31. n. 3.*
Corallo-fungus. Vuill. parif. tab. 8. t. 4.
Coralloides &c. *Tourn. infl. t. 6. 332. f. B.*
Barba capina. Sterbeck. fung. tab. 12. t. A. B. C. D.
In sylvis opacis montanis.
Col. pulchre puniceus. Cespes densissimus, spi-

tham. fragilis. Rami ultimi etiam obtusi, & emarginati, quandoq. rubri. Caro alba. *Edu-
lis*.

10. *fastigiata*. C. ramis confertis, ramosissim. fastigiatis, obtusis, luteis. *Syst. veg. ed. 14.*

Fungoides &c. *Rati. Angl. 3. tab. 24. f. 3.*
In sylvis.

Lutea, foetida.

11. *crispa*. C. foliacea, ramosiss. ramis planis, crispis, per oram terratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 14. f. 1.*

Habitus

Ex crassiusculo tubere veluti trunco surgit caul. fungoso--foliaceus, longitudinaliter rugosus, in cespitem 1-3-polic. rosæ instar expansus, amplissimus, ramosissimus, ramis veluti supra decompositis, foliaceis, planis, compressis, apice dilatatis, crispatis, undiq. serratis. Ex lateribus quandoq. aculei molles, inæquales, adnitate quadam cum *Hydno*. Color aquose flavens, oris eximie saturioribus.

An C. Hall. dist. n. 1200? sed nihil cum Schaefferi tab. habet commune.

12. *plebeja*. C. ramis simpliciuscul. subovatis, apice denticulatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 13.*

Habitus

Substantia coriaceo-fungosa, admodum crassa, firma, extus aquose flavens, apicibus pallide roseis, carne intus alba, eduli. Truncus humilis, valde crassus, ramosissim. ramis adproximatis, brevibus, cespitosus, crassis, oblong-clavatis, aut cylindraceis, obtusis, apice subcompressis, & denticulatis.

13. *muscoides*. C. ramis ramosis, (flexuosis) acuminatis, inæqualibus, luteis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 775. f. 3. Schaeff. fung. tab. 173.*

Fungus &c. *Rati. Angl. 3. tab. 24. f. 7.*

Corallo-fungus. *Vaill. parif. tab. 8. f. 4.*

In Muscis, ramis arborum corruptis.

Stip. fere uncial. ramis paucis, & angulosis, Hæc sp. tota undiq. est eiuldem latitudinis, flava.

- vermiculata*. C. simplex, lumbriciform. ochroleuca. *Scop. Fl.*

Carn. Mich. gen. tab. 87. f. 12. 13. Gledits. fung. p. 30.

In sylvis.

Corpus simpl. attenuatum.

palmata.

C. ramosa, ramis compressis. Scop. Fl. Carn. Ha f. helv. n. 2200.

Coralloides &c. Buxb. cent. 4. tab. 66. f. 1. Mich. gen. tab. 89. f. 3. Batt. tab. J. C.

In sylvis et arboribus.

Coriacea, fulco-violacea. Cespes uncial. rigidus, tenax. Rami apice digitati.

Arbuscula.

C. ramosa, ramis teretibus, erectis. Scop. Fl. Carn. Bazar. fung. tab. 1. a. b. c.

In sylvis.

Truncus semunc. divisus in ramos, & ramulos, ex quorum compage ovalis cespes efficitur. Color albus, aut fordide rubens. Tota planta non longior digito auriculari.

Hall. con-ungit cum C. Coralloide.

digitata. Scop. C. Fl. Carn. Schaeff. fung. tab. 170. 172. 174.

Var. 1. caul. simplici.

C. Mich. gen. tab. 87. f. 13.

Corallo-fung. Vaill. paris. tab. 8. f. 2.

Alba est.

Var. 2. caul. ramoso.

An. C. Mich. gen. tab. 87. f. 12. & alia tab. 88. f. 6?

In sylvis.

Natura ceracea, fragilis, tuberculis minimis, superfuse crispa, subtiliter villosa.

C. simpl. & ramosa, subulata, vellere albo. Hall. helv. n. 2195.

In ligno putrescente.

Corrua longa, peracuta, quandoq. repetito-ramosa. Truncus, & rami cavi, obliniti carne tenera, fordide purpurea, qualis in *Periza* est.

C. caule, ramisque cylindricis, sine crassescente. Hall. helv. n. 2196. Videtur Puk. tab. 47. f. 2.

In lignis putridis, subterraneis.

Natura, & color Sibi: fig. teres, ramis simplicibus. Altitudo vix semunc.

C. vertice multido; ramis acutissimis. Hall. helv. n. 2197. Vaill. paris. tab. 8. t. 4. sed

cor-

cornua habet mæris conferta, quam nostra.

Mich. gen. tab. 87. f. 9. p. n. exemplo simplici.

In lignis putrescentibus, humidis.

Cornua ex ligno exeunt, minima, simplicia, acuta, a basi, pice flava; dein tota flava, & in ramos pauciores per cutores filia.

C. caule dichotomo; ramis brevibus, bicornibus. Hall. helv. n. 2193. Mich. gen. tab. 88. f. 4. non penitus bene.

In graminis adscivibus.

Stipit. simplic. non confusi in massam, cespites integros effusarum; ramosi, & flexuosi ad Coralli modum, ramis ramosis.

C. indivisa, viridis, rugosa, & compressa. Hall. helv. n. 2205. An C. 7. Mich. ?

In fœvis.

Stip. ucial. Clava paulo minor, sæpe compressa, plicata. Stip. putchre virens: clava paulo obscurior.

C. lutes, minima. Hall. helv. n. 2207. Mich. gen. tab. 87. f. 3. quæ nostram valde superat.

In Helvetia.

Uncia brevior, saturo flava. Stip. tenuis.

1443. LYCOPERDON. Fungus subrotund. seminibus farinaceis repletus.

* Solida, subterranea, absque radice.

1. Tuber. L. globosum, solidum, muricatum, radice destitutum. Syst. veg. ed. 14. Gledits. fung. p. 157. n. 6.

Tuber. Math. disse. 544. Mich. gen. tab. 102.

Sub terra, in collibus.

Extus fuscum, intus nigrum, odorum, edule; pulpa carnosâ, solida. Dantur minima Nucis magnitudine, col. purpur.

Var. T. æstivum. Pulpa subobscura, minus sapida, & odora.

2. cervinum. L. globosum, solidiuscul. centro fr. rinf. centro fr. rinf. radice destitutum. Syst. veg. ed. 14.

Lycoperdastrum &c. Mich. gen. tab. 99. f. 4.

Tubera cervina. Loh. re. 276.

Tuberum &c. Bauh. hist. 3. p. 851.

In Hetruria, Bohemia &c. pascuis collinis.

Nucis Avellanæ magnitudine, inæquale, grov
Tom. VI. A a

- ...natum, extus cinereo-fulvum; intus albidopurpureo, odore, & sapore muriatico.
3. *minimum*. L. globoso-difforme, solidum, gregarium, rad. destitutum. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1772. p. 83.*
L. carcinomalis. Lin. Suppl.
Ad cap. 6. Spei.
 Statura *Agorici*; pileo nondum a stipite distincto. Clava ovat-oblonga, basi dehiscente, tomento, & farina fusca.
Pulvis in loco natali ad ulcera canerosa est in usu.
 ** *Pulverata, radicata, supra terram.*
4. *Bovista*. L. subrotundum, lacerato-dehiscens. *Syst. veg. ed. 14. Schaeff. fung. tab. 292. 293. & aliae.*
Fungus maximus &c. Bauh. hist. 3. p. 848.
In campis sterilibus collium, & montium.
Carnosum, album, glabrum, vel asperum.
Mulsa hujus dantur variet. etiam pondere 25. librar. & 2. ulnarum ambitu. Vid. Hall. helv. n. 2172. inter quas Fung. Carrariensis. Marfil.
5. *aurantium*. L. sphaeroidale, basi rugosum, stipitatum; laciniis obtuse emarginatis dehiscens. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. parif. tab. 16. f. 9. 10.*
In sylvis collium.
Simil. priori, sed color aurantiacus.
6. *stellatum*. L. volva multifida, patente; capitulo glabro; ore acuminato, plicato. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 360. Buxb. vent. 2. tab. 49. f. 3. Gledits. fung. p. 131. n. 3.*
Geaster &c. Mich. gen. tab. 100. f. 1. 2. 3.
Fungus &c. Bacc. mus. 1. tab. 305. f. 4. Raii. Angl. 3. tab. 1. f. 1.
In collibus, locis muscosis, autumnis.
Ovo columbino simile. Volva flavescens. Capitulum album.
7. *Carpobolus*. L. volva multifida: fructu globoso, ex seminibus combinatis. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 101. n. 2. Fl. Dan. tab. 895.*
In Italia, Helvetia &c.
Fungus albidus, in senio fuscus, & asper; linea paulo latior, minimus. In disco exsistit

vesicula ovalis, altitudine totius disci, & humorem cum seminibus mixtum explodit.

8. *radiatum*. L. disco hemisphærico; radio colorato. *Syst. veg. ed. 14.*

In Suecia lignis Abietinis putridis.

Magnitudo dimidii fructus *Cortandri*. Discus subglobosus, fuscus, elastice dehiscens, & expellens cum avolante polline lanam bombycinam, tumescentem, fuscam. Limbus campaniform. niveus, sectus fere ad basin in partes 12. æqual. disco paulo longiores, basi integra ovali cingente discum.

9. *pedunculatum*. L. stipite longo: capitulo globofo, glabro (papillato, perforato); ore cylindrico, integerrimo. *Syst. veg. ed. 14. Gediss. fung. 150. n. 3. Tourn. Inst. tab. 331. fig. E. F.*

In campestribus.

Stip. uncial. tenuis, lævis, albus. Capitulum rotundum, album, de cuius media convexitate papilla eminet.

10. *pistillare*. L. clavatum; stipite torto. *Syst. veg. ed. 14. An Bucc. musc. tab. 107? sed col. differt.*

In India orientali.

11. *carcinoma-lis*. L. clavatum; stipite cylindrico, recto, *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spec.

Statura Agarici, pileo nondum a stipite distincto.

Stip. fibris rectis. Clava ovat-oblonga, basi dehiscente, tomento, & farina fusca.

Pulvis in loco natali ad ulcera cancrofa in usu est.

*** *Parasitica, in farinam fatiscencia.*

12. *cancellatum*. L. parasiticum foliorum, cancellatum filis parallelis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 17. Fl. Dan. tab. 704.*

Supra folia Pyri.

In Pyri fol. averfa parte, raro in petiolis, excrescit macula ex flavo, aurantioq: colore varia, fol. inficiens, substantia intus albida, extus ferruginea. Pulvis fuscus.

13. *variolosum*. L. parasiticum, sessile, subrotund. cortice exteriore fulvo, deciduo: farina atra, compacta. *Syst. veg. ed. 14.*

Lichenoides &c. Dill. musc. tab. 12 f. 7.

A a ij

Lycogala &c. *Mich. gen. tab. 15. f. 2.*

In arborum ramis emortuis, aut moribundis.

Verrucæ sparſæ, primo fulvæ, molles, succulentæ, ætate conſiſtentiores, & fulcæ evadunt; induratæ perſiſtunt, ac dehiſcunt, licet polline nigro maxime farctæ.

14. *truncatum*. L. parafiticum, ſubrotundum, truncatum. *Syſt. veg. ed. 14.*

In Fagis.

Magnitudo a Piſi ad pugni, cortice coriaceo, fere marginatum. Pulpa ſiccior ſpongioſo-ſuberoſa.

Videtur initium Tremellæ Agaricoidis. Fl. Dan. tab. 464. fig. non bona. Hall. helv. tab. 48. f. 8. 16. bona.

15. *piſiforme*. L. globolum, ſcabrum; ore perforato. *Syſt. veg. ed. 14. Jacq. miſc. Auſtr. 1. tab. 7.*

In truncis Fagi putridæ.

16. *ramoſum*. L. parafitic pyriforme, ſcabrum; rad. filiformi, ramoſiſſima, proliſera. *Syſt. veg. ca. 14. Jacq. Auſtr. 3. tab. 214.*

Ligno putrido aggregatum innafcuntur.

Fungus etiam rotundatus, extus ſordide albiſcens; intus candidus, integerrimus.

17. *Epidendrum*. L. cortice, farinaq. purpurea. *Syſt. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 720. Gleditſ. Fung. 150. n. 4. Buxb. cent. 5. tab. 29. f. 2.*

In lignis, parietibus antiquis.

Sphæricum, læve; col. obſcuro, molle, corticibus duobus, intus pulpa molliſſima, miniata, humida. In ſenio cortex fit purpur. & pulpa in aurantium pollinem contabescit.

18. *luteum*. L. ſubrotundum, gregarium, glabrum, ore perforato, fulco. *Syſt. veg. ed. 14. Jacq. miſc. 1. tab. 8.*

Habitat

19. *epiphyllum*. L. aggregatum, parafiticum; ore lacero, multido; pulvere fulvo. *Syſt. veg. ed. 14.*

In dorſo folior. Tuſſilaginis.

- minimum*. L. pedunculat. Stipite bulboso: capitulo ſubrotundo, lævi; ore tubuloſo, multido. *Leerſ. Fl. Herbörn.*

Habitat Herbörnæ,

- Herculeum.** L. Pall. *it.* 1.
In Dauuria.
 Pedal. extus albus. Stip. cylindricus, scarieus,
 sensum incrassatus in clavam nutantem, obso-
 lete truncatam, mole pugni.
- hypoxylo.** L. Pall. *it.* 1.
In Dauuria, sub lignis & corticibus putridis.
 Corpuscula miliaria, retusa, in stipitem albi-
 dum, filiformem attenuata, col. primum, &
 subitanea L. *Epidendri*, dein sensum magis ru-
 fescunt, maturaq. abiecta crusta, explodunt
 cum pulvere lanam tenerrimam, contextam,
 purpuream.
- coronatum.** L. volva multifida, reflexa, cartilaginea, pa-
 tente: capitulo stipitato, ovato, oblong. gla-
 bro; ore acumin. coronato, dentato. Scop.
Fl. Carn. Muck. gen. tab. 100. f. 3. *chæff.*
fung. tab. 182. f. 1. *Butar. fung. tab.* 39. n.
 1. *valde proxima fig.*
In truncis circa ldrum.
- aggregatum.** L. Retz. *Obs. fasc.* 1.
 Mucor *Lycoperdoides*. Scop. *An. M. N.* 4. tab.
 1. f. 11.
 Trichia &c. Hall. *helv. tab.* 48. f. 5.
In putridis lignis, & in teneriore parte rimarum
corticis emarsidi.
 Gregarium, stipite breviss. capitulo pyriform.
 sursum latescente, supra basin contracto, fu-
 sco. Disrupto cortice dependet capillitium cy-
 lindricum, ex aurantio-purpur. polline con-
 colore plenum; eoq. delapso, testa cava, &
 inanis superest.
- gregarium.** L. parasiticum, congestum, sphaericum, cortice
 fusco nitente; farina aurea. Retz. *Obs. fasc.*
 1. Hall. *helv. tab.* 48. f. 3. d.
In lignis putridis.
 Fungus parvus, capitulo aciculæ vix maior:
 post farinæ emissionem sat longe petiolarus
 adparet; stipite capillaceo, nigro.
- mini.** L. acaule, album; ore perforato, crenulato.
 Bellar. *Observ. Botan.*
In Ulmi cortice.
 Planta minima, magnitudine sem. *Coriandri*, sub-
 rotunda, glabra.

*pyriforme.*L. capitulo substipitato, oblongo, subaspero; radice longa, fibrosa. *Bellar. Observ. Botan.**In Taurini sterilibus.**arigon.*L. ferrugineum, cellulofum; cellulis substantia spongiosa-filamentosa repletis. *Scop. Delic. Insul. fise. 1. tab. 18.**In Insubria.**excipuliforme.*L. turbinatum, candidum, asperum, basi oblonga, crassissima, crispa. *Scop. Fl. Carn. n. 1631. var. 4. All. Fl. Ped. Bass. Fung. tab. 31. fig. F. Vaill. parif. tab. 22. f. 16. Schaeff. fung. tab. 187. 292. 295.**In sylvis montanis.*L. totum exasperatum, petiol. cylindrico: capitulo sphærico. *Hall. helv. n. 2171.**In sterilibus montosis.*L. ficcatum, nigerrimum, pulpa flava, cellulis fimbriatis. *Hall. helv. n. 2176.**In Helvetia.*

Tota planta ollam fere refert, cylindricam, latam, inferne ventricosam.

L. subterraneum, rugosum, congestum. *Hall. helv. n. 2178.**In Helvetia.*Ad caules, & nervos *Brassicae* hyeme defossæ.Pro sem *Brassicae* aliqui habuerunt; sed Funguli sunt Tuberibus proximi, exigui, subrotundi, nigri, duriusculi, nonnullis rimis in lobulos obscure divisi.L. vesicarium, candidum. *Plum. Sp. 17.*2. Tuber testiculorum forma, min. *Plum. fil. tab. 168. f. 12.*2. Tuber testiculorum forma, ma: *Plum. l. 6. f. m.*3. Tuber candida, mollia. *Plum. Filic. tab. 167. fig. K.**In America.*

2444. MUCOR. Substantia mucilaginosa, ex vesiculis stipitatis sem. numerosa ferentibus, conflat; putrefactus corporibus adhærens.

* Perennes.

2. *sphaeroscaphus.*M. perennis; stipite filiformi, nigro: capitulo globoso, cinereo. *Syst. veg. ed. 14.*

Trichia &c. *Hall. helv. tab. 48. f. 3. & tab. 1. f. 3.*

In parietibus, lapidibus, lignis putridis.

Parvulus, gregarius. Sphærule cinerea, 2-valv. continens capillitium rufum. Cortice rupto, villi ochroleuci adparent.

2. *lichenoides*. *M. perennis*; stipite subulato, nigro; capitulo lenticulari, cinereo. *Syst. veg. ed. 14.*

Coralloides &c. *Dill. musc. tab. 14. f. 3.*

In Pini corticibus.

Capitellum magnitudine sem. *Papaveri*, supra hemisphæricum, subtus plano-concavum.

3. *Embolus*. *M. seta nigra*; villo subfulco. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. tab. 1. f. 1.*

In lignis putridis.

Figura *Typhæ*.

4. *fulvus*. *M. perennis*, pallidus; pileo fulvo. *Syst. veg. ed. 14.*

Upsalæ.

5. *furfuraceus*. *M. perennis*, virid. fol. furfuraceis: stipite filiformi; capitulo globoso. *Syst. veg. ed. 14.*

In terra nuda passim in æveta.

Color fulphureus.

6. *clavatus*. *M. perennis*; stipite filiformi, nigro: capitulo obruso, nigro, glabro. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Arborum foliis, ad promontorium B. Spel.

Refert puncta in frondibus *Filicum*.

** *Fugaces.*

7. *Muscola*. *M. stipitatus*; capsula globosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 467. f. 4. Gledus. fung. 165. n. 4. Mich. gen. tab. 95. f. 1. Malp. veget. tab. 125. f. 108. p. 2. Vulgo musca.*

In variis putridis, pane, plantis &c.

Stip. longus, griseus. Capitulum diaphanum, dein viride, tandem nigrum, læve, rotundum, simplex.

8. *miniatus*. *M. stipitatus*; capsula pyriformi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 299.*

Inanescit putridis lignis, & in sylvis udis alpinis.

Debilis, mollis, nitidus, glaberrimus. Stip. albo-cylindricus; capitulum miniatum.

9. *leprosus*. M. cespitosus, densissimus; initio niveus, dein aureus: seminibus ovatis.
M. teraceus; seminibus radicalibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Aspergillus &c. *Mich. gen. tab. 91. f. 5.*
In cavernulis, Autumno.
10. *glaucus*. M. stipitatus; capitulo subrotundo, adgregato, glauco. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 777. f. 2.*
Aspergillus &c. *Mich. gen. tab. 91. f. 1.*
Bytius &c. *Gledit. fung. 14. n. 6.*
In Citris, Melontibus, Pomis, aliisque corruptis fructibus.
Stip. fetaceus, articulatus, diaphanus
11. *crustaceus*. M. stipitatus; spicis digitatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 897. f. 1.*
Botrytis. *Mich. gen. tab. 91. f. 3.*
In cibus corruptis.
Totus diaphanus. Stip. articulato-fetaceus, glandulas plantarum fetaceas simulans.
12. *cespitosus*. M. stipite ramoso; spicis ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Aspergillus &c. *Mich. g n. tab. 91. f. 3. & b. f. 4.*
In putrescentibus.
Albus. Priori similis: differt spiculis digitato-ternatis.
13. *viridescens*. M. viridis, granulofus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Europae lignis putridis.
Crusta viridis, e granis subrotundis, inæqualibus, humido-gelatinosis.
14. *Erysiphe*. M. albus, capitul. fuscis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In fol. Humuli, Aceris, Lamii Galeopsidis, Lithospermi.
15. *septicus*. M. unctuosus, flavus (caulicul. ramosis, laciniatis). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 778. Gledit. fung. 160 var. d.*
In lignis putridis, & fol Fagineis tabescentibus & in vaporariis deservescantibus, visibili incremento.
Crustaceus, ramosiss. Arbuscularum cespes est, ad *Corallinitis* similitudinem, laciniatarum, 2-3-fid-rum, col. crocei, fonte ad butyri modum delluentium. Ea sibi relicta, intra ungu

com noctem siccatae, contractae, ovalem figuram induerunt, & cellulosa spongiae hibernum, quae intra paucas horas in nigrum pollinem fatelcit.

- pyriformis.* M. capitulo perenni, sessili, subovato. Scop. Fl. Carn.
Scop. Trichia &c. Hall. helv. n. 2168. tab. 48. f. 7.
In cortice trunci Abietini.
 Excipulum sessile, flavescens, simile Pyro inverso, aut cucurbitulae excaricatoriae.
- serpula.* M. perennis, ramosus, repens. Scop. Fl. Carn. tab. 65.
In arborum corticibus, & truncis, prope radicem.
 Filum flavescens, interstretum, aut Serpulae in motum repens, caespitium, flavo polline adspersum undiq. effundens.
- Mucilago.* M. globosus, & cellularis, sessilis, cortice in pulverem faciente. Scop. Fl. Carn. Gladst. fung. p. 158.
Mucilago &c. Mich. gen. tab. 96. f. 1.
In arboribus.
 Globus intus cavernosus, tuberculis radicans. Color cerae flavae. Superficies glabra.
- decumanus.* M. Pall. ii. 1. tab. H. f. 2.
In Dauria.
 Solitar. erectus. Sipes 2-pollic. & ultra, raro 2-fid. pubescens, albus, maturitate contorquendus. Capitulum ovatum, acutiusculum, mole semin. Lichospermi, lividum.
- violaceus.* M. stipitatus; capitulo lentiformi, depresso. Lessf. Fl. Herbarn.
In ligno putrescente.
 Stip. lineam longus, niger. Capitulum, magnitudine, & figura Lentis min. depressum, quod in centro dehiscit in lacinias radiantes. Pollen violac. lineae albae adhærens.
- luteus.* M. stipitatus; capitulo pyriformi, oblongo, lacteo. Lessf. Fl. Herbarn. Mich. gen. tab. 96. f. 4. ostia.
In truncis putrescentibus.
 Substantia fungosa, fragilissima, apice perforato, mox contabescens.
- nivus.* M. stipitatus capitulo globoso, niveo, nitido. Lessf. Fl. Herbarn.

Lycogala &c. Hall. n. 2140.

In lignis putrescentibus.

Stip. 2.-lin. longus, striatus, cinereus. Capitul. niveum, dein glaucum, liquamen flavum continens.

pomiformis. M. substipitatus: capitulo globofo, fulvo. *Ledr. Fl. Herborn.*

Aspergillus. M. capitulis aquei: stipite dichotomo, setaceo, procero. *Scop. Fl. Carn.*

In Agrixis putrescentibus.

Primo est pollen cinereus; inpalpabilis; ex hoc seorsim nascitur reticulum decumbens, quod alia die filamenta sua elevat simplicia, & ramosa, sæpius dichotoma. Globuli terminales.

obliquus. M. *Scop. Fl. Carn.*

In Carniola.

Tuber obliquum proferens stipit. femilinearem, & terminatum capitulo ovali, glandulam nigram, & verticalem sustinente. *Vita aliquot horarum.*

Lycogala. M. capitulo aqueo, gelatinoso, pellucido, fugaci, globofo, sessili. *Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 95. f. 2.*

Ad Abietum radices, post pluvias uberiores.

Pilulæ magnitudine maiorum, quæ in Officinis pharmaceuticis, col. rufo, dein subluteo.

araneosus. M. *Jacq. misc. 3.*

Habitat

Constat mero pulvere rufo, minutiss. in cumulum semiovatum aggregato, sine ullo conspicuo cortice, magnitudine uti digiti apex; circa quem ad aliquam distantiam ligno adfixa conspiciebantur in orbem fila nigra, capillaria, & elastica, quæ ad centrum commune fungi dirigebantur; primo procumbentia, dein per fungi substantiam pulverulentam adfurgentia, rigidula, sicuti interiora versus totam fungi aream occupabant. Alia præterea erant fila ad peripheriam priorum, contrario prioribus situ, veluti lineæ tangentes circuli. Hæc non ubivis, sed aliquibus tantum in locis spectabantur.

M. (*Mucilago*) albus, crustaceus, & filamentosus. Hall. *helv. n. 2129. Mich. gen. tab. 96. f. a. b. f. 3.*

Autumno, in terra humida, arboribus putridis, vivis muscis reperitur natura tenera, odore muscido. Plerumq. costa æquabilis est, filis facta simplicibus, in cespitem congestis. Deniq. per terræ humectæ glebas, & per marcescentia folia protrahitur, nervosæ folii sceleti non dissimilis, in senio in luteum colorem degenerat.

M. (Mucilago) plumosus, niveus. Hall. helv. n. 2130.

In Fungis putridis.

Diversus a priore.

Plumulæ sunt imbricatum congestæ, tenerrimæ, ramosæ, nivæ, trunculi in centro cespitis liberis, plumulis in ambitum dispositis. Prima initia sunt nivei, villosi, globulosi cespites folior.

M. (Mucilago) cinereus, filis cespitosus, ramosus, & non ramosus. Hall. helv. n. 2131.

In corticibus & lignis.

Planta cespitosa, pulverulenta, cinerea, fruticulos efficit, quarta parte unc. non longiores.

M. (Mucilago) miniatus, villosus, minimus. Hall. helv. n. 2132.

In Saxifraga alpina fol. integris, & 3 fidis; & in Carduis.

Glebulæ rotundæ, ovatæ, & alterius fig. aurantæ, succulentæ, teneræ, sessiles, totæ factæ filis concoloribus, mollibus, undiq. erectis.

M. (Fuligo) ovatus, laminosus, albidus. Hall. helv. n. 2134. Schaeff. fung. tab. 192.

In Helvetia &c.

Similis M. septice, virgultis, & Hedera ramis ædidi natus. Tota plantæ ovum refert, elliptica, & convexa. Fit laminis albis, & quasi cellulosa tela. Matura planta in siccum pollinem dissolvitur.

M. (Fuligo) flavus, buryzaceus, capitatus. Hall. helv. n. 2135.

In sylvis & fol. putridis.

Fila flavissima, in buryri speciem diffuentia, in reticuli speciem intricata, primo procumbunt, dein eriguntur, & quasi capitula offerunt, ro-

tunda, sibi proxima, etiam 4. lin. alta; demum ita confluentia, ut *Brassica cauliflora* capitulum imitentur, semper mollior.

M. (*Embolus*) *carneus*. Hall. *helv.* n. 2136.

In arborum corticibus, & ad terram, Autumno.

Plantula brevissima vite, intra horam & nascitur, & perit. Stip. tenerrimus, albus. Capitulum carnei col. Cuius prima fig. sunt globuli, inde typhæ, succulentæ, minimis tuberculis exasperatæ. Ante mortem atra evadit.

M. (*Embolus*) *albissimus*. Hall. *helv.* n. 2138.

Videtur tab. 96. f. 4, nisi quod nostræ plantæ clava in medio non contrahatur.

In ligno putrido.

Clava flocculenta, nivea.

M. (*Botrytis*) *cinereus*; racemis sphericis. Hall. *helv.* n. 2139. *Mich. gen. tab.* 91 f. 1. *Malpigh. plant. tab.* 25. f. 103. P. M. N. &c.

Bonanni ic. 1. *Wrisberg. anim. infus.* f. 9.

Ex plantulis sub pralo humefcentibus ut in *Plantagine*.

Filamenta simplicia, & ramosa: cuique ramo 3-4. acinorum acervi adident.

M. (*Lycogala*) *sessilis*, *niveus*. Hall. *helv.* n. 2141.

In terra.

Pulchræ plantulæ spherulæ, minimæ, vix dimidiam lineam latæ, sessil. nivæ, tactæ diffluunt, & lacteum succum effundunt.

M. (*Lycogala*) *petiolatus*, *aquosus*, *albus*. Hall. *helv.* n. 2144.

In cuniculis subterraneis de ossibus putrescentibus undiq. efflorescit.

Longus sæcunc. & ultra, mollissimus.

M. (*Lycogala*) *petiolat.* *aquosus*, *flavescens*. Hall. *helv.* n. 2145.

In ossibus humanis non recte purgatis.

Fila longissima, uncial. aquosa, argentea, sed cum sapore ineleganti admixto. Spherulæ mollissimæ tactu diffluunt, aquam effundunt, & de toto cespite lana quædam reticulata, flava superest.

M. (*Lycogala*) *petiolat.* *opacus*, *niveus*. Hall. *helv.* n. 2146.

In ligno putrido, autumnali tempore.

Differ a prioribus. Stip. erectus, firmus, fuscus. Capitulum sphaericum, carnei coloris, tactum in 1 d i cremoris similitudinem diiussit. Vacua testa spadiceum col. induit.

M. petiolatus, abissinus; capitula ovali. *Hall. helv. n. 2149.*

Ex putrescente Pruno cespitose provenit.

Firmulus, totus niveus, cortice distincto, & cellulosa medulla.

M. sessilis, globosus, albus. *Hall. helv. n. 2150. Mich. gen. tab. 93. f. 4.*

In fol. putridis.

Acervi globulorum.

M. sessilis, globosus, luteus. *Hall. helv. n. 2151.*

In plantis dum sub prelo siccantur humidis.

Tomentum flavum, in quo globuli concolores nidulantur.

M. (Aspergillus) capitatus, ochroleucus. *Hall. helv. n. 2152.*

In cortice querno, sub brumæ initium.

Tener, mollis, & fugax. Capitulum pro portione magnum, villis factum a sphaeræ ambitu in unum centrum confluentibus.

M. (Aspergillus) purpureus. *Hall. helv. n. 2153.*

Crusta quasi byssina, villosa, alba. Styli breves, & capitula rubra, quasi rorida, elegantissima.

M. (Aspergillus) capitulo pullo; seminibus subrotundis. *Hall. helv. n. 2154.*

In alveo balnearum.

M. (Aspergillus) albus; pediculo articulado. *Hall. helv. n. 2155.*

M. (Aspergillus) petiolatus, capite cylindrico, cinereo. *Hall. helv. n. 2156.*

M. (Trichia) niger, petiolatus; capitulo sphaerico. *Hall. helv. n. 2158. An Mich. gen. tab. 82. f. 1?*

In ligno putrescente.

Totus niger. Stip. ad 4. lin. longus. Capitulum ad dimidiam lineam.

M. (Trichia) niger, cespitosus; petiolis flexuosis. *Hall. helv. n. 2159.*

Celpites ovals innumerabilium plantularum, ad 2. lin. altarum, capitulo sphaerico, totarum nigrarum.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

M. (Trichia) petiolo brevissimo: capitulo sphaerico; cortice niveo, filamentis nigris. *Hall. helv. n. 2160. & enum. tab. 48. f. 2.*

In ligno putrescente.

Stip. vix linear. capitulum tamen grande. *Stip.* & capillitium internum capiculi aterrima: cortex albus, villo niveo conspicuus, ut tota plantula glauca videatur.

M. (Trichia) gregarius, cinereus, petiolatus, pyriformis. *Hall. helv. n. 2166.*

In strabibus putridis & in sylvis.

Initium *M. pyriformis*, satis simile, cespitosum; capitulo splendide cinereo, subviolac. Rupta textra exit idem, & ovatum fit, inde cylindricum, ad unciam longum, flexuosum, intricatum.

M. (Trichia) gregarius, sessilis, sphaericus, glaucus, *Hall. helv. n. 2169.*

In Muscis.

Globuli maiusculi, glauci, col. elegantis, plerumq. gregarii, terni-quaterni, etiam integri racemi, absque stipite.

NOVA GENERA.

AYTONIA.

Masculi fl. innati scrobiculo frondis.

Cal. o.

Cor. o.

Stam. Filam. nulla. *Anth. pl.* erectæ, longæ, subulatæ, insistentes receptaculo hemisphaerico, concavo.

Fl. femina.

Cal. Filam. subulata, erecta, germen ambientia?

Cor. o.

Pist. Germ. subglobosum. *Styl. pl.* brevissimi, cylindrici, germini sparsim insistentes. *Stigm.* simplic.

Peric. subglobosum, 1-locul.

Sem. numerosa, minuta, nidulantia, globosa.

1. *rupestris*. A. Forst. gen.

In rupibus America merid.

Alga fructura frondis non valde dissimilis Targionia.

Frondes indivisæ, lineares, utrimq. obtusæ, longitudine unguis, sibi invicem incumbentes; subtus nigra, tuberculis marginalibus femineis rubris: supra viridi-albicantibus, radio glabro, sed disco per longitudinem frondis piloso, pilis subulatis, erectis, compressis, albis.

Ad Marchantiam spectat. Lin. Suppl.

CERATOSPERMUM.

Differt ab Agarico, seminibus lunatis.

1. *C. nigrum*, discoides, minimum. Mich. gen. tab. 36. f. 1.

In arborum corticibus.

Ovatum, disciforme, punctatum.

2. *C. album*, minimum, cornucopioides, & subhirsutum; seminibus coloris incarnati. Mich. gen. tab. 36. f. 3.

In varietum arborum cortice, Autumno.

Stip. cylindricus gerit penicillum feminum, colominiato.

VALSA.

Adanson, & Scopoli.

Receptacul. sphaericum, aut cylindricum, carbonario polline plenum, apice dehiscens.

Clavaria digitata, & *C. hypoxylon*. Tremella purpurea huc pertinet.

1. *tuberosa*. V. Scop. Fl. Carn. Mich. gen. tab. 34. f. 1.

In Salice.

Tuber magnitudine Nucis moschatæ, sessile, aut breviter stipitatum, subrotundum.

2. *corticalis*. V. Scop. Fl. Carn. Dill. musc. tab. 18. f. 7.

Mich. gen. tab. 34. f. 5? tab. 36. f. 1, facie convenit.

In ramulis emortuis.

Ulcus ovarum, rami corticem findens in valvas 3-3. Plures in eodem ramo sunt, nempe nigra, & angulata tubercula sub cute rupta, nidulantia.

3. *fragiformis*. V. Scop. *Fl. Carn.*

Sphaeria &c. Hall. *helv. n.* 2190. *tab.* 47. f. 10.
In ramis aridis.

Verruca ovalis, aut subrotunda. *Halleriana planosa rubra; nostra nigra.*

PUCCINIA.

Differt a *Clavaria*, globulis ambiru caudatis; solitq. filamentis in transversum dispositis, quae videntur in centro colli.

1. *P. minima*, candidissima, ramosa, bifurcata.
Hall. *helv. n.* 2208. *Mich. gen. tab.* 92. f. 2.
In deteco ligno.

Cespes in orbem dispositus, non superans 4. linearum diametrum, ut quisque cauliculus vix duarum sit.

2. *P. flava*, conica, fistulosa. Hall. *helv. n.* 2209.
Videtur Mich. l. c. tab. 92. f. 1.
In Sabina.

Ex cortice orbiculi flavi, gregatim (quisque tamen serfim prebit), depressi, & plani, excresecunt in conos ex flavo-cinnamomeos, *Avellana* paulo minores, paulum rugosos, & plicatos, ad apicem punctatos, etiam gemellos, connatos; subtus cavi sunt, & gemelli, quasi 2-locul.

3. *P. flava*, depressa. Hall. *helv. n.* 2210. *Stachel. Habitat*

Funguli pallide lutei, solitarii, gregarii tamen sub cortice se efferunt, ovaes, reniformes, circulares, intus toti pleni sunt granis ovatis, caudatis.

4. *P. nivea*; granis coccineis. Hall. *helv. n.* 2211. *Habitat*

Tumores albi, pellucidi, elliptici, leniter convexi, utrumq. acuminati.

GYMNOSTOMUM.

Fl. masc.

Periant. e nonnullis rotundato-emarginatis, tenerrimis membranulis, albidis constat, de quarum emarginatione itidem pilus longissimus, ad apicem denticulatus, argentei col. erigitur.

Folliculi, mascula setura referti, perquam exigui.

Filam. succulenta ex adverso eo longiora, ex angusto principio sensim dilatata, hinc clavata, creberrime articulata.

Fl. fem.

Periant. Foliol. aliquam cum reliquis plantulae fol. similitudinem habent, sed multo min. & teneriora; nunc fasciculo vasculoso dorsali praesente, nunc deficiente; at intimorum pilus brevior exteriorum. Flos ipse e 7-8. pistillis constat, quorum raro duo foecundantur. Fila articulata brevia, & admodum tenera sunt.

Vaginula. Ut in *Bryo trunculato*: pedunculum thecae parum extra fol. superiora emergens.

Calyptra rufa magis est, quam in *Bryo trunculato*, vasculaq. eius validiora.

Operculum convexum, etiam in obliquum elegans rostellum de centro abit.

Theca feminalis primum viridis, dein fusco-rubra, nudo oculo punctulum quasi nigrum refert; ovata, si operculi rostellum demleris.

Sem. ma. quam in *Bryo trunculato*, aspera.

ovatum.

G. fol. ovatis, concavis, piliferis: thecis ovatis. *Hedw. stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 6.*

Musci &c. *Morif. kist. 3. f. 15. tab. 7. f. 18.*

In muris argillaceis.

Musci minutulus, densis, latisque caespitibus diffusus. Strip. simpl. Fol. ratione stipitis numerosa, alterna, imbricata, inverse ovata, margine integerrimo, inflexo. Caespituli siccecentes canescunt. Fl. terminales.

pennatum.

G. trunco longo, filiformi, simplici: fol. pinnatifid. pinnatifque, lanceolat. integerrimis:

Tom. VI.

B b

CRYPTOGAMIA.

theca ovata; operculo convexo. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 3. tab. 29.*

Mnium Osmundaceum. Dickson. Pl. crypt. Brit. p. 1. tab. 1. f. 4.

In cavitatibus aggerum, sub sepibus antiquis, solo pingui ♂.

Stip. semunc. flexuosus, inferne calvus, basi truncata; profundius paulo colorata. Feminus procerior mare. Sterilis nunc ultra unam tertiam eleganter foliatus, nunc ad apicem usque calvus. Fol. læte virentia, Flos in apice rofulam referens. Vaginula inverse conica, dein lageniformis, e fusco rutilans. Calyptra eiusdem coloris. Pedunculus dilute virens, tandem fere fuscus, numquam tortilis. Theca viridis. Anulus nullus.

Heimii,

G. trunco recto: foliisque spatulato-acuminatis, ad apicem denticulatis: thecis oblongis, erectis; operculo oblique rostrato. Hedw. l. c. tab. 30.

Ad fossas septentrionales.

Stip. semunc. erectus, simplex, inferne ruber. Fol. amplexicaul. adpressa, maioribus augmentis prædita, amænè viridia, infimis decoloratis. Ductulorum fasciculus validus, in senio coloratus; rete expansionis areolis angustis. Fl. terminales, in rofulam dispositi. Vaginula oblonga, altero latere arcuata, fusco-rutilans. Calyptra longa, angustata, col. saturationis. Peduncul. modice longus, primum dilute luteo-viridis, dein inferne rubens, sub theca incrassatur. Theca matura e luteo-fuscescens. Opercul. luteus. Anulus nullus. Peristoma nullum.

WEISIA.

Flos mæf.

E folliculis constat 20-22. consuetæ figuræ, quorum thalamum circum circa stupa brevis, alba, longe tenerrima ambit; præterea vero interposita habent filamenta longiora, articulata. Etiam in fl. femin. unum, alterumq. horum folliculorum.

Flos femin.

R nonnullis pistul. constat. Ovarii peduncul. in oblongam vaginulam basi sua immersus, inferne rufescens, superne dilute virens, imatura adhuc theca.

Calyptra rutilat, & longum, incurvum rostrum mentitur.

Theca seminalis cylindri figura, & aliquando profundius virens, demum rutilans.

Operculum de ampliori convexa basi breve emit- tit rostellum, quod calyptra adhuc tectum, semper erectum est; colore multo dilutiore quam thecae maturæ.

Anulus inter thecam, & operculum nullus.

Peristoma simpl. dentium 16. e latiuscula basi in longiusculam cuspidem, extenuatorum; col. in recente albo-leniter flavescens; exsiccatum flavi. Madentes in pyramidem conni- vent; succedentes solummodo eriguntur.

Seminula minuta.

recurvirostra. W. fol. lanceolat. imbricato-patulis; theca gra- cili; operculi rostellum recurvato. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 7.*

In locis lapidoso-sabulosis.

Gregatim arctissimo in consorcio cum Gramine nascitur. Stip. simpl. rectus, in senio rufus. Fol. e latiuscula basi in lineari-lanceolatam abeunt figuram: in junioribus quasi imbrica- ta, dein divergunt. Medius percurrit vascu- lorum fasciulus, col. deinde rutilante. Flo- rum involu. ra e fol. componuntur longiori- bus, & latioribus quam stipitis; intimis mi- nutissimis.

heteromalla. W. stipite erecto; fol. e basi lata subulatis, ri- gidis, heteromallis; operculo conico; theca anulata. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 1. tab. 8.*

In sylvis.

Simil. Br. crispum Schreb. sed basis lata fol. non undulata, subulata extremitas non crispæ; oper- culum capsula non parva, sed multis minus sit.

Gregatim nascitur, sed non denso agmine; imo sæpe etiam solitarius individuus.

LESKIA.

Flos masc.

Gemmiformis, in folior. ramificationis annotinæ, brimæ, aut trimæ alis stirpis masculinæ ramosæ, toriosoris habitus insidet. Folliculi spermatici minuti, succulentis filis aliquantulum breviores.

Femin.

Pariter gemmiformis; genitalibus 8. in stirpe femin.

attenuata. L. trunco varie ramificante; ramis apice gracilescentibus, incrassatisque, incurvis: fol. ovato-acuminatis, secundis: thecis erectis. *Hedw. Stirp. crypt. Fasc. 2. tab. 12.*

Hypnum attenuatum. Schreb. *Spieil. n. 1073. Dill. musc. tab. 42. f. 66.*

In sylvis, in imis truncis, præcipue Carpinibetuli.

Dense, & late oritur. Stipes adultus ramosus; ætate infima pars calva fit. Fol. semiamplexicaul. siccate alterutrum latus spectantia, crispata; col. e luteo virid. Vaginula oblonga, gibba, infœcundis genitalibus, filisque succulentis obsita. Calyptra angusta, pallidissima, reticulo spirali alterutro latere fissilis. Pedunc. tenuis, rectus, ætate purpurascens. Theca cylindrica, longiuscula, pallida, demum fuscescens. Operculum cuspidè obtuso elongatum.



P A L M Æ .

S P A T H A C E Æ,
T R I P E T A L Æ .* *Flabellifolia* .

1445. *Chamærops*, *dioica* . **D**rupæ tres .
 1446. *Borassus*, *dioica* . Drupa 3-sperma .
 1447. *Corypha* Drupa 1-sperma .

** *Pennatifolia* .

- Phoenix*, *dioica* . Drupa 1-sperm .
Elaïs, *dioica* . Drupa 1-sperm. coriacea . Cal. &
 cor. 6-part .
Areca, *monoica* . Drupa 1-sperma, calyce imbricata .
Elate, *monoica* . Drupa 1-sperm .
 1448. *Cocos*, *monoica* . Drupa 1-sperm. coriacea .

*** *Bipinnatifolia* .

- Caryota*, *monoica* . Drupa 2-sperm .

****

- Ginkgo*,
Mauritia . Masc. amentum .



1445. CHAMÆROPS . **S**patha 2-fida . Spadix ramosus .
Hermaph. Cal. 3-part. Cor. 3-pet. Stam. 6. Pist.
 3. Drup. 3. 1-sperm .
Masc. dioici, ut in hermaphr. *Habitus ramo-*
sus, floriger.
1. humilis. C. frondibus palmatis, plicatis: stipitibus spinoso-
 sis. *Syst. veg. ed. 24.*
Palma humilis &c. *Bauh. hist. 1. p. 368.*
Chamæriphe. *Dod. rempt. Dalech. hist. 369.*
820. Pont. anth. tab. 8.

Bb ij

Palmites. *Lob. hist.* 640.

In Europa australi, præsertim Hispania, locis maritimis, & in agro Nicæensi 24.

Palma hæc vel acaulis persistit; vel in altum excrevit, caudice inferne angustiore. Caulis scens profert *Dactylus venales*. *Lin. hort. Cliff.* *Repentem sâholiferam specie non distindam esse docent fol. & fl.*

2. *excelsa*. C. frondibus palmatis, nervosis, ferratis; stipitibus inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Sodio. K. mph. am. exot. fasc. 5. p. 898.

An. Sloan. hist. 2. tab. 213. f. 2?

In Japonia.

Caul arboreus, excelsus. Fol. petiolat. supra viridia, subtus pallida, glabra: lobi basi comærentes, lineares, apice fissi, ferrati, venis scabris. Petiol. 3-goni. Fl. paniculati. Panicula patula, decomposita, floscul. in ultimis pedicellis, sessilibus.

1446. BORASSUS. Spatha composita. Spadix Ament. cylindric.

Masc. Cal. . . . Cor. 3-part. Stam. 6.

Fem. Cal. . . . Cor. 3-part. Styl. 3. Drupa 3-sperm.

2. *stelliformis*. B. frondibus palmat. plicatis, cucullatis; stipitibus ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ampana. Hort. mal. 1. tab. 10.

Carimpana. Hort. mal. 1. tab. 9.

Lontarus & Rumph. amb 1. tab. 10.

In India.

Arb. procera, cortice rufo-nigricante. Rami fastigiati, in orbem dispositi; in quorum apice fol. grande, veluti stellum plicatum. Fol. crassa, costis adpressis. Drupæ rotundiores, apice subplano, calyce arcto, inferius supra calycem nigricantes, sulcatæ, nitidæ, versus apicem flavæ. Nux oblongo-rotunda, & plana.

1447. CORY- Spatha composita. Spadix ramosus . . . Cal. . .

PHA. Cor. 3-pet. Stam. 6. Pist. 1. . . . Drupa 1-sperm. globosa. Nux magna.

1. *umbrellifera*. C. frondibus pinnato-palmatis, plicatis, filoque interiectis; stipitibus ciliato-spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Codda-pana. *Hort. mal.* 3. tab. 1. . . . 12.

Saribus. *Rumph. amb.* 1. tab. 8. *Lin. Syst.* 1. tab. 2. f. 1. 2.

In India.

Arb. usque 70-ped. cuius fol. cum arbor in summo vigore est, excepto petiolo spinoso, sunt 18. pel. longa, 14. lata. Rami longi, rotundi. Fl. copiosi, ex-gui, fasciculati, albidii. Drupa sphaerica, viridis. Nux rotunda, albicans. Caro dura.

Vix flores ante trigessimum, seu quadragesimum ætatis annum. Absoluto fructu tota perit.

2. minor.

C. frondibus palmatis, flabelliformibus, plicatis, subbidis, filis interiectis paucis: stipitibus inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort.* 3. tab. 8.

Habuat

Fol. subradical. petiolis inermibus, rigida, glabra, striata. Spad. 3-5-ped. axillar. erectus, spathis vaginantibus, membranaceis: e quibus exeunt racemi paniculati, angulati. Fl. parvi, sessiles, inodori. Cor. 2-ba. Drupa *Pist* magnitudine, nigra, parum succulenta.

1448. COCOS. Spatha composita. Spadix ramosus.

Mas. Cal. 3-part. Cor. 3-pet. Stam. 6.

Fem. Cal. 3 part. Cor. 3-pet. Stigm. 3. Drupa coriacea, 3-gona. Nux maxima, subovata, 3-valv.

1. nucifera. C. inermis; frondibus pinnatis; foliol. ensiformibus, replcatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 169. ed. 2. pist. tab. 253.*

Calappa. Rumph. 1. tab. 1. 2.

Tenga. Hort. mal. 1. tab. 1. 2. 3. 4.

Palma indica &c. Bauh hist. 1. p. 375.

In Indis paludosis, umbrosis.

Arb. alte adfurgens. Caudex diamet. 2-ped. ramis fastigiatis, decussatis. Foliol. sesquicubital. oblong angusta, omnia, excepto utrimq. infimo, retroplicata, venis paralellis, subrus costa eminente, viridi-fusca, & nitentia. Fl. odore *Lilii* debiliore. Nux basi 3. foraminulis obsoletis notata, liquore plena. Caro nuclei coquenda.

2. butyracea. C. inermis; frondibus pinnatis; foliolis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

B b iv

- amarus.** C. nucleo amaro. *Ja. q. amer. p. 277.*
In Martinica sylvis h.
 Arb. simil. C. nucifero, centum-ped. Fruct. ovi
 anserini magnitudine, non edulis.
- aculeata.** C. trunco, foliisque aculeatis. *Jacq. amer. tab.*
129. ed. 2. pict. tab. 254.
In Martinica.
 Arb. prioribus simil. sed aculeatus. Fl. ut in C.
 nucifera. Fruct. subrotund. pomi parvi magni-
 tudine, viridis. Nux eiusdem figuræ.
- maior.** C. (*Bac. iv*) *Jacq. amer. tab. 121. f. 2.*
 Fructus exotici. *Clus. exot. f. 2.*
In Cartagena sylvis.
Simil. priori habitu, & crescendi modo. Fol. 6-
 ped. Foliol. fere 2-pedal. aculeis marginali-
 bus, fuscis, magisque conspicui. Spadix cont-
 presso-planus, ob fructuum pondus reclinatum.
 Drupa fig. & magnitudine ovi, stylo acumi-
 nata, succulenta, edulis, cortice sature pur-
 pur. Nux magna, atra.
- 1449. PHŒ-
NIX.** Spatha axillar. compressa, dehiscens. Spadix ra-
 mosus.
Mas. Cal. 3-part. Cor. 3-petal. Stam. 3.
Fem. Cal. & cor. prioris. Pist. 1. Drupa o-
vata.
- 1. dactylifera.** P. frondibus pinnat. foliol. ensiformibus, com-
 plicatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 202.*
Bauh. hist. 1. p. 351. Dod. pempt. 819.
Kemph. am. tab. 1. a. f. 1. 2. mas. tab. 1.
a. f. 2. 16. 11.
In India.
 Arb. apice frondosa. Foliol. cubital. alterna,
 sessilia, integerrima. Petioli ad basin sub 4-
 goni, ad apicem triquetri. Petal. ovato-oblong.
 obtusiuscula, planiuscula, marginibus inflexis.
 Fructus glandis quernæ fig. nitens. Caro dul-
 cissima.
- 1450. ELAIS.** Spad. axillar. ramosus, compressus.
Mas. Cal. 6-phyll. Cor. 6-fid. Stam. 6.
Fem. Cal. 6-phyll. Cor. 6-part. Stigm. 3. Drupa
fibrosa. Nux 1-3-valv.
- 1. guineensis.** E. frondibus pinnat. stipitibus dentato-spinosis,

divergentibus; denticulis supremis recurvatis, *Syst. veg. ed. 14. Jacq: amer. tab. 171. ed. 2 pist. tab. 257. Lin. Pflanz. Syst. Tom. 1. tab. 3.*

In Guinea; hospitatur in Amer.

Arb. sub 30. ped. Fol. 15 pedal. costa rigida. Foliol. sesquiped. longa, pollic. lata, ensiform. basi replicata, inermia. Spadix pedal. rectus. Fl. parvi, odore Anisl. Drupa ovo columbino maior, ex luteo, nigro, rubro col. mixta. Nux atra, striis albidis.

Ex fructibus elicetur oleum sic dictum Palmarum.

1451. ARECA. Spatha 2-valv. Spadix ramosus.

Masc. Cal. . . . Cor. 3-peral. Stam. 9.

Fem. Cal. . . . Cor. ut supra. Drupa calyc. imbricato, 1-sperm.

1. *Catechu*. A. frondibus pinnat. foliol. replicatis, oppositis, præmorsis, *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 387.*

Palma &c. *Pluk. alm. tab. 309. f. 4.*

Pinanga. *Rumph. amb. 1. tab. 5. 8.*

Gemeine &c. *Lin. p. fl. Syst. 1. tab. 4. f. 1. & f. A.*

In India.

Arb. procera. Caudex crassitie spithamæ. Rami fastigiati. Fol. 3-4- pedal. oblongo-angusta, nitida. Spicæ parvæ, angulatæ, albidæ. Petal. cuspidata. Drupa ovat-acuta, pulpa rufo-rubescente; medulla alba.

2. *oleracea*. A. foliol. integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 170. ed. 2. tab. 255.*

In America.

Arb. altissima. Vaginæ fol. se mutuo amplectuntur. Spathæ virides, nitidæ. Drupa oblonga, obtusa, subincurva, cœrul-purpur, *Olivæ* magnitudine. Nux oblonga, membranacea.

1452. ELATE. Spatha 2-valv. Spadix ramosus.

Masc. Cal. . . . Cor. 3-per. Stam. 3.

Fem. Cal. . . . Cor. ut supra. Pist. 1. Drupa ovata, acuminata.

1. *sylvestris*. E. frondibus pinnatis; foliol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

Katou-indel. *Hort. mal. 3. tab. 22. 23. 24. 25.*

Wilde &c. *Lin. pist. Syst. 1. tab. 4. f. 2. & II.*

In India.

Arb. sub 40 ped. Rami 2-cubit. crusta cinerea, ligno albicante. Rad. albicans. Fol. fastigiata, decussata. Pinnæ numerosæ, breviter petiolaræ, densæ, acuminatæ, globus, virore nitenti. Fl. plures uni pedunculo insidentes, exigui. Fructus exigui, oblongo-rotundi, *Crani sylv.* similes, cuspidate duro, ac lignoto, primum virides, dein rubri, tandem rubrofusci, & nigricantes.

1453. CARYOTA. Spatha composita. Spadix ramosus.

Masc. Cal. communis. Cor. 3-pet. Siam. plurima.

Fem. Cal. idem. Cor. 3-part. Pist. 1. Bicca 1-locul. 2-sperm. Sem. magna, subrotunda.

1. *urens.*

C. frondibus 2-pinnat. foliol. cuneiformibus, oblique præmorsis. *Syst. veg. ed. 14 Mont. in Zann. tab. 133.*

Saguaster major. Rumph. Amb. 1. tab. 14.

Secunda-panna. Hort. mal. 1. tab. 11.

In India.

Arb. procera, ramosa, cortice cinereo. Fol. circumscriptione triangulari, e viridi-fusca, valde nitida. Petal. surrecta, cuspidata, crassa, rigida, col. primum viridi, dein rubescente; seu purpureo-rubesciente; tandem flava, rubra, cœuleo-rubra &c. Fruct. plano-rotundi, sessiles, primum virides, dein flavi, postea rubicundi, tandem rubicundo obscuri, ac nitentes. Nuclei 2. duri, rubri, carne albicante; cœrul. & rubra.

1454. MAURITIA. *Masc.* in amento oblong. fissili. Cal 1-phyll. cyathiform. integer. Cor. 1-petal. tubo brev. limbo 3-part. Filam. 6.

Fem. . . .

1. *flexuosa.* M. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In floris surinami.

Arb. valle singularis, aphylla. Rami flexuosi, angulati, glabri, articulis brevibus, terminatis vaginis amplexantibus. Amenta axillaria, strobiliformia, bifaria, fissilia, pauciflora, bati squamata, ovat-oblonga, teretia, s. are-

te adproximatis, patentissimis, ferrugineis tecta. Squamæ rotundæ, obusæ separant fl. Post florum casum restat amentum cum suis squamis.

GYROCARPUS.

1. *americanus*. G. Jacq. *amer. ed. 2. piç. tab. 258.*

In Caribagenæ sylvaticis. h.

Arb. procera, elegans, ramosa. Fol. maximâ, longe petiol. alterna, basi subcordata, nitida, semuriloba, lobis semiovatis, acuminatis, integerrimis; lateralibus paulo brevioribus: vel in eadem arbore fol. sunt integerrima, & ovata. Racemi terminal. laxi. Bacca exsucca, ovata, obrusa, rugosa, 1-locul. apice aucta alis 2. cuneiformibus, obrusis, erectis, omniumq. maximis, quæ forsan fuere calyc. Sem. subrotund. obsolete sulcatum, lamellas suas varie involutas discidium transversum ostendit.

ANISOPHYLLUM.

1. *pinnatum*. A. Jacq. *amer. ed. 2. piç. tab. 262. f. 72.*

In sylvaticis insule Baru.

Arb. 15-ped. erecta, ramosa. Fol. pedal. alterna, impari-pinnata, costa subvillosa: foliol. 5-iuga, ovat-oblong. obrusa, crenata, leviter emarginata, glabiuscula, venosa, mollia, 4-pollic. subfessil: recentia odorem spirant *Anisi*.

GINKGO.

1. *biloba*. G. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor nucifera &c. *Kemph. aman. tab. 813.*
In Japonia.

SPATHACEÆ, TRIPETALÆ. 397

Arbor. Caul. teres, lavis, ramis alternis, patentibus. Fol. (ex præcedentis anni gemmis 4-phyllis quatuor) alterna, petiolata, cuneata, lavis, avenia, subrus striata, extimo rotundata, obrusa, biloba, erosa. Petioli longitudine fol. basi supra pubescentes, læves, teretes, supra plani, stricti, apice excurrentes utrimq. sub. folio.







ADDENDA, ET CORR'GENDA.

TOM. VI.

Pag. 375. lin. 13. (addatur)

GYNANDRIA.

1307. AN- *Maf.* Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Stam. 5. styli
DRACHNE. rudimento inferta.
Fem. Cal. 5-phyll. Cor. o. Styli 3. Caps. 3-locul.
Sem. 2.

Clusia adfinis.

1. *telephioides*. A. procumbens, herbacea. *Syst. veg. ed. 14.*
Bractiis, *Forsk. Æg-Arab. monente Vahl.*
Telephioides &c. Dill. elth. tab. 182. fig. 364.
Burb. cent. 2. tab. 12. fig. 2.
Glauz &c. Bosc. musf. 2. tab. 119.
In talia.
Caul. pl. palm-pedal. virentes, glabri, ad basin
subfusci. Fol. alterna, breviter petiol. ovata,
glauca. Pedunc. axillar. superne incrassati, pe-
tiolis longiores. Cor. alba. Caps. subrot.

2. *fruticosa*. A. erecta, arborea. *Syst. veg. ed. 14. Orb. it.*
228.
In India.

Rami flexiles, læves. Fol. breviter petiol. ova-
li-oblonga, lævia, subtus subtomentosa, non
fragilis, integerrima. Fl. axill. peduncul. bini
quasi e gemma minuta strobiliformi. Fl. alii
masculi calyc. 1-phyll. orbiculato, plano, ob-
tuso, parum 5-fid. Alii fl. in eadem planta
fem. 5-part.

1308. AGY- *Maf.* Cal. 6-phyll. Cor. o. Anth. 3. styli rudi-
NEJA. mento adnatæ.

Fem. Cal. & cor. prioris. Germen apice perfo-
ratum, absq. stylo, & stigmatæ.

1. *impubes*. A fol. utrinq. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

In China f.

Tom. VI.

Cc

Frutex erectus, ramis ultimis subtomentosis. Fol. alterna, subpetiol. bifaria, elliptica, vix acutiuscula, pollicar. integerr. utrinq. glaberrima, subtus glauca, venosa. Fl. axill. pl. congesti. Pedunc. 1-fl. tenuissimi, longitudine floris. Masc. fl. inferiores, min. glabri. Fem. fl. superiores, ma. pedunc. tomentosis.

2. *pubera.* A. fol. subtus tomentosis. *Syl. veg. ed. 14. In China h.*

Facies a priore diversa. Frutex erectiuscul. ramis pubescentibus. Fol. alterna, subpetiol. bifaria, ovali-oblonga, obtusa, sesquipollic. integerr. supra nuda. Fl. ut in priore.



ERRATA

CORRIGE

TOM. I.

| <i>Pag.</i> | <i>lin.</i> | | |
|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 6 | 44 | caulis | caules |
| 16 | 29. | ungue | <i>deletur.</i> |
| 29. | 29. | segmentis | segmenta |
| 31. | 16. | Siberia | Siberia |
| 45. | 41. | variegati | variegata |
| 52. | 15. | foliolis | foliolis |
| 56. | 22. | petiolata | petiolus |
| 76. | 23. | similis | simile |
| 81. | 1. | Loeslingia | Loeslingia |
| 90. | 29. | obtusas | obtusas digesti |
| 97. | 29. | bulbosa | bulbosa |
| 111. | 4. | <i>addatur.</i> | Var. fol. variegatis. |
| 111. | 9. | nigra | nigro |
| 118. | 29 | 88. | 77. |
| 156. | 12. | similis | simile |
| 160. | 3 | O. yzoides | Oryzoidis |
| 208. | 21. | fol. | F. |
| 219. | 18. | simile | similis |
| 234 | 15. | flosculi | flosculis |
| 285. | 24 | atropurp. | atropurp. imo eadem species. |
| 294. | 9. | caules | caulis |
| 301. | 34 | aculeati | aculeatis |
| 331. | 39. | fuscescentia | fuscescentia |
| 335. | 43. | femicurcul. | femicircul. |
| 417. | 32. | dichotomia | dichotomiam |

Pag. lin.

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 423. | 31. opposita, breviter . . . | oppositifl. |
| 432. | 20. spithameus . . . | spithameus |
| 441. | 4. caule calyc. . . . | caule 1-fl. |
| 481. | 5. tomentoso-cinereus . | tomentoso-cinereus, quando- que humifusus. |

T. II.

Pag. lin.

| | | |
|-------|--|---|
| 22. | 25. reticulatus | reticulatis. |
| 26. | 41. Herm. | Hern. |
| 43. | 23. Blackv. &c. . . . | deletur. |
| 49. | 41. arbore | arbreo. |
| 129. | deletur genus <i>Coprosma</i> , relatum ad <i>Polygonum</i> . T. 6. pag. 73. | |
| 150. | 36. adde | Var. ma. magis ferrata, alis crispis. Var. maxima fol. se- mibilobis, alis crispis. |
| . . . | 37. adde | Pluk. tab. 223. fig. 7. |
| . . . | 40. adde | rotunde lobata; vaginalia li- nearia, 3-fida. |
| 151. | 21. ferratis | furcatis |
| 161. | 20. radice e | radices |
| 241. | 13. 2-valv. &c. | 2-valves |
| 246. | 36. viride | viridis |
| 275. | 4. facem | faucem |
| 292. | 27. Gmel &c. | deletur. |
| 335. | 36. crassitie | crassitiem |
| 337. | 28. ligtu. | ligta |
| 383. | 28. Trew. | Few. |
| . . . | 37. Obs. | Os. |
| 390. | 13. sustentantes | sustentans |
| 400. | 31. fol. cumpolitis . . . | fol. oppositis |
| 410. | 14. Sem. | Seb. |
| 411. | 43. eris: follex | exsertis foliis |
| 427. | 43. spicam | spica |

T. III.

Pag. lin.

| | | |
|-----|------------------------|--------------------------|
| 12. | 35. impari ma: | impari plerumq. ma. |
| 15. | 1. orbicul. | orbiculatis, emarginatis |
| . . | 7. cordat. | cordato-acutis |
| . . | 11. Oleæ form. | Oleæ colore. |

Pag. lin.

| | | | |
|------|-----|-----------------------|--|
| 32. | 23. | addatur | Lignum Campechianum Sloan. Jom. 2. tab. 10. fig. 1. 2. 3. 4. Catesb. ear. 2. tab. 66. |
| 69. | 23. | Airculus | Hirculus |
| 74. | 31. | ottiarum | Cottiarum |
| 75. | 28. | retula | retusæ |
| 181. | 11. | acuminatis | acuminatis d'gnoskitur |
| 292. | 2. | Fructus | Frutex |
| 327. | 41. | Rolos | Rolof |
| 383. | 32. | prælonga | prælonga (addatur) Differt a priore, petalis basi angu- stis, & a se invicem distanti- bus. |
| 334. | 16. | constituunt | constituit |
| 396. | 1. | Sem. | Semi- |
| 426. | 24. | magis | minus |
| 444. | 35. | cal. | caul. |
| 447. | 43. | siphyleum | sipyleum. |
| 490. | 38. | foliofo | foliolo |
| 527. | 10. | altera | altera |
| 540. | 12. | Obs. | Osb. |
| 556. | 2. | canaliculi | canaliculati |

TOM. IV.

Pag. lin.

| | | | |
|------|-----|--------------------------------|--|
| 20. | 24. | interiora | inferiora |
| 59. | 3. | addatur | Var. H. tristis, cum fol. sint quandoq. dentata; & fl. o- dori. |
| 80. | 8. | foliosis | foliolis |
| 93. | 27. | intermedia | intermedio |
| 130. | 33. | consistentia | constituentia |
| 196. | 29. | A. adgregatis | A. fol. adgregatis. |
| 231. | 33. | prædicti | præditi |
| 232. | 23. | ternati | ternatis |
| 244. | 17. | petioli | petiolus |
| 314. | 36. | magnis | magni |
| 326. | 10. | maior | maius |
| 331. | 25. | 2-unc. | 2-unc. (addatur). Foliola ex angusto principio (plerumq.) cordata, emarginata. |
| 341. | 8. | Col. | Cal. |
| 369. | 39. | lingulati, aut nulli | lingulatæ, aut nullæ |
| 372. | 29. | fulcatus | fulcatus. |

TOM. V.

| <i>Pag. lin.</i> | | |
|------------------|--|---|
| 8. 2. | Semipinn. Hall. | Semipinn. <i>Syst. veg. ed. 14.</i> Hall. |
| 11. 20. | Sessilibus. Hall. | Sessilibus. <i>Syst. veg. ed. 14.</i> Hall. |
| 35. 42. | Fl. varios | Pl. in varios |
| 38. 39. | fetis | fetis |
| 39. 30. | alba: | alba, |
| 40. 6. | super | super. |
| 44. 3. | sub deni | subdeni |
| 55. 41. | Habitatus | Habitat |
| — 45. | sessili | sessili |
| 61. 37. | ramis | rameis |
| 74. 3. | E. | C. |
| 76. 28. | Cacalios | Cacalias |
| 79. 21. | brevior, copiosius, linearis | brevior, petalis linearibus |
| 93. 31. | Leucanthema, f. | Leucanthema, f. |
| 96. 18. | Chrysanthema, f. | Chrysanthema, f. |
| 106. 7. | nigro | nigris |
| 111. 33. | fol. obtusis | fol. radicalibus obtusis |
| 134. 9. | terminatus | terminatis |
| 153. 41. | luteus | luteus. (<i>addatur</i>) Var. fol. oppositis, & alternis. |
| 154. 37. | ed. 14 | ed. 14 (<i>addatur</i>) Dill. <i>elsh.</i> tab. 298. |
| 198. 1. | Ceruana Discoidea | Discoidea Ceruana |
| 213. 18. | purpur. ad centrum albicantia | purpur. Spica longa, 2-unc, rara. Petal. ad centrum albi- cantia. |
| 259. 38. | oris | ori |
| 274. 14. | bissectis | dissectis |
| 314. 1. | racemi | racemis |
| 431. 23. | ex apice | & apice |

TOM. VI.

| <i>Pag. lin.</i> | | |
|------------------|------------------|--|
| 12. 37. | tab. 72. | tab. 72. (<i>addatur</i>) In India, Arabia. |
| 43. 20. | tectum | tactum |
| 65. 37. | nucæ | nucis |

| <i>Pag.</i> | <i>lin.</i> | | |
|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 77. | 16. | Aerosticum . . . | Acrosticum |
| 78. | 30. | didini . . . | diclini |
| 80. | 1. | Fl. | Fr. |
| 87. | 28. | versicularis . . . | vesicularis |
| 87. | 10. | idest | inter |
| 89. | 33. | stirpe | stipire |
| 91. | 14. | officina'is | officinale |
| 107. | 30. | manum | manus |
| 137. | 1. | frangrans | fragrans |
| 157. | 10. | modula | modica |
| 175. | ult. | rami | ramis |
| 177. | 40. | ovato-concava . . . | ovato-concavis |
| 244. | 38. | plantarum | planta |
| 297. | 12. | Alne | Alni |
| 306. | 24. | hirtus | hirto |
| 324. | 8. | parte | pars |
| 371. | 3. | albus | album |
| 385. | 21. | pedunculum | pedunculus. |
| 386. | 33. | luteus | luteum |



CONTRACTA AUCTORUM

NOMINA EXPONUNTUR.



- Acad. Paris.* **A**cademiæ Scientiarum Parisinæ Commentarii.
- Acad. acad. N. C.* Nova Acta Academiæ Nat. Curiosorum. *Norimbergæ* 1778. Vol. 10. 4.^o
- Acad. Angl.* Vide Translationes Philosophicæ &c. 1787. Directions &c. Jo. Hællis *London* 1770.
- Acad. Bonon.* Bononiensis Academiæ & Instituti Commentarii. *Bononiæ* 1783. Tom. 6. in Vol. 9.
- Acad. Edimb.* Medical. &c. *Edinburgh* 1733.
- Acad. Gothob.* Esferreiminger fra Missionæerne i den danske Colonie *Gothæ* i *Grœnland*.
- Acad. Gœtt.* Novi Commentarii Societatis regię Scientiarum *Goettingensis*. *Goettingæ*, & *Gothæ* 1773. &c.
- Acad. helv.* Acta helvetica phys. mathem. bot. med. *Basilæ* 1777 &c. 4.
- Acad. Hafn.* Collectanea Societatis medicæ *Hafniensis*. *Hafniæ* 1775. &c. 8.
- Acad. holm.* Acta *Holmiensia* &c. *Lipsiæ* 1772. &c. 8.
- Acad. medic. Svec.* Acta medicorum *Svecicorum*. *Upsaliæ* &c. 1783. &c.
- Acad. Nidross.* *Nidrosinæ* Societatis Acta. *Hafniæ* 1765. &c. idiomate *danico*.
- Acad. Palat.* Historia, & Commentarii Acad. *Theodoro-palatinae*. *Manheimi* 1783. &c. 4.
- Acad. petrop.* Novi Commentarii Acad. Scientiarum Imp. *Petrop.* 1776. 4.
- Acad. Stok.* Acta Academ. realis Scientiarum *Sveciæ* &c. *Amburgi* 1740. &c. idiomate *germanico*.
- Acad. Upsal.* Nova Acta reg. Societatis scientiarum *Upsalien.* *Upsal.* 1777. 4.
- Albin. acad.* *Albinus Bernardus*, Dissertatio &c. *Francofurti* 1684. 4.
- All. Fl. Ped.* *Allioni Caroli*, Flora *Pedemont.* Tom. 3. *Augustæ Taurinorum* 1785. fol.

- == *Specim. I.* Eiusdem Specimen stirpium Pedemontii. *Taurini* 1755. 4.
 == *Aud.* Eiusdem Aucarium H. R. Taurinus. *Taurini* 1766. 4.
 == *Corf.* Eiusdem Florula Corfica &c.
Alp. exot. Alpini Prosperi de plantis exoticis. *Venetiis* 1656. 4.
Ambros. phytol. Ambrosinus. *Phyto'logia* &c. *Bononiæ* 1666. fol.
Amm. Aß. Jo. Amman. *Comm. Petropolit.*
Amm. ruth. Ammanni Johan. Icones plantarum rariorum, quæ in Imperio Rutheno &c. *Petropoli* 1759. 4.
Arduin. Spec. Arduini Animadversionum botanicarum specimen. *Patavii* 1764. 4.
 == *Mem.* Eiusdem Memorie &c. *Padova* 1766. 4.
Aubl. Guian. Aublet Fuscè Histoire des plantes de la Guiane Françoise &c. *Londres* 1775. T.^o III. 4.
Barr. ic. & obs. Barrelieri Jacobi, Plantæ per Galliam, Hispaniam, & Italiam observatæ. *Parisijs* 1714. fol.
Barr. franc. & quinox. Barreire Pierre Nouvelle relation de la France Equinoxiale &c. *Paris* 1743. fig. in 12.
Bart. Aß. Bartholinus in Aß. Hafniens.
Bass. Com. Bon. Bassi Ferdinandus in Commentariis Bononiens.
Bastler Op. Bastler Opuscula &c. de plantis quibusdam marinis. *Manheimii* 1762. figur.
Batt. fung. Battarra Fungorum Agri Ariminensis Historia Faventia 1759. 4. cum fig.
Bauh. hist. Jo. Bauhini Historia plantarum universalis &c. *Ebraurici Tom.* 3. 1650. fol.
 == *theatr.* Catparis Bauhini Theatri Botanici &c. *Basilea* 1671.
Bellar. Off. Bellardi Osservazioni botaniche, inserite negli Atti accademici di Torino.
Bellon. it. Beiloonius Petrus Observations &c. *Paris* 1553. 4.
Berg. cap. Bergii Petri Josephi Descriptiones plantarum ex cap. bonæ spei. *Stockholm* 1767. 8.
Besl. cyfl. *Vid. Hort. cyfl.*
Black. herb. Herbarium Brackvellianum. *Tom.* 2. *London* 1739. fol.
 == *Idem emendatum, & auctum* &c. *Cent.* VI. *Norimb.* 1772. fol.
Blair. obs. *Vid. Philosof. transact.*

- Bocc. mus.* Boccone Paolo, Museo di piante rare. *Venezia* 1697. 4.
- = rar. aut sic.** Eiusdem Icones, & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae &c. *Oxonii* 1644. 4.
- Boerh. Lugd. aut index alter.* Hermannii Boerhaave, Index alter plantarum, quae in horto academico Lugduno-Batavo &c. *Lugd. Bat.* 1720. vol. 2. 4.
- Bonan. ic.* Museum Kirkerianum &c.
- Bont. jav.* Jacobi Bontii in maiori Java &c. *Amstelodami* 1658. fol.
- Bradl. Succ.* Bradlejus Richardus. Historia plantarum succulentarum &c. *Londini* 1716. 4.
- Breyn. sent.* Jacobi Breynii Centuriae exoticarum, & minus cognitatarum plantarum &c. *Gedani* 1668. fol.
- = prodr.** Eiusdem prodromus I. *Gedani* 1680. & secundus *ibidem* 1689.
- Brow. jam.* Patricius Browne, natural. history of Jamaica &c. *London* 1756. fol.
- Brun. it.* Broyn Cornelius. Voyage au Levant &c. *Delf.* 1700. fol.
- Brunsf. herb.* Brunsfellius. Herbarium &c. *Argentorati* 1730. fol.
- Buchoz.* Histoire universelle du regne vegetal &c. a *Paris* 1773. fig. 1200. fol.
- Burm. Zeyl.* Burmannus Jo. Thesaurus zeylanicus &c. *Amstelodami* 1737. 4.
- = afric.** Eiusdem rariorum africanarum plantarum &c. *Amstelodami* 1738. 4.
- = Ind.** Eiusdem Flora Indica. *Amstelodami* 1768. 4.
- Burm. ger.* Laurentii Burmanni de Geraniis. *Lugd.-Bat.* 1759. 4.
- = dec.** Eiusdem decades IV. *Amstelodami* 1739.
- Burf.* Joachim Burler, Catalogus a Linneo recensitus, respondente Rolando Martini, cum titulo = Plantarum &c. *Upsalae* 1745.
- Butt. sun.* David Sigismundus Buttner, Enumeratio methodica plantarum carmine Jo. Christiani Cuno recensurum. *Amstelodami* 1750. 8.
- Buxb. cent.* Buxbaum Centuriae quinque rariorum plantarum &c. *Petropoli* 1740. 4.
- = aet.** Vid. Comment. Academiae Imp. Russicae.
- Casalp.* Andreæ Arctini Cæsalpini de plantis Lib. 16. *Florentiae* 1583. 4.
- Cam. hort.* Joachimi Camerarii Hortus medicus, & philosophicus &c. *Francfurti* 1586. 4.

- == *epit.* Eiusdem de plantis Epitome &c. *Francofurti ad Moenum* 1586. 4.
Catesb. carol. Catesby Marcus de plantis Carolinæ. *London* 1731. fol. *Anglico idiomate*.
Cluf pann. Clusius Carolus. Rariorum plantarum per Austriam &c. *Antuerpiæ* 1611.
 == *hist.* Eiusdem rariorum plantarum historia &c. *Antuerpiæ* 1601. fol.
 == *exot.* Eiusdem exoticorum Lib. 10. &c. *Raphelengii* 1605.
 == *cur.* Eiusdem Curæ posteriores &c. *Antuerpiæ* 1611. fol.
Cold. Noveb. Colden in actis Societatis scientiarum Upsalensis anno 1743.
Collec. Hau. Collectanea Societatis medicæ Hauniensis. *Vol. II. Hafniæ* 1775. 8.
Col. aut Colum. ecphr. Fabii Columnæ Ecphrasis minus cognitarum stirpium &c. *Neapoli* 1592.
 == *phytob.* Eiusdem Phytobasanos, seu plantarum aliquot historia. *Neapoli* 1592. fol.
Comm. Nov. Goët. Novi Commentarii Societatis regię Goëttingensis. *Goëttingæ* 1778. &c. 4.
Comm. noric. commercium literarium Noricum. *Norimbergæ* 1755-1758. *Vol. 5.*
Cummel. rar. Commelinus Jo. Horti Medici Amstelodamensis rariorum &c. *Amstelodami* 1693. fol. *Vol. II.*
Comm. hort. Commelinus Caspar Hort. Medici Amstelodamensis &c. 1697. 8.
 == *præclud.* Eiusdem Præcludia Botanica &c. *Lugduno-Batavi* 1703. 4.
Cook. it. Cook Jacobus Iter ad Polum australem &c. *Londoni* 1774. 4. fig. *Tom. III.*
Curd. hist. Valerii Cordi historię stirpium Lib. IV. *Argentorati* 1561. fol.
Corn. canad. Cornutus Jacob. Canadensium plantarum &c. *Parisii* 1635. 4.
Crantz fasc. Jo. Nepomitenus Crantz, Stirpium Austriacarum Fasciculi &c. *Pars I. II. Viennæ* 1769. 4.
 == *umbell.* Eiusdem Classis Umbelliferarum emendata. *Lipsiæ* 1767. 8.
 == *crucif.* Eiusdem Classis Cruciformium emendata. *Lipsiæ* 1769.
Cup. cat. Francisci Cupani Hortus catholicus. *Neapoli* 1696. 4.

- Cyrl. app.* Cyrilli appendix ad plantarum characteres. *Neapoli*.
- Dalech. hist.* Jacobi Dalechempii Historia generalis plant. *Lugduni* 1586. fol. Vol. II.
- De la Roche pl. nov.*
- Dickson.* Jo. Dickson Fasciculus plantarum cryptogamicarum Britannic. *Londini* 1785.
- Dill. hort. elih.* Jo. Jacobi Dillenii Hortus Elthamensis &c. *Londini* 1732. fol.
- ==== gießf.* Eiusdem Cathalogus plantarum circa Gießam nascentium. *Frankofurti* 179. 8.
- ==== musc.* Eiusdem Historia Mulcorum. *Oxonii* 1741. 4.
- Dodart mem.* Dodart Dionisius. *Memoires Paris* 1776. fol.
- Dod. pempt.* Dodonæus Rembertus. Stirpium historiarum pemptades 6. *Antuerpiæ* 1586. fol.
- Dombay.* *Vid. Journal des Sçivans.*
- Donati mat.* Donati Antonio. Trattato de' Semplici &c. *Venezia* 1731. 4.
- Duham. Arbr.* Duhamel, Traité des Arbres &c. Vol. a. *Paris* 1755. 4.
- Enciclop.* Enciclopedia, ou Dictionnaire &c. a *Livourne* 1770.
- Ellis cor.* Jean Ellis. Essai des Corallines, a l'Haye 1756. 4.
- Fehr.* Jo. Michaelis Fehr Anchora sacra &c. *Uratilavie* 1684. 8.
- Ferr. Fl.* Ferrari de florum cultura Lib. 4. *Roma* 1633. 4.
- Few. peruw.* Ludovicus Fewillee. Histoire des plantes &c. *Paris* 1714. 4.
- Fl. Dan.* Oederi, & Mülleri Icones Floræ Danicæ Fasc. 12. *Hafniæ* 1766. fol.
- Fl. Fridrich.* Otto Friderich Müller. Flora Friderichiana &c. *Hafniæ* 1767. 8.
- Fl. hass.* *Vid. Moench.*
- Fl. lapp.* *Vid. Linn.*
- Forsk. Æg.* Flora Ægyptiaco-Arabica, Petri Forskaeli. *Hafniæ* 1775. 4.
- ==== Suppl.* Supplementum ad calcem Floræ.
- ==== ic. rer. natural.* Eiusdem Icones rerum naturalium &c. *Hafniæ* 1775. 4.
- Forst. gen.* Georgii Forsteri characteres Generum &c. *Londini* 1766. 4.
- Francisc. Garc.* Franciscus Garcia Fernandex, Nuovo discorso &c. *Madrid* 1767. 4.

- Frezier it.* Relation &c. Nyon. 1716. 4. *ic.* 37.
Fuchsf. hist. Leonardi Fuchsi Historia plantarum Germaniæ .
Basileæ 1543. fol.
Garid. aix. Garidel, Histoire des plantes, qui naissent aux
 environ d'Aix. Aix 1715. fol.
Gerar. gallo- Gerardi Flora gallo-provincialis. *Parisiis* 1761.
prov. 8.
Gesfn. fasc. Conradi Gesneri historiæ plantarum fasciculus
 &c. *Norimbergæ* 1759. fol.
Giesfch. ic. Icones plantarum &c. *Hamburgi* 1779. fol.
Ginann. Adriat. Opere postume intorno a 114. piante nel mare
 Adriatico. *Venezia* 1655.
Gledsf. Fung. Glottlieb Gleditsch. Methodus Fungorum &c.
Berolini 1753. 8.
Gmel. Sib. Jo. Georgii Gmelini, Flora Sibirica &c. *Pe-*
terspoli 1768. 1769. 4. Vol. 4.
 === *it.* Samuel Gottlieb Gmelin &c. *Petersbour* 1774.
 4. Vol. I. III.
 === *fuc.* Eiusdem historia Fucorum. *Peterspoli* 1768. 4.
Gou. hort. Antonii Gouan hortus reg. Monspeliensis. *Lug-*
duni 1762. 8.
 === *illust.* Eiusdem Illustrationes, & observationes &c.
Tiguri 1773. fol.
Grew. mus. Nehemias Grew. Museum &c. 1781. fol.
Guett. mem. Guettard memoires &c. *Vid. Acad. paris.*
Gunn. norv. Gunnerus Henricus. Flora Norvegica 1772.
 fol. Pars I. II.
Hacq. Carn. Hacquet plantæ alpinæ Carniolicæ &c. *Viennæ*
 1782. 4.
Hall. hist. helv. Haller Albertus, Historia stirpium indigenarum
 Helvetiæ &c. *Bernæ* 1768. fol. Vol. 3.
 === *enum.* Eiusdem enumeratio methodica stirpium helve-
 ticarum. *Göttingæ* 1742. fol. Vol. 2.
 === *it. helvet.* Eiusdem iter helveticum &c. *Tiguri* 1736. fol.
 === *goett.* Eiusdem enumeratio plantarum horti, & agri
 Goettin. emendata, & aucta. *Göttingæ* 1753.
 fol.
 === *emend.* *Vid. goett.*
 === *opusc.* Eiusdem opuscula botanica. *Göttingæ* 1749. 8.
 === *all.* Eiusdem, Allii genus naturale. *Göttingæ* 1745.
 4.
 === *app.* Eiusdem appendices I. II. III. ad Agrostogra-
 phiam Scheuczeri. *Tiguri* 1771. 4.
Hedw. musc. Hedwigius Jo. Fundamentum historiæ natura-
 lis Muscorum &c. *Lipsiæ* 1782. Vol. 2. cum
 figuris.

- == *Stirp. crypt.* Eiusdem *Stirpes cryptogamæ novæ, & dubiæ. Lipsiæ 1786. T. I. fasc. 4. cum figuris coloratis.*
Helv. Pulsat. Helvingius Georgius Andreas. *Flora Campana, seu Pulsatilla &c. Lipsiæ 1720. 4.*
Herit. Stirp. *Stirpes novæ descriptionibus, & iconibus illustratæ a Carolo Ludovico Heritier &c. Fasc. 5. Parisiis 1784.*
Herm. Lugd. Pauli Hermannii *Catalogus plantarum horti Academici Lugduno-Batavi &c. Lugduno-Batavi 1687. fol.*
 == *par.* Eiusdem *Paradisus Batavus &c. Lugduno-Batavi 1694. 4.*
 == *differtatio* de Rosa. *Argentorati 1762. 4.*
 == *afric.* *Catalogus plantarum &c. ineditus.*
Hern. mex. Hernandæ Franciscus. *Nova plantarum Mexicanorum &c. Romæ 1651. fol.*
Hill. anat. Hill The Vegetable systeme &c. *London 1759. fol.*
 == *plant.* *Herbarium Britannicum Londini 1779. 8. Vol. 2.*
 == *hort. kev.* Eiusdem hortus Kevenius &c. *Londini 1768. 8.*
R. H. P. Hortus regius parisiensis. *Paris 1665. fol.*
Hort. Angl. *Vid. Miller.*
Hort. mal. *Vid. Rheed.*
Hort. eyfl. Hortus eyfletensis Basilii Besleri &c. *Norimbergæ 1613. fol.*
Houss. Ad. Angl. *Vid. Philoſof. transact.*
Hudf. Fl. Angl. Gulielmi Hudsoni *Flora Anglica. Londini 1762. 8.*
Hugh. barb. Hughes Griff. *The natural &c. London 1750. fol.*
Jacq. Austr. Nicolai Jacquini *Flora Austriaca. Vindobonæ T. 5. fol.*
 == *hort. Vindob.* Eiusdem Hortus Vindobonensis. *T. 3. fol.*
 == *enum. Vind.* Enumeratio stirpium plerumq. agri Vindobonensis. *Vindobonæ 1762. 8. cum fig.*
 == *misc.* Eiusdem miscellanea austriaca. *Vindobonæ.*
 == *obſer.* Eiusdem Observationum botanicarum *Part 1-IV. Vindobonæ 1771. 4.*
 == *amer.* Eiusdem, selectarum *Stirp. Americ. historia. Vindobonæ 1760.*
 == *amer. edit.* Eiusdem Observationum botanicarum. *edit. 2. a. pida.*
Jonſton. Jonſtonii *historia naturalis de arboribus, & plantis Lib. X. Francofurti 1769. Vol. 2. fol. cum fig.*

- Journ. enciclop.* Vide Bouillon.
- Isnard Að.* Danty Antonius. *Vid. Acad. parls.*
- It. W gotk. Lin.* Iter Westrogothicum. *Holmiæ* 1743.
- Juss. Að.* Vid. *Að. Acad. parls.*
- Juss. in dem.* Jussieu in demonstratione horti regii parisiensis.
- Kæmph. amæn.* Kæmpherus Engelbertus Amænitarum Academicæ Lemgovix 1712. 4.
- Kniph. cent.* Kniphof Centuriæ I. XII. *Hala Mugd. fol.*
- Kniph. orig.* *Vid. eiusdem Cent.*
- Knoop. pomol.* I. Herman Knoop, Pomologia. *Norimbergæ* 1760 66. fol.
- Knorr. del. hort.* Knorr Thesaurus rei herbariæ, hortensisque. Pars I. II. *Norimb.* 1772. fol.
- ==== flor.* Eiusdem Regnum Floræ &c. *Norimb.* 1750. fol. Tab. 200. florum.
- Lat. amer.* De Laert Jo. Novus orbis &c. *Lugduno Batavorum* 1633. fol.
- Lederm micros.* Ledermuller, Observationes microscopicae.
- Leers herb. 1.* Leers Flora herborensis. *Herbornæ Nassou D.n.* 1775. 8.
- Leisfom Diff.* John. Coaklei Leisfom, Observationes ad historiam Thexæ pertinentes. *Leidæ* 1769. 4.
- Lugt.*
- Lightf. Scot.* Jo. Lightfootus. Flora Scotica, sive plantæ Scotiæ &c. *Londini* 1777. 8. fig. *idiomate anglico.*
- Lind. alf.* Lindern Francus Balthassar Hortus Alfaticus. *Argentorati* 1747. 8.
- Lin. Fl. Svec.* Caroli Linnæi Flora Sveciæ. *Holmiæ* 1761. 8.
- ==== Fl. Lapp.* Eiusdem Flora Lapponica. *Amstelodami* 1737. 8.
- ==== Fl. Zeyl.* Eiusdem Flora Zeylanica. *Holmiæ* 1747. 8.
- ==== Hort. Cliff.* Eiusdem Hortus Cliffortianus. *Amstelodami* 1737. fol.
- ==== amæn. acad.* Eiusdem Amænitates academicæ &c. *Lugduno Batavi* 1749. 8.
- ==== suppl.* Eiusdem Supplementum plantarum Systematis Vegetabilium. *Brunsvigæ* 1781. 8.
- ==== Diff. musc.* Eiusdem Dissertationes muscorum. *Upsaliæ* 1781. 4.
- ==== Diff. de Hyper.* Eiusdem Dissertatio de Hyperico.
- ==== fasc.* Eiusdem fascic. plant. rariorum &c.
- Linna. fil. dec.* Linnæus filius (Caroli) Rariorum plantarum Decades, *Upsaliæ* 1762-63.
- Lob. illustr.* Lobelii Stirpium Illustrationes &c. *Londini* 1656. 4.

- == is. Matthiæ Lobelii Icones plantarum. *Antuerpia* 1681. 4.
 == adv. Lobelii Adversariorum &c. *Antuerpia* 1581. fol.
 Loeft. it. Petrus Loeßingius, Iter hispanicum. *Stoccolm.* 1753. 8.
 Loefel. pruss. Loefelius Jo: Flora Prussica &c. *Regiomonti* 1703. 4.
 Ludw. ed. Christ. Gottl. Ludwigius, Ætropa vegetabilium. Cent. 1. II. *Lipsiæ*, fol.
 Maerb. N. Maerburg Plantæ rariores vivis coloribus &c. *Lugduno-Batavi*. 1789. Tab. 55.
 Magn. bot. Petri Magnolii Botanicum monspeliense, cum monsp. iconibus, & appendice. *Monspeltii* 1686. 8.
 == hort. parif. Eiusdem Hortus regius parisiensis, seu catalogus &c. *Monspeltii* 1697. 8.
 Mapp. als. Mappii Historia plantarum Alsaticarum. *Argentorati* 1742. 4.
 Marcgr. bras. Marcgravius Georgius, Historia rerum naturalium Brasiliæ &c. Extat cum Pisone in historia Brasiliæ. *Lugduno-Batavi* 1648. fol.
 Mart. Hortus Jo: Martyn, Methodus plant. circa Cantabrigiam &c. *Londini* 1727. 12.
 == cent. Eiusdem Centuriæ &c.
 == decad. Martyn Jo: Historia plant. &c. Decades V. *Londini* 1728. fol.
 Matth. Pietro Andrea Mattioli, sei discorsi sopra Dioscoride. *Venezia* 1604. Vol. II. fol.
 Med. obs. soc. æcon. Lurr. 1771. 1776. 4. Svecico idiomate.
 Menz. pug. Mentzelius in pug. rariorum plantarum ad calcem indicis edito. *Berolini* 1682. fol.
 Mer. Surin. Merian Maria Sibilla. Metamorphosis Insectorum Surinamensium. *Amstelodami* 1705. 1709. fol.
 Mich. gen. Petri Antonii Micheli, Nova plantarum genera. *Florentiæ* 1729. fol.
 Mill. di3. Philippi Miller the gardeners Dictionary . . . 1755-60. fol. Vol. 2. *Tabulæ* 300.
 Mill. Jo: Opuscula nova.
 Mife. Taur. Miscellanea philosophico-mathematica Taurinensia. *Taurini* 1764. 4.
 Moench. hass. Enumeratio plantarum indigenarum Hassiæ,

- præsertim inferioris. *Moeng. Pars 1. Casel-
lus 1777. 8.*
- Mont. in Zann.* Jacobi Zannoni historia botanica, latine red-
dita a Casetano Montio. *Bononiæ* 1742.
fol.
- == prodr.* Josephi Monti, Prodrum stirp. agri Bono-
niensis, 1719. 4.
- == gram.* Eusebii, Catalogi Stirp. &c. Gramina, &
adfinia complectens. *Bononiæ, Pisauri 1719.*
fig.
- Morif. hist.* Roberti Morisusonii historia plantarum. *Oxonii*
1672. 1699. Vol. 3 *fl.*
- == umbell.* Eiusdem plantarum umbelliferarum nova distri-
butio. *Oxonii 1672. fol.*
- Müll. fasc. seu. it. Vite Fi. Dan.*
- Müll. Fridr.* Müller Flora Fridrichsdalina. *Argentorati*
1767. 8.
- Munch.* Munchausen &c. Hannorer 1769. *idiomate ger-
manico.*
- Munt. phyt.* Muntingii Phytographia curiosa. *Amstelodami*
1711. *fol.*
- Munt. brit.* Munting Abraham, de vera herba britanni-
ca. *Amstelodami 1698.*
- Murr. prodr. seu. Fl. Goett. Jo.* Antonius Murray, Prodro-
mus designationis stirpium Goettingensium.
Gottingæ 1770. 8.
- Mutis amer.* MSS. apud cl. Smit Londin.
- Nek. musc.* Neker methodus muscorum. *Mankemii 1771.*
8.
- == Gallo-belg.* Eiusdem Delicizæ Gallo-belgica. *Argentorati*
1768. Vol. 2. 8.
- Niss. Ad.* Nissolius &c. *Vid. Acad. paris.*
- Oed. Dan.* Oederi Flora Danica. *Hafniæ 1766. fol.*
- Osbeck it.* Osbeck Pietro, Giornale di un viaggio nell'
Indie orientali. *Stockholm 1753. idiomate*
Svecico.
- Pall. it.* Pallas Reise &c. Pars I. III. *Petersburg. 1771.*
1776. 4. *idiomate . . .*
- Park. par.* Jo: Parkintonii Paradisus terrestris. *Londini*
1629. *fol.*
- == theat.* Eiusdem Theatrum botanicum. *Londini, 1640.*
fol.
- Petit. epis.* Petitus Franciscus. Trois lettres &c. *Namur*
1710. 4. Pl. 6.
- Petiv. gram.* Petiverius graminum &c. *Londini 1716. fol.*
== gar.

- == gaz. Eiusdem Gazophilacii &c. *Londini* 1702. fol.
 == filic. Eiusdem Pierigraphia americana &c. *Londini* 1712. fol. Tab. ic. XX.
 == mus. Eiusdem musei &c. *Londini* fol.
 == herb. brit. Eiusdem Herbarii Britannici &c. *Londini* 1732.
 Pult. it. Piller iter per Pofeginam Sclavoniæ provin-
 ciam. *Bude* 1783. 4.
 Pis. bras. Pifo Gulielmus, Historia naturalis Brasiliæ.
Amstelodami 1648 fol.
 Plot oxf. Plot Robertus, The natural &c. *Oxford*. 1677.
 fol.
 Pluk. alm. Leonardi Plucknetii, Almagestum botanicum.
Londini 1696. fol.
 == phyt. Eiusdem Opera omnia Botanica. *Londini* 1710.
 Vol. 2.
 == mant. Eiusdem mantissa.
 Plum. gen. Plumierius Carolus, Nova plantarum gene-
 ra. 1703. 4.
 == ic. Eiusdem description des plantes &c. *Paris*
 1693. fol.
 == MSS. Les manuscrits &c. conservez au cabinet d'E-
 stampes du Roi, a Paris.
 Pocock orien. Pocock, Osservazioni fatte ne' suoi viaggi.
Londra 1745. Vol. 2.
 Pollich pal. Pollich, Historia plantarum in Palatinatu E-
 lectorali sponte nascentium. Tom. I. III.
Manheimi 1776-1778. 8.
 Pon. bald. Gio: Pona, Monte baldo descritto. *Venezia*
 1617. 4.
 Pont. diff. & Julii Pontederæ Anchologia, & dissertationes
 anchol. Botanica. *Patavii* 1720. 4.
 Pourr. mem. Pourret, Memoires de l'Academie de Tou-
 louse.
 Quer. Fl. hisp. Jos. Quer, Flora Espanola &c. *Madrid* 1762.
 4. Tom. 2.
 Rail Angl. Jo: Rai, Catalogus plantarum &c. *Londini*
 1677.
 == Synops. Eiusdem Synopsis methodica stirpium Britanni-
 carum. *Londini* 1724. 8.
 Raw. is. Rauwolfius Leonardus, Itinerarium &c. *Frank-
 furti* 1581. 4.
 Renalm. sp. Pauli Renesmi, Specimen &c. *Typis W'echel-
 iensis* 1619. 4.
 Retz. Obs. Retzius, Observationum Botanicarum fasc.
 IV. &c. *Lipsiæ* 1779. fig.


- = *prod. Fl. Scand.* Retzius, *Prodromus Floræ Scandinaviæ Holmæ* 1779. Vol. 2. 8.
Rheed mal. Van Reede Henricus, *Horti Malabarici Par- tes XII. Amstelodami* 1666, 1692. Tom. 12. in Vol. 6. fig.
Riv. monop. Augusti Rivini, *Ordines plantarum fl. irregu- lari monopetalo. Lipsiæ* 1690.
 = *scrr.* Eiusdem *Ordines &c. fl. tetrapetalo. Lipsiæ* 1699.
 = *pent.* Eiusdem *Ordo &c. fl. pentapetalo. Lipsiæ* 1691. fol.
Robert. is. Robertus Nicolaus. *Varia, ac multiformes &c. Parisiæ* 4.
de la Roche. Specimen sistens plantarum aliquot descriptio- nes. *Lugduno-Batavi* 1766. 4. cum fig.
Roi habbk. Jo: Philippi du Roy. *Die habbkette &c. Brunschweig* 1771. Tom. II. 8.
Rolf hort. Crisiani Ludovici Rolff, *Index plantarum, quæ sunt Berolini in horto Krausiano. Berol.* 1747. 4.
Rottb. descr. Christophori Friles Rottboell, *Descriptiones, & icones rariorum plantarum Lib. I. Haf- niæ* 1773. fol.
 = *collect. hau.* Rottboell in collectione Societ. medicæ *Hau.*
Rudb. elys. Olai Rudbecki, *Campi Elisæ. Upsaliæ* 1702. fol.
Rumph. amb. Georgius Averardus Rumphius, *Herbarium Amboinense &c. Amstelodami* 1741. fol.
Rupp. jen. Henrici Bernardi Ruppri, *Flora jenensis ab Alberto Hallero edita. Jenæ* 1745. 8.
Ruff. Alep. Alexius Rufiel, *Historia naturalis Alepi. Lon- dini* 1736. 4.
Sabb. hort. Liberatus Sabbatus, *Hortus Romanus &c. Tom. III. Romæ* 1775. fol.
Schæff. Fung. Schæffer, *Fungorum Bavaricæ icones. Ratif- bone* 1763. Vol. IV. 4.
Scheuchz. agrost. seu grain. Jo: Scheuchzeri *Agrostographia, seu historia graminum. Tiguri* 1719. 4. Accedunt Al- berti Hall. *Appendices IV. Tiguri* 1775. 4.
 = *is.* Eiusdem *Itinera alpina. Lugduno-Batavi* 1733. Vol. II. 4.
Schill. de Lepr. Schillingius de Lepra. *Lugduno-Batavi* 1778. 8. fig.
Schmied. is. Casimiri Schmiedelii, *Icones plantarum &c. Norimburgæ* 1748. fol.

- Schreb. spicil.* Jo: Christophori Dan. Schreberi Spicilegium
Floræ Liphæ. Lipsiæ 1771. 8.
- = dec.* Eiusdem icones, & descriptiones plantarum &c.
Hile 1776.
- = gram.* Eiusdem Gramina &c. Lipsiæ 1769 fol.
- = phasc.* Eiusdem de Phasco observationes &c. Lipsiæ
1770. 4.
- = unilab.* Eiusdem plantarum verticillatarum, unilabia-
tarum Genera, & Species. Lipsiæ 1774 4.
- Schwenk hort.* Medic. Hagæ 1776.
- Scop. Carn.* Scopoli Flora Carniolica. Editio 2. Vindobo-
næ 1772. Vol. II. 8.
- = Delle. Inf.* Eiusdem Deliciæ Floræ, & Faunæ Insubricæ.
Ticini 1786. Parses 2. fol. fig.
- Seb. mus.* Seba Museum, sive rerum naturalium thesau-
ri descriptio &c. T. 4
- = thes.* Eiusdem locupletissimi rerum naturalium thesau-
ri &c. Amstelodami 1735.
- Segu. ver.* Jo: Francisci Seguerij, Plantæ Veronenses.
Veronæ 1745 Vol. II. 8.
- = Suppl.* Eiusdem supplementum. Veronæ 1754 8.
- Sesl. epis.* Sesler Leone Lettera intorno a un nuovo
Genere di piante terrestri.
- Shaw afric.* Shaw Thomas Catalogus plantarum &c. Oxo-
niæ 1748. fol.
- Sibb. Scot.* Roberti Sibbaldi, Scotia illustrata. Edinburgi
1684.
- Sloan. Jam.* Sloane, Catalogus plantarum, quæ in insula
Jamaica &c. Londini 1695
- Schmiedel. oust.* Casimirus Xtophorus Schmiedel Fasciculi. Er-
langg.
- Sonner. voyag.* Sonnerat, ou voyage a la nouvelle Guinée
&c.
- specim. pedem.* Caroli Allioni, Pedemontii Stirpium Specimen
primum. Augustæ Taurinorum 1755. 4
- Starb. fung.* Francisci Wan Sterrebeek, Theatrus fungorum.
Amstercpæ 1754. 4.
- = citr.* Eiusdem Citri cultura &c. Amstercpæ 1712. 4.
- Stillinghl. misc.* Benjamin Stillingfleet, Miscellaneous &c. Lon-
don 1762. 8.
- Stiff. bot.* Stifferus, Botanica curiosa &c. Helmstadii
1697. 8.
- Swert. fl.* Swertus Florilegium &c. Francofurti apud
Moenum 1612. fol.

- Tabern. ic.* Jo: Theodori Tabernæmontani, historia plantarum. *Frankfurt* 1613. fol.
- Thal. herc.* Jo: Philii Sylva Hercynica, post Camerarii orium.
- Tumb. Jap.* Caroli Petri Thunberg, Flora Japonica &c. *Lipsæ* 1784.
- = *nov. gen.* Vid. *Ad. medic. Svecic.*
- = *Diff. de Oxalide.*
- = *Diff. de Ixia.*
- = *Diff. de Iride.*
- = *Diff. de Protea.*
- = *Diff. de Gardenia.*
- Till. pis.* Michaelis Angeli Tilli, Catalogus plantarum Horti Pisani. *Florentiæ* 1723. fol.
- Tourn. infl.* Josephi Pitton Tournetortii, Institutiones rei herbariæ. *Parisiis* 1719. Vol. III. 4.
- = *cor.* Eiusdem corollarium.
- = *it.* Eiusdem, voyage au Levant &c.
- Trag. hist.* Hieronimi Tragi, De stirpium natura. *Argentina* 1552. 4.
- Trew pl. rar.* Dec. Chrysophori Jacobi Trew, Plantæ selectæ, delineatæ a Jacobo Ehret. *Londini* 1750.
- Triumph. obs.* Jo: Baptistæ Triumphetti Observationes &c. *Romæ* 1685. 4.
- = *prælus.* Eiusdem prolusio ad publicas &c. Accedunt novarum stirpium descriptiones, & icones. *Romæ* 1700. 4.
- Turra prodr.* Turra Prodromus floræ Italicæ. *Vicentiæ*, 1780. 8.
- = *animadv.* Eiusdem Farsetia novum genus, cum quibusdam animadversionibus &c. *Venetis* 1765. 4.
- = *Giorn.* Eiusdem Giornale enciclopetico d' Italia.
- Vaill. paris.* Sebastiani Vaillant, Botanicum parisiense. *Lugduno-Batavi* 1727. fol.
- = *Ad. paris.* Vide *Ad. parisiens.* 1719.
- Vallisn. op.* Antonio Vallisneri Opere fisico-medice &c. *Venezia* 1733. Vol. III. fol.
- Vandel. fasc.* Vandelli Fasciculi &c. *Udissipona* 1771. 4.
- Vesl. Æg.* Jo: Veslingius, Observationes &c. ad Profperi Alpini librum de plantis Ægypti. *Patavi* 1638. 4.
- Vill. prosp.* Villars, Prospectus de l'histoire des plantes du Dauphiné. *Grenoble* 1779. 8.
- Virid. flor.* Viridarium florentinum. *Florentiæ* 1751. 8.

- Wach. Ultraj.* Wichendorffii Hortus Ultrajensis &c. *Ultraj.*
jeđi 1747. 8.
- Walth. hort.* Friderici Waltheri, Designatio plantarum hor-
 ti sui. *Lipsiæ* 1731. 8.
- Web. spicil.* Georgii Weber sociilegium Floræ Gottingen-
 sis. *Göttingæ* 1778. 8.
- Weig. pom.* Christophori Weigel Flora Pomerano-rugica.
Berolini 1769. 8.
- = *Obs. bot.* Observationes Botanice &c. Gryphæ. 1772. 4.
- Weis. crypt.* Plantæ cryptogamicæ Floræ Goettingensis D.
 Friderici Guili. Weis. *Göttingæ* 1770. 8.
- Wrisb. animal.* Hermannus Wrisberg Observationum de ani-
 malculis infusoris satura; *Göttingæ* 1765. 8.
- Wolk. hesp.* Wolkamerius Jo: Christophorus Helpeides &c.
Norimbergæ 1703. fol.
- = *norimb.* Jo: Georgius Wolkamerius Flora Norimber-
 gica, 1772. 4.
- Zann.* Zaunoni Giacomo, Istoria botanica. *Bologna*
 1675. fol.
- Zinn hort.* Zinn, Catalogus horti Gottingensis. *Göttingæ*
 1757. 4.
- Zorn. ic.* Zornus Bartolomæus, Botanologia medica &c.
Berolini 1714. 4. fig.
- Zannich. it.* Zannichelli Opuscula botanica posthuma conti-
 nentia varia itinera &c. *Veneriti* 1730. 4.
- = *Venet.* Zannichelli Gio: Girolamo Istoria delle piana-
 te, che nascono ne' lidi interno a *Venezia*
 1731. fol.





INDEX GENERUM

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| A beremea . III. | 387 | Agyneia . <i>Vid. addenda in cal-</i> | |
| Ablania . III. | 382 | <i>ce operis .</i> | |
| Abroma . IV. | 349 | Aiouea . II. | 373 |
| Abrus . IV. | 181 | Aira . L | 86 |
| Abura . III. | 387 | Alronia . IV. | 92 |
| Acaena . L | 336 | Ajuga . III. | 397 |
| Acalypha . V. | 350 | Aizoon . III. | 246 |
| Acanthus . III. | 547 | Albica . II. | 302 |
| Acer . VI. | 33 | Alcea . IV. | 119 |
| Achillea . V. | 100 | Alchemilla . L | 318 |
| Achras . II. | 347 | A'dovranda . II. | 216 |
| Achyranthes . II. | 51 | Alettris . II. | 318 |
| Aciphylla . VI. | 73 | Aleurites . V. | 384 |
| Aciva . IV. | 159 | Alisma . II. | 369 |
| Acnida . V. | 417 | Allamanda . II. | 63 |
| Aconitum . III. | 319 | Allionia . L | 286 |
| Acorus . II. | 339 | Allium . II. | 286 |
| Acosmoa . IV. | 342 | Allophyllus . II. | 390 |
| Acrosticum . VI. | 91 | Alcæ . II. | 330 |
| Actæa . III. | 292 | Alopecurus . L | 176 |
| Adansonia . IV. | 117 | Alpinia . L | 6 |
| Adelia . V. | 443 | Alfina . II. | 202 |
| Adenantha . III. | 33 | Alfonia . III. | 287 |
| Adenia . II. | 371 | Astroemeria . II. | 337 |
| Adenostemma . V. | 198 | Althæa . IV. | 128 |
| Adiantum . VI. | 133 | Alyssum . IV. | 26 |
| Adonis . III. | 358 | Amanoa . II. | 243 |
| Adoxa . II. | 410 | Amaranthus . V. | 314 |
| Aegilops . VI. | 23 | Ameryllis . II. | 283 |
| Ægiphila . L | 314 | Amasonia . III. | 349 |
| Ægopodium . II. | 184 | Ambelania . II. | 243 |
| Ægopricon . V. | 291 | Ambrosia . V. | 321 |
| Ælchinomene . IV. | 268 | Ambrosina . V. | 269 |
| Æsculus . II. | 376 | Amellus . V. 115. | 115 |
| Æthusa . II. | 168 | Amerimnon . II. | 344 |
| Agaricus . VI. | 288 | Ameryslea . L | 56 |
| Agave . II. | 335 | Ammannia . L | 329 |
| Ageratum . IV. | 474 | Ammi . II. | 136 |
| Agrimonia . III. | 173 | Amomum . L | 3 |
| Agrostemma . III. | 131 | Amorpha . IV. | 199 |
| Agrostis . L | 179 | Amygdalus . III. | 218 |

D d iv

| | | | |
|---|------------|-------------------|-----|
| Amyris . II. | <u>392</u> | Arabis . IV. | 59 |
| Anabasis . II. | <u>103</u> | Arachis . IV. | 217 |
| Anacardium . II. | 453 | Aralia . II. | 205 |
| Anacyclus . V. | <u>103</u> | Arbutus . III. | 56 |
| Anagallis . L. | 413 | Arctium . IV. | 427 |
| Anagyris . II. | <u>14</u> | Arctopus . VI. | 58 |
| Anastatica . IV. | 10 | Arctotis . V. | 157 |
| Anchusa . L. | <u>385</u> | Arduinia . II. | 39 |
| Ancistrum . L. | 72 | Areca . VI. | 394 |
| Andrachne . <i>Vid. addenda</i> <i>in calce operis .</i> | | Arenaria . III. | 103 |
| Andromeda . III. | <u>53</u> | Arethusa . V. | 235 |
| Andropogon . VI. | 9 | Arenia . L. | 403 |
| Androface . L. | 405 | Argemone III. | 297 |
| Andiyala . IV. | <u>418</u> | Argophyllum II. | 41 |
| Anemone . III. | 342 | Aristida L. | 229 |
| Anethum . II. | <u>18</u> | Aristolochia . V. | 257 |
| Angelica . II. | <u>158</u> | Aristotelia III. | 200 |
| Anguria . V. | <u>291</u> | Arnebia II. | 245 |
| Aniba . II. | 443 | Arnica V. | 84 |
| Anisophyllum . VI. | <u>396</u> | Arouna . L. | 79 |
| Annona . III. | <u>339</u> | Artemisia . V. | 134 |
| Anthemis . V. | <u>104</u> | Artemisia . V. | 4 |
| Anthericum . II. | 312 | Artocarpus . V. | 288 |
| Anthicorus . II. | <u>389</u> | Aruba . II. | 257 |
| Anthistiria . L. | <u>226</u> | Arum . V. | 209 |
| Anthoceros . VI. | <u>208</u> | Arundo . L. | 227 |
| Antholyza . L. | <u>106</u> | Asarum . III. | 157 |
| Anthospermum . VI. | <u>57</u> | Ascarina . V. | 447 |
| Anthoxanthum . L. | <u>73</u> | Asclepias . II. | 36 |
| Anthyllis . IV. | <u>214</u> | Ascyrum . IV. | 364 |
| Antidesma . V. | 416 | Aspalathus . IV. | 192 |
| Antirrhinum . III. | 484 | Asparagus . II. | 318 |
| Apactis . III. | 160 | Asperugo . L. | 394 |
| Apeiba . III. | 375 | Asperula . L. | 293 |
| Aphanes . I. | <u>339</u> | Asphodelus . II. | 312 |
| Aphyllanthes . II. | <u>281</u> | Asplenium . VI. | 108 |
| Aphyteja . IV. | <u>86</u> | Aster . V. | 60 |
| Apium . II. | <u>184</u> | Astragalus . IV. | 293 |
| Apluda . VI. | 20 | Astrantia . II. | 123 |
| Apocynum . II. | <u>84</u> | Astronium . V. | 415 |
| Aponogeton . II. | <u>378</u> | Athamanta . II. | 142 |
| Aporeica . VI. | <u>71</u> | Athanasia . IV. | 484 |
| Aquartia . L. | 207 | Atractylis . IV. | 452 |
| Aquilegia . III. | <u>332</u> | Atragene . III. | 349 |
| Aquilicia . II. | <u>45</u> | Atraphaxis . II. | 355 |

Bunias . IV.
 Bunium . II.
 Buphtarum . V.
 Bupleurum . II.
 Burmannia . II.
 Busfera . II.
 Butomus II.
 Buxbaumia V.
 Buxus V.
 Byllus VI.
 Butneria II.

C

Cacalia IV.
 Cacao . IV.
 Cachrys . II.
 Cacoucia . III.
 Cactus . III.
 Cadaba . II.
 Cadamba . II.
 Cadia . III.
 Cæfalpinia III.
 Calamus . II.
 Calea . IV.
 Calceolaria L.
 Colendula V.
 Calinea III.
 Calla V.
 Callicarpa . L.
 Calligonum . III.
 Callina . L.
 Callitriche . L.
 Calodendrum . II.
 Calophyllum . III.
 Caltha . III.
 Calycanthus . III.
 Cambogia . III.
 Camellia . IV.
 Cameraria . II.
 Camocladia .
 Campanula . L.
 Camphorosma . L.
 Canarium . V.

72
 137
 128
 123
 270
 349
 436
 135
 313
 284
 29
 393
 163
 2
 417
 288
 516
 495
 250
 379
 254
 35
 438
 432
 295
 459
 64
 449
 373
 49
 29
 341
 258
 414
 181
 331
 309
 395
 18
 193
 279
 454
 468
 290
 425
 386
 305
 245
 276
 406
 132
 28
 457
 395
 40
 461
 156
 147
 149
 204
 248
 259
 141
 27
 240
 482
 49
 156
 378
 271
 307
 326
 120
 13
 40
 302
 373
 275
 297
 153
 74
 92
 441
 357
 415
 Canarina . II.
 Canella . III.
 Canna . L.
 Cannabis . V.
 Capparis . III.
 Capraria . III.
 Capsicum . L.
 Capura . II.
 Caraipa . III.
 Carapichea . II.
 Cardamine . IV.
 Cardiospermum . II.
 Carduus . IV.
 Carex . V.
 Carica . V.
 Carissa . II.
 Carlina . IV.
 Caronba . II.
 Carexylon . II.
 Carpesium . V.
 Carpinus . V.
 Carpodetus . II.
 Carthamus . IV.
 Carum . II.
 Caryocar . III.
 Caryophyllus . III.
 Caryota . VI.
 Cassia . III.
 Cassine . II.
 Cassipourea . III.
 Cassya . II.
 Castilleja . III.
 Casuarina . V.
 Catananche . IV.
 Catanga . III.
 Catesbæa . L.
 Catha . II.
 Catinga . III.
 Caturus . V.
 Caucalis . II.
 Ceanothus . II.
 Cebatha . V.
 Cecropia . V.
 Cedrela . II.

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Celastrus . II. | 30 | Chrysosplenium . III. | 63 |
| Celofia . II. | 51 | Chrysotrix . VI. | 61 |
| Celsia . III. | 302 | Cicca . V. | 311 |
| Celtis . VI. | 37 | Cicer . IV. | 251 |
| Cenchrus . VI. | 21 | Cichorium . IV. | 426 |
| Centaurea . V. | 134 | Cicuta . II. | 167 |
| Centunculus . L | 319 | Cimicifuga . III. | 331 |
| Ceodes . VI. | 74 | Cinchona . L | 451 |
| Cephalanthus . L | 274 | Cnenaria . V. | 72 |
| Cerastium . III. | 133 | Cinna . L | 14 |
| Ceratocarpus . V. | 287 | Ciponiran . III. | 380 |
| Ceratonia . VI. | 61 | Cipura . L | 248 |
| Ceratophyllum . V. | 331 | Circea . L | 23 |
| Cer-tospermum . II. | 383 | Cissampelos . V. | 44 |
| Cerbera . II. | 65 | Cistus . L | 319 |
| Cercis . III. | 14 | Cistus . III. | 309 |
| Cerithe . L | 392 | Cutharexylum . III. | 311 |
| Ceropegia . II. | 77 | Citrus . IV. | 351 |
| Ceruana . V. | 198 | Clathrus . VI. | 356 |
| Cestrum . II. | 3 | Clavaria . VI. | 364 |
| Chaerophyllum . II. | 171 | Claytonia . II. | 49 |
| Chalcas . III. | 32 | Clematis . III. | 350 |
| Chamaerops . VI. | 389 | Cleome . IV. | 77 |
| Chamira . IV. | 49 | Cleonia . III. | 467 |
| Chara . V. | 289 | Clerodendrum . III. | 543 |
| Chayota . V. | 383 | Clethra . III. | 56 |
| Cheiranthus . IV. | 49 | Cleyera . III. | 304 |
| Chelidonium . III. | 294 | Chibadium . V. | 354 |
| Chelone . III. | 483 | Cliffortia . V. | 415 |
| Chelonea . II. | 56 | Clinopodium . III. | 446 |
| Chenopodium . II. | 94 | Clitoria . IV. | 234 |
| Cherleria . III. | 109 | Clusia . VI. | 31 |
| Chimarrhus . II. | 249 | Cutia . V. | 445 |
| Chiococca . L | 464 | Clypeola . IV. | 31 |
| Chionanthus . L | 23 | Cneorum . L | 42 |
| Chironia . II. | 9 | Cnicus . IV. | 449 |
| Chlora . II. | 395 | Coccoloba . II. | 433 |
| Chomelia . L | 349 | Cochlearia . IV. | 21 |
| Chondrilla . IV. | 390 | Cocos . VI. | 391 |
| Chondropetalum . V. | 448 | Codia . II. | 426 |
| Chrysanthemum . V. | 93 | Codon . III. | 30 |
| Chrysobalanus . III. | 223 | Coffea . L | 463 |
| Chrysocoma . IV. | 478 | Coix . V. | 294 |
| Chrysogonum . V. | 155 | Colchicum . II. | 367 |
| Chrysophyllum . II. | 16 | Coldenia . L | 343 |

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| Collinfonia . L. | 71 | Coumarouna . IV. | 340 |
| Columnea . III. | 546 | Couratari . IV. | 160 |
| Colutea . IV. | 260 | Couroupita . IV. | 159 |
| Comarum . III. | 274 | Couffarea . L. | 356 |
| Combretum . II. | 389 | Couffapea . VI. | 70 |
| Cometes . L. | 311 | Crambe . IV. | 75 |
| Commelina . L. | 113 | Craniolaria . III. | 496 |
| Comaerlonia . II. | 207 | Crassula . II. | 218 |
| Comocladia . L. | 98 | Cratægus . III. | 224 |
| Conami . II. | 457 | Cratæva . III. | 163 |
| Concevreiba . V. | 457 | Creneæ . III. | 279 |
| Conferva . VI. | 278 | Crepis . IV. | 412 |
| Conium . II. | 138 | Crescentia . III. | 512 |
| Connarus . IV. | 93 | Cressa . II. | 104 |
| Conobea . III. | 554 | Crinum . II. | 208 |
| Conocarpus . L. | 470 | Cristaria . III. | 142 |
| Conohovia . II. | 242 | Crithmum . II. | 147 |
| Convallaria . II. | 322 | Crocus . L. | 93 |
| Convolvulus . L. | 423 | Crossostylis . IV. | 161 |
| Conyza . V. | 32 | Crotalaria . IV. | 200 |
| Cookia . III. | 141 | Croton . V. | 352 |
| Copaifera . III. | 61 | Crucianella . L. | 303 |
| Coprofma . VI. | 73 | Cruzita . L. | 339 |
| Corchorus . III. | 321 | Cucubalus . III. | 87 |
| Cordia . II. | 10 | Cucumis . V. | 369 |
| Coreopsis . V. | 128 | Cucurbita . V. | 368 |
| Coriandrum . II. | 169 | Culhamea . III. | 199 |
| Coriaria . V. | 431 | Cuminum . II. | 165 |
| Coris . L. | 423 | Cunila . L. | 57 |
| Corispermum . L. | 13 | Cunonia . III. | 62 |
| Cornucopiæ . L. | 155 | Cupania . V. | 358 |
| Cornus . L. | 321 | Cupressus . V. | 348 |
| Cornutia . IV. | 516 | Curatella . III. | 323 |
| Coronilla . IV. | 263 | Curcuma . L. | 8 |
| Corrigiola . II. | 199 | Cuscuta . L. | 340 |
| Cortufa . L. | 408 | Cussonia . II. | 183 |
| Corylus . V. | 342 | Cyanella . VI. | 311 |
| Corymbium . V. | 179 | Cycas . V. | 82 |
| Corynocarpus . II. | 41 | Cyclamen . L. | 419 |
| Corypha . VI. | 390 | Cymbaria . III. | 495 |
| Coltus . L. | 6 | Cynanchum . II. | 80 |
| Cotula . V. | 101 | Cynara . IV. | 429 |
| Coryledon . III. | 117 | Cynoglossum . L. | 388 |
| Coublandia . VI. | 69 | Cynometra . III. | 19 |
| Couepia . III. | 378 | Cynomorium . V. | 282 |

G E N E R U M.

xxix

| | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----|
| Cynofurus . L | 20 | Difa . V. | 236 |
| Cyperus . L | 116 | Disandra . II. | 376 |
| Cypripedium . V. | 236 | Dodartia . III. | 530 |
| Cyrtilla . II. | 39 | Dodecas . III. | 166 |
| Cyrtandra . L | 80 | Dodecatheon . L | 409 |
| Cytinus . V. | 268 | Dodonæa . II. | 396 |
| Cytisus . IV. | 252 | Dolichos . IV. | 223 |

D

| | | | |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| D actylis . L | 202 | Doræna . L | 410 |
| Dais . III. | 43 | Doronicum . V. | 87 |
| Dalbergia . IV. | 180 | Dorstenia . L | 331 |
| Dalechampia . V. | 349 | Diaba . IV. | 10 |
| Danæa . II. | 255 | Dracæna . II. | 321 |
| Daphne . II. | 415 | Dracocephalum . III. | 453 |
| Danifca . V. | 432 | Dracontium . V. | 271 |
| Datura . L | 475 | Drosera . II. | 210 |
| Daucus . II. | 134 | Dryandra . V. | 456 |
| Decumaria . III. | 161 | Dryas . III. | 273 |
| Deguelia . IV. | 341 | Drypis . II. | 202 |
| Delima . III. | 307 | Duranta . III. | 541 |
| Delphinium . III. | 326 | Durio . IV. | 353 |
| Dentaria . IV. | 34 | Duroia . II. | 348 |
| Dentela . II. | 252 | | |
| Deutzia . III. | 110 | | |
| Dialium . L | 24 | | |
| Dianthera . L | 44 | | |
| Dianthus . III. | 82 | | |
| Diapensia . L | 402 | | |
| Dichondra . II. | 254 | | |
| Dictamnus . III. | 50 | | |
| Dideltha . V. | 198 | | |
| Digitalis . III. | 503 | | |
| Dilatris . L | 117 | | |
| Dillenia . III. | 336 | | |
| Dioidia . L | 295 | | |
| Dionæa . III. | 81 | | |
| Dioscorea . V. | 423 | | |
| Diosma . II. | 34 | | |
| Dicfpyros . VI. | 55 | | |
| Diphyra . IV. | 345 | | |
| Diplacus . L | 274 | | |
| Durca . II. | 418 | | |

E

| | |
|----------------------|-----|
| E benus . IV. | 217 |
| Echinophora . II. | 129 |
| Echinops . V. | 174 |
| Echites . II. | 70 |
| Echium . L | 397 |
| Eclipta . V. | 116 |
| Elcharra . II. | 305 |
| Ehretia . II. | 13 |
| Ekebergia . III. | 35 |
| Elæagnus . L | 312 |
| Elais . VI. | 393 |
| Elæocarpus . III. | 304 |
| Elæodendrum . II. | 40 |
| Elate . VI. | 394 |
| Elaterium . V. | 290 |
| Elatine . II. | 446 |
| Elatostema . V. | 377 |
| Elcaga . IV. | 455 |
| Elephantopus . V. | 173 |

El'gia . L
 Flymus . L
 Embotarium . L
 Empetrum . V.
 Enounea . III.
 Eucris . L
 Eperua . III.
 Ephedra . V.
 Epibaterium . V.
 Epidendrum . V.
 Epigæa . III.
 Epilobium . II.
 Epimedium . L
 Equisetum . V.
 Eranthemum . I
 Erica . II.
 Erigerum . V.
 Erinus . III.
 Eriocaulon . L
 Eriocephalus . V.
 Eriophorum . L
 Erithalis . L
 Ervum . IV.
 Eryngium . II.
 Erythraum . IV.
 Erythrina . IV.
 Erythronium . II.
 Erythroxyton . III.
 Eucallonia . II.
 Ethulia . IV.
 Euclea . V.
 Evea . L
 Eugenia . III.
 Evolvulus . II.
 Evonymus . II.
 Eupatorium . IV.
 Euphorbia . III.
 Euphrasia . III.
 Euria . III.
 Euryandra . III.
 Exacum . L
 Exœccaria . V.

411

233

337

404

384

119

147

441

379

237

56

387

321

80

24

400

37

513

240

170

153

471

250

119

481

183

301

115

40

467

432

357

211

204

31

408

176

471

165

385

311

406

F

F

agara . L

agonia . III.

agæa . L

agis . V.

alkia . II.

amarea . L

arraria . V.

aula . II.

estuca . L

evillea . V.

icus . VI.

ilago . V.

lacourtia . V.

lagellaria . II.

fontinalis . VI.

forskohlea . III.

fortiera . V.

fothergilla . III.

fragaria . III.

frænkenia . II.

praxinus . VI.

tritillaria . II.

fuchsia . III.

fucus . VI.

fuirena . L

fumaria . IV.

333

38

418

341

355

357

248

148

207

418

62

170

453

263

153

119

247

147. 315

261

253

54

258

395

202

152

169

G

G

ahnia . II.

ailarda . V.

galanthus . II.

galax . II.

galoxia .

galea . IV.

galenia . II.

gleopsis . III.

galipea . III.

galium . L

galopina . L

354

202

274

40

86

291

44

431

355

290

339

G E N E R U M.

xxxi

| | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| Garcinia . III. | 161 | Gratiola . L. | 47 |
| Cardenia . II. | 65 | Grewia . V. | 265 |
| Garidella . III. | 110 | Grias . | 302 |
| Gaura . II. | 387 | Grielum . III. | 125 |
| Geniostoma . II. | 251 | Grittea . II. | 390 |
| Genipa . L. | 497 | Gronovia . II. | 45 |
| Genista . IV. | 189 | Grubbia . II. | 441 |
| Gentiana . II. | 109 | Gujacum . III. | 28 |
| Geoffroya . IV. | 257 | Gualteria . III. | 56 |
| Geranium . IV. | 93 | Guapira . II. | 372 |
| Gerardia . III. | 481 | Guarea . II. | 392 |
| Geropogon . IV. | 376 | Guertarda . V. | 350 |
| Geruma . II. | 245 | Guilandina . III. | 27 |
| Gesneria . III. | 433 | Gundelia . V. | 175 |
| Gethyllis . II. | 338 | Gunnera . V. | 247 |
| Geum . III. | 271 | Gustavia . IV. | 117 |
| Gingidum . II. | 255 | Gymnandra . L. | 78 |
| Ginkgo . VI. | 396 | Gynopogon . II. | 253 |
| Ginora . III. | 171 | Gymnostomum . V. | 385 |
| Giskia . II. | 18 | Gypsophila . III. | 77 |
| Glabraria . IV. | 352 | Gyrocarpus . VI. | 396 |
| Gladiolus . L. | 102 | | |
| Glaucena . II. | 441 | | |
| Glaux . II. | 60 | | |
| Glecoma . III. | 418 | | |
| Gleditsia . VI. | 54 | | |
| Glinus . III. | 196 | | |
| Globba . L. | 71 | | |
| Globularia . L. | 272 | | |
| Glochidion . II. | 385 | | |
| Gloriosa . II. | 300 | | |
| Gluta . V. | 250 | | |
| Glycine . IV. | 230 | | |
| Glycyrrhiza . IV. | 263 | | |
| Gmelina . III. | 512 | | |
| Gnaphalium . V. | 13 | | |
| Gnetum . V. | 364 | | |
| Gnidia . II. | 418 | | |
| Gomozia . L. | 341 | | |
| Gomphrena . II. | 105 | | |
| Gonocarpus . L. | 354 | | |
| Gordonia . IV. | 153 | | |
| Gorteria . V. | 131 | | |
| Gossypium . IV. | 141 | | |
| Gouania . VI. | 37 | | |
| Goupia . II. | 257 | | |

H

| | |
|----------------------|-----|
| Hæmanthus . II. | 273 |
| Hæmatoxylum . III. | 32 |
| Halesia . III. | 162 |
| Halleria . III. | 512 |
| Haloragis . II. | 440 |
| Hamamelis . L. | 340 |
| Hamellia . L. | 464 |
| Hartogia . L. | 336 |
| Hasselquistia . II. | 129 |
| Hebenstreitia . III. | 512 |
| Hedera . II. | 45 |
| Hedycaria . V. | 48 |
| Hedyotis . L. | 287 |
| Hedyotum . IV. | 270 |
| Heisteria . III. | 43 |
| Helenium . V. | 89 |
| Helianthus . V. | 124 |
| Heliconia . II. | 50 |
| Helicteres . V. | 263 |
| Heliocarpus . III. | 172 |

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------|--------|
| Heliophila . IV. | 55 | Hydrastis . III. | 373 |
| Heliotropium . L. | 377 | Hydrocharis . V. | 429 |
| Helonias . II. | 367 | Hydrocotile . II. | 121 |
| Helleborus . III. | 372 | Hydrolea . II. | 107 |
| Helvella . VI. | 357 | Hydrophil-x . L. | 325 |
| Hemerocallis . II. | 339 | Hydrophyllum . L. | 410 |
| Hemimeris . III. | 503 | Hymenæa . III. | 17 |
| Hemionitis . VI. | 107 | Hyobanche . III. | 530 |
| Heracleum . II. | 154 | Hyoscyamus . L. | 477 |
| Hermannia . IV. | 88 | Hyoseris . IV. | 420 |
| Hermas . VI. | 18 | Hypocoum . L. | 341 |
| Hernandia . V. | 307 | Hyperanthera . II. | 247 |
| Herniaria . II. | 93 | Hypericum . IV. | 359 |
| Hesperis . IV. | 57 | Hypnum . VI. | 178 |
| Heuchera . II. | 108 | Hypochaeris . IV. | 422 |
| Heynaffoli . II. | 442 | Hypoxis . II. | 303 |
| Hibiscus . IV. | 142 | Hyssopus . III. | 414 |
| Hieracium . IV. | 400 | | |
| Hillia . II. | 352 | I | |
| Hippia . V. | 169 | | |
| Hippocratea . L. | 95 | J | |
| Hippocrepis . IV. | 267 | Jacquinia . II. | 8 |
| Hippomane . V. | 363 | Jambolifera . II. | 391 |
| Hippophaë . V. | 412 | Jasione . V. | 180 |
| Hippuris . L. | 11 | Jasminum . L. | 20 |
| Hiræa . III. | 114 | Jatropha . V. | 358 |
| Hirtella . II. | 42 | Iberis . IV. | 23 |
| Holcus . VI. | 16 | Icica . II. | 444 |
| Holosteum . L. | 242 | Ignatia . L. | 497 |
| Homalium . III. | 384 | Illecebrum . II. | 56 |
| Hordeum . L. | 235 | Ilex . L. | 341 |
| Hopea . IV. | 354 | Ilicium . III. | 336 |
| Horminum . III. | 455 | Impatiens . V. | 195 |
| Hortonia . L. | 410 | Imperatoria . II. | 174 |
| Hovenia . II. | 38 | Indigofera . IV. | 286 |
| Houmiri . III. | 379 | Inocarpus . III. | 58 |
| Houstonia . L. | 295 | Inula . V. | 77 |
| Houtuynia . III. | 373 | Ipomoea . L. | 436 |
| Hudsonia . III. | 166 | Irefine . V. | 416 |
| Hugonia . IV. | 93 | Iris . I. | 107 |
| Humulus . V. | 417 | Iroucana . II. | 443 |
| Hura . V. | 364 | Ifatis . IV. | 74 |
| Hyacinthus . II. | 325 | Ischæmum . VI. | 21 |
| Hydnum . VI. | 552 | Isnardia . L. | 330 |
| Hydrangea . III. | 62 | Ixotes . VI. | 143 |
| | | | Isopy- |

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|------------|
| Ifoppyrum . III. | <u>371</u> | Lathræa . III. | 474 |
| Itea . II. | <u>40</u> | Lathyrus . IV. | <u>238</u> |
| Iva . V. | <u>323</u> | Lavatera . IV. | <u>137</u> |
| Juglans . V. | <u>340</u> | Lavandula . III. | 420 |
| Ivira . IV. | <u>158</u> | Laugeria . II. | 16 |
| Juncus . II. | <u>341</u> | Laurembergia . V. | <u>376</u> |
| Jungermannia . VI. | <u>195</u> | Laurus . II. | 450 |
| Jungia . V. | <u>176</u> | Lawsonia . II. | <u>397</u> |
| Juniperus . V. | 438 | Laxmannia . V. | <u>202</u> |
| Jussieua . III. | <u>41</u> | Leea . V. | <u>328</u> |
| Justicia . I. | <u>35</u> | Lechea . I. | 245 |
| Ixia . I. | <u>96</u> | Lecythis . III. | 305 |
| Ixora . I. | <u>305</u> | Ledum . III. | 51 |

K

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|------------|
| K æmpheria . I. | 9 | Lemna . V. | <u>292</u> |
| Kalmia . III. | <u>50</u> | Leontice . II. | <u>317</u> |
| Kiggelaria . V. | 430 | Leontodon . IV. | 395 |
| Kleinhovia . V. | 263 | Leonurus . III. | 441 |
| Kleinia . V. | <u>198</u> | Lepidium . IV. | 14 |
| Knautia . I. | <u>285</u> | Lerchea . IV. | 87 |
| Knoxia . I. | 295 | Leskia . VI. | <u>388</u> |
| Kœnigia . I. | <u>242</u> | Leucadendrum . Vid. Pro- | |
| Krameria . I. | <u>336</u> | tea . | |
| Kuhnia . I. | 471 | Leucoium . II. | <u>274</u> |
| Kyllinga . I. | <u>151</u> | Leysera . V. | 91 |

L

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| L achenalia . II. | 270 | Licania . II. | <u>228</u> |
| Lahnæa . II. | 423 | Licaria . II. | 279 |
| Lactuca . IV. | <u>387</u> | Lichen . VI. | 209 |
| Lactia . III. | <u>304</u> | Licuala . II. | 266 |
| Lagerstroemia . III. | <u>308</u> | Ligusticum . II. | <u>156</u> |
| Lagoecia . II. | 48 | Ligustrum . I. | <u>21</u> |
| Lagurus . I. | <u>226</u> | Lilium . II. | <u>296</u> |
| Lanum . III. | 429 | Limeum . II. | <u>377</u> |
| Landia . IV. | <u>339</u> | Limodorum . V. | 233 |
| Lantana . III. | 513 | Limonia . III. | 40 |
| Lapiroufa . I. | <u>251</u> | Limofella . III. | 527 |
| Lapsana . IV. | 424 | Linnæa . III. | <u>126</u> |
| Laferpitium . II. | <u>150</u> | Linconia . II. | 93 |
| | | Lindera . II. | 340 |
| | | Lindernia . III. | 517 |
| | | Linum . II. | 212 |
| | | Liparia . IV. | <u>252</u> |
| | | Lippi . III. | 531 |
| | | Liquidambar . V. | <u>343</u> |
| | | Liriodendron . III. | <u>336</u> |
| | | Lilanthus . I. | 416 |

Tom. VI.

E e

Lirchi . II.
 Lufospermum . **L**
 Littorella . V.
 Lobelia . V.
 Lœflingia . **L**
 Lœelia . III.
 Lohum . **L**
 Lomenia . **L**
 Lonchitis . VI.
 Lonicera . **L**
 Loofa . III.
 Lopanthus . II.
 Loranthus . II.
 Lotus . IV.
 Ludwigia . **L**
 Lunaria . IV.
 Lupinus . IV.
 Lychis . III.
 Lycum . II.
 Lycoperdon . VI.
 Lycopodium . V.
 Lycopus . **L**
 Lycopsis . **L**
 Lygeum . **L**
 Lymachia . **L**
 Lythrum . III.

M

Maba . V.
 Mabea . V.
 Macoucoria . **L**
 Macrocnemum . **L**
 Maesa . II.
 Mæura . III.
 Magnolia . III.
 Mahernia . II.
 Mahurea . III.
 Majeta . III.
 Malacra . IV.
 Malanea . **L**
 Malicope . II.
 Malope . IV.
 Malpighia . III.
 Malva . IV.

446 Mamea . III. **301**
 381 Manabea . **L** **313**
 310 Manettia . **L** **333**
 180 Mangifera . II. **41**
 94 Manifuris . VI. **24**
 5 6 Manulea . III. **120**
 230 Mapania . **L** **249**
 251 Maprounea . V. **447**
 107 Maranta . **L** **7**
 463 Marchantia . VI. **204**
 307 Marcgravia . III. **287**
 252 Margaritaria . V. **418**
 351 Maripa . II. **240**
 328 Marrubium . III. **439**
 325 Marfana . III. **141**
 33 Marfilea . VI. **142**
 217 Martynia . III. **496**
 132 Massonia . II. **280**
 6 Matasba . II. **444**
 369 Matelea . II. **253**
 144 Matricaria . V. **99**
 56 Matthiola . **L** **472**
 391 Mauritia . VI. **395**
 155 Mayaca . **L** **248**
 411 Mayena . V. **456**
 169 Meborea . V. **277**
 Medea . II. **366**
 Medicago . IV. **331**
 Mehania . II. **246**
 405 Melaleuca . IV. **353**
 381 Melampodium . V. **151**
 355 Melampyrum . III. **472**
 459 Melanthium . II. **305**
 247 Melastoma . III. **44**
 374 Melia . III. **35**
 337 Melianthus . III. **549**
 227 Melica . **L** **189**
 378 Melicocca . II. **391**
 141 Melicytus . V. **452**
 128 Melitta . III. **452**
 358 Melistaurum . VI. **75**
 442 Melittis . III. **455**
 139 Melochia . IV. **90**
 110 Melodinus . II. **78**
 130 Melothria . **L** **93**

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| Memecylon . II. | <u>397</u> | Mourera . III. | <u>342</u> |
| Menais . L | <u>471</u> | Moutiri . III. | <u>150</u> |
| Menispermum . V. | <u>432</u> | Mourouoa . II. | <u>241</u> |
| Meniba . III. | <u>474</u> | Mouroubea . IV. | <u>125</u> |
| Mentzelia . III. | <u>307</u> | Moutouchi . IV. | <u>341</u> |
| Menyanthes . I. | <u>479</u> | Mucor . VI. | <u>34</u> |
| Mercurialis . V. | <u>428</u> | Müllera . IV. | <u>257</u> |
| Meryta . V. | <u>449</u> | Münchhausia . IV. | <u>312</u> |
| Mesembrianthemum . III. | <u>245</u> | Muntingia . III. | <u>298</u> |
| Mespilus . III. | <u>228</u> | Murraya . III. | <u>33</u> |
| Messerschmidia . L | <u>400</u> | Musa . VI. | <u>7</u> |
| Mesua . IV. | <u>154</u> | Mussaenda . L | <u>471</u> |
| Michelia . III. | <u>337</u> | Mussa . V | <u>82</u> |
| Micropus . V. | <u>172</u> | Mygrum . IV. | <u>6</u> |
| Milium . L | <u>178</u> | Mygoda . L | <u>347</u> |
| Milleria . V. | <u>151</u> | Myosotis . L | <u>380</u> |
| Millingtonia . III. | <u>342</u> | Myosurus . II. | <u>228</u> |
| Mimosa . VI. | <u>39</u> | Myrica . V. | <u>412</u> |
| Mimulus . III. | <u>543</u> | Myrtiophyllum . V. | <u>331</u> |
| Mimusops . II. | <u>391</u> | Myrcina . L | <u>6</u> |
| Minuartia . L | <u>244</u> | Myrospermum . III. | <u>150</u> |
| Mirabilis . L | <u>472</u> | Myroxylon . III. | <u>26</u> |
| Mitchella . L | <u>306</u> | & V. | <u>454</u> |
| Mitella . III. | <u>76</u> | Myrsine . II. | <u>29</u> |
| Mniarum . L | <u>14</u> | Myrtus . III. | <u>254</u> |
| Mnium . VI. | <u>158</u> | Myrsinica . III. | <u>304</u> |
| Mœhringia . II. | <u>426</u> | | |
| Molugo . L | <u>243</u> | | N |
| Molucella . III. | <u>445</u> | | |
| Momordica . V. | <u>366</u> | Najas . V. | <u>394</u> |
| Monetia . L | <u>352</u> | Namas . II. | <u>107</u> |
| Monniera . IV. | <u>168</u> | Nandina . II. | <u>353</u> |
| Monotropa . III. | <u>41</u> | Napæa . V. | <u>442</u> |
| Monsonia . IV. | <u>350</u> | Napimoga . III. | <u>384</u> |
| Montia . L | <u>241</u> | Narcissus . II. | <u>275</u> |
| Montinia . V. | <u>471</u> | Nardus . L | <u>154</u> |
| Montira . III. | <u>153</u> | Nauclea . L | <u>458</u> |
| Moquilea . III. | <u>278</u> | Nepenthes . V. | <u>249</u> |
| Moræa . L | <u>405</u> | Nepeta . III. | <u>415</u> |
| Morina . L | <u>71</u> | Nephelium . V. | <u>310</u> |
| Morinda . L | <u>459</u> | Nerium . II. | <u>70</u> |
| Morisonia . IV. | <u>154</u> | Neurada . III. | <u>139</u> |
| Moronobea . IV. | <u>365</u> | Nicotiana . L | <u>478</u> |
| Morus . V. | <u>319</u> | Nigella . III. | <u>333</u> |
| Molcharia . V. | <u>277</u> | | |

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| Nigrina . L | <u>331</u> | Ofmites . V. | <u>130</u> |
| Nipa . V. | <u>289</u> | Ofmunda . VI. | <u>86</u> |
| Nissolia . IV. | <u>180</u> | Osteospermum . V. | <u>162</u> |
| Nitraria . III. | <u>166</u> | Osyris . V. | <u>404</u> |
| Nolana . L | <u>402</u> | Othera . L | <u>318</u> |
| Nonatelia . II. | <u>236</u> | Othonna . V. | <u>165</u> |
| Norantea . III. | <u>377</u> | Ovieda . III. | <u>541</u> |
| Nychtantes . L | <u>18</u> | Ouratea . III. | <u>146</u> |
| Nymphæa . III. | <u>299</u> | Ourouparia . II. | <u>235</u> |
| Nyssa . VI. | <u>57</u> | Outea . L | <u>246</u> |
| | | Oxalis . III. | <u>126</u> |

O

| | |
|-------------------------|------------|
| O bolaria . III. | <u>528</u> |
| Ochna . III. | <u>301</u> |
| Ocotea . IV. | <u>364</u> |
| Ocymum . III. | <u>457</u> |
| Odiera . V. | <u>173</u> |
| Oenanthe . II. | <u>165</u> |
| Oenothera . II. | <u>385</u> |
| Olex . L | <u>91</u> |
| Oldenlandia . L | <u>227</u> |
| Olea . L | <u>22</u> |
| Olyra . V. | <u>295</u> |
| Omphalea . V. | <u>305</u> |
| Onoclea . VI. | <u>83</u> |
| Ononis . IV. | <u>205</u> |
| Orapordum . IV. | <u>447</u> |
| Oncina . L | <u>392</u> |
| Ophiorrhiza . L | <u>416</u> |
| Ophioglossum . VI. | <u>84</u> |
| Ophioxylum . VI. | <u>32</u> |
| Ophira . II. | <u>415</u> |
| Ophrys . V. | <u>224</u> |
| Orchis . V. | <u>207</u> |
| Origanum . III. | <u>447</u> |
| Orixa . L | <u>318</u> |
| Ornithogalum . II. | <u>305</u> |
| Ornithopus . IV. | <u>266</u> |
| Orobanchè . III. | <u>528</u> |
| Orobis . IV. | <u>237</u> |
| Orontium . II. | <u>340</u> |
| Ortegia . L | <u>93</u> |
| Oryza . II. | <u>354</u> |
| Oileckia . II. | <u>383</u> |

P

| | |
|------------------------|------------|
| P acouria . II. | <u>244</u> |
| Pacourina . V. | <u>197</u> |
| Pæderota . L | <u>38</u> |
| Pæderia . II. | <u>84</u> |
| Pæonia . III. | <u>324</u> |
| Pallisia . III. | <u>196</u> |
| Paloue . II. | <u>457</u> |
| Panax . VI. | <u>59</u> |
| Pancratium . II. | <u>278</u> |
| Pandanus . V. | <u>393</u> |
| Panicum . L | <u>163</u> |
| Papaver . III. | <u>295</u> |
| Paralea . III. | <u>381</u> |
| Pariana . V. | <u>383</u> |
| Parietaria . VI. | <u>26</u> |
| Parinari . III. | <u>277</u> |
| Paris . II. | <u>439</u> |
| Parivoa . IV. | <u>343</u> |
| Parkinsonia . III. | <u>17</u> |
| Parnassia . II. | <u>204</u> |
| Parthenium . V. | <u>322</u> |
| Paspalum . L | <u>161</u> |
| Passerina . II. | <u>121</u> |
| Pastiflora . V. | <u>251</u> |
| Pastinaca . II. | <u>178</u> |
| Parabea . L | <u>359</u> |
| Paragonula . II. | <u>12</u> |
| Patyma . II. | <u>238</u> |
| Pavetta . L | <u>306</u> |
| Paullinia . II. | <u>435</u> |

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Payparola . II. | <u>243</u> | Phyſalis . L | 480 |
| Pectis . V. | <u>93</u> | Phyteuma . L | 455 |
| Pedaliſm . III. | <u>549</u> | Phytolacca . III. | <u>140</u> |
| Pedicularis . III. | <u>475</u> | Picris . IV. | <u>383</u> |
| Pegamea . L | <u>360</u> | Pilularia . VI. | <u>143</u> |
| Peganum . III. | <u>165</u> | Pimpinella . II. | <u>181</u> |
| Pekea . III. | <u>385</u> | Pinguicula . L | <u>49</u> |
| Peltaria . IV. | <u>31</u> | Pinus . V. | <u>343</u> |
| Penæa . L | <u>308</u> | Piper . L | <u>74</u> |
| Pennantia . III. | <u>72</u> | Piratinera . L | <u>385</u> |
| Pentapetes . IV. | <u>116</u> | Piripea . III. | <u>553</u> |
| Penthorum . III. | <u>125</u> | Piriqueta . II. | <u>258</u> |
| Peplis . II. | <u>354</u> | Piſcidia . IV. | <u>184</u> |
| Perama . L | <u>351</u> | Piſonia . VI. | <u>59</u> |
| Perdiciſm . V. | <u>88</u> | Piſſicia . V. | <u>414</u> |
| Perebea . III. | <u>69</u> | Piſſia . V. | <u>262</u> |
| Pergularia . II. | <u>78</u> | Piſum . IV. | <u>236</u> |
| Perilla . III. | <u>428</u> | Piagianthus . IV. | <u>160</u> |
| Periploca . II. | <u>28</u> | Plantago . L | <u>912</u> |
| Peraſioides . L | <u>349</u> | Platanus . V. | <u>342</u> |
| Petefia . L | <u>306</u> | Plectranthus . III. | <u>550</u> |
| Petitia . L | <u>351</u> | Plectronia . II. | <u>42</u> |
| Petiveria . II. | <u>368</u> | Plinia . III. | <u>223</u> |
| Petrea . III. | <u>513</u> | Plukenetia . V. | <u>349</u> |
| Peucedanum . II. | <u>143</u> | Plumbago . L | <u>420</u> |
| Peziza . VI. | <u>358</u> | Plumeria . II. | <u>73</u> |
| Phaca . IV. | <u>245</u> | Poa . I. | <u>191</u> |
| Phalaris . L | <u>158</u> | Podophyllum . III. | <u>293</u> |
| Phallus . VI. | <u>354</u> | Poinſiana . III. | <u>26</u> |
| Pharnaceum . II. | <u>199</u> | Polemonium . L | <u>441</u> |
| Pharus . V. | <u>329</u> | Polyanthes . II. | <u>325</u> |
| Phafcum . VI. | <u>151</u> | Pollia . II. | <u>318</u> |
| Phafeolus . IV. | <u>219</u> | Polycarpon . L | <u>243</u> |
| Phellandrium . II. | <u>167</u> | Polychnemon . L | <u>94</u> |
| Philadelphus . III. | <u>209</u> | Polygala . IV. | <u>172</u> |
| Phileum . L | <u>174</u> | Polygonum . II. | <u>426</u> |
| Phlomis . III. | <u>442</u> | Polyminia . V. | <u>154</u> |
| Phlox . L | <u>421</u> | Polypodium . V. | <u>115</u> |
| Phœnix . VI. | <u>393</u> | Polypræmum . L | <u>308</u> |
| Phryma . III. | <u>467</u> | Polyſcias . II. | <u>448</u> |
| Phylica . II. | <u>25</u> | Polytrichum . VI. | <u>156</u> |
| Phyllanthus . V. | <u>308</u> | Pomereula . L | <u>155</u> |
| Phyllachne . V. | <u>240</u> | Pometia . V. | <u>180</u> |
| Phyllirea . L | <u>22</u> | Pontederia . II. | <u>272</u> |
| Phyllis . II. | <u>118</u> | Populus . V. | <u>426</u> |

| | | | |
|-------------------|-----|---------------------|-----|
| Porana . L. | 413 | Quebitea . V. | 276 |
| Poraqueiba . II. | 229 | Quercus . V. | 336 |
| Porella . VI. | 250 | Queria . L. | 245 |
| Portlandia . L. | 460 | Quisqualis . III. | 43 |
| Portulaca . III. | 166 | | |
| Posoqueria . II. | 231 | R | |
| Possira . VI. | 68 | | |
| Potalia . III. | 45 | | |
| Potamogeton . L. | 343 | Racoubea . III. | 383 |
| Potentilla . III. | 263 | Rajania . V. | 422 |
| Poterium . V. | 335 | Randia . L. | 417 |
| Pothos . V. | 271 | Ranunculus . II. | 360 |
| Pourouma . V. | 458 | Rapatea . II. | 371 |
| Pouteria . L. | 354 | Raphanus . IV. | 70 |
| Praefium . III. | 467 | Raputia . III. | 515 |
| Premna . III. | 513 | Ravenula . II. | 371 |
| Prenanthes . IV. | 391 | Ravenfara . III. | 276 |
| Primula . L. | 405 | Rauwolfia . II. | 63 |
| Prinos . II. | 348 | Reaumuria . III. | 234 |
| Prockia . III. | 520 | Remirea . L. | 249 |
| Proserpinaca . I. | 241 | Renealmia . L. | 3 |
| Profopis . III. | 32 | Refeda . III. | 174 |
| Protaca . L. | 259 | Restio . V. | 405 |
| Prunella . III. | 466 | Rerzia . L. | 415 |
| Prunus . III. | 218 | Rhacoma . L. | 318 |
| Psidium . III. | 210 | Rhamnus . II. | 19 |
| Pforalea . IV. | 312 | Rheedia . III. | 288 |
| Psychotria . L. | 461 | Rheum . II. | 455 |
| Ptelea . L. | 324 | Rhexia . II. | 584 |
| Pteris . VI. | 98 | Rhinanthus . III. | 470 |
| Pterocarpus . IV. | 181 | Rhizophora . III. | 158 |
| Pteronia . IV. | 474 | Rhodiola . V. | 427 |
| Puccinia . VI. | 384 | Rhododendron . III. | 51 |
| Pulmonaria . L. | 390 | Rhus . II. | 185 |
| Punica . III. | 217 | Riana . II. | 241 |
| Pyrola . III. | 58 | Ribes . II. | 42 |
| Pyrus . III. | 231 | Riccia . VI. | 207 |
| | | Ricardia . II. | 346 |
| | | Ricinus . V. | 361 |
| | | Ricotia . IV. | 34 |
| | | Rinovea . II. | 241 |
| | | Ripogonum . II. | 370 |
| | | Rovina . L. | 326 |
| | | Robinia . IV. | 257 |
| | | Roëlla . L. | 454 |

Q

Qualea . L.
 Quapoya . V.
 Quaraibea . IV.
 Quassia . III.

14
 448
 157
 27

C E N T R U M.

xxxix

| | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Rokejcka . III. | 151 | Sanicula . II. | 113 |
| Ronabea . II. | 232 | Santalum . L | 334 |
| Rondeletia . L | 458 | Santolina . IV. | 453 |
| Ropourea . II. | 439 | Sapindus . II. | 418 |
| Roridula . II. | 48 | Saponaria . III. | 80 |
| Rosa . III. | 452 | Saraca . IV. | 168 |
| Rosmarinus . L | 39 | Sarothra . II. | 203 |
| Rotala . L | 93 | Sarracena . III. | 298 |
| Rothölla . L | 211 | Satureja . III. | 412 |
| Rouhamon . L | 356 | Satyrium . V. | 221 |
| Roupala . L | 314 | Saururus . II. | 277 |
| Rourea . III. | 112 | Sauvageia . II. | 48 |
| Royenia . III. | 61 | Saxifraga . III. | 64 |
| Rubia . L | 304 | Scabiosa . L | 274 |
| Rubus . III. | 258 | Scabrita . I. | 283 |
| Rudbeckia . V. | 126 | Scævola . L | 460 |
| Ruellia . III. | 333 | Scandix . II. | 169 |
| Rumex . II. | 355 | Scheffelia . L | 418 |
| Rumphia . I. | 91 | Schæffera . II. | 254 |
| Ruppia . L | 346 | Scherardia . L | 292 |
| Ruscus . V. | 443 | Scheuchzeria . II. | 264 |
| Russelia . II. 118. & III. | 112 | Schima . VI. | 67 |
| Ruta . III. | 30 | Schinus . V. | 431 |
| Ruyfchia . II. | 250 | Schmidelia . II. | 414 |
| | | Schoenus . L | 121 |
| | | Schrebera . II. | 107 |
| | | Schwalbea . III. | 475 |
| | | Schwenkia . L | 48 |
| | | Sciefferia . L | 450 |
| | | Scilla . II. | 309 |
| | | Scirpus . L | 139 |
| | | Scleranthus . III. | 76 |
| | | Scleria . V. | 376 |
| | | Sclerocarpus . V. | 131 |
| | | Scolymus . IV. | 416 |
| | | Scoparia . L | 317 |
| | | Scopolia . V. 262. & VI. | 74 |
| | | Scorpiurus . IV. | 268 |
| | | Scorzonera . IV. | 379 |
| | | Scrophularia . III. | 498 |
| | | Scutellaria . III. | 463 |
| | | Secale . L | 214 |
| | | Securidaca . IV. | 179 |
| | | Sedum . III. | 119 |
| | | Seguieria . III. | 123 |

E e iv

S

| | |
|--------------------|-----|
| Sabicea . II. | 238 |
| Saccharum . L | 156 |
| Sagina . L | 346 |
| Sagittaria . V. | 331 |
| Sagonea . II. | 256 |
| Salacia . V. | 249 |
| Salicornia . L | 10 |
| Salix . V. | 395 |
| Salola . II. | 99 |
| Salvadora . L | 337 |
| Salvia . L | 59 |
| Samara . L | 323 |
| Sambucus . II. | 194 |
| Samolus . L | 458 |
| Samyda . III. | 60 |
| Sanguinaria . III. | 293 |
| Sanguisorba . L | 319 |

| | | | |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Selago . III. | 517 | Soldanella . L | 408 |
| Selinum . II. | 139 | Solidago . V. | 69 |
| Semecarpus . II. | 185 | Sonchus . IV. | 384 |
| Sempervivum . III. | 197 | Sonneratia . III. | 224 |
| Senecio . V. | 45 | Sophora . III. | 10 |
| Septas . II. | 378 | Soramia . III. | 377 |
| Serapias . V. | 237 | Sorbus . III. | 217 |
| Serilla . IV. | 482 | Sperganium . V. | 293 |
| Seriphium . V. | 178 | Sparrmania . III. | 303 |
| Serpicula . V. | 310 | Spartium . IV. | 185 |
| Serratula . IV. | 428 | Spathelia . II. | 195 |
| Sesamum . III. | 332 | Spergula . III. | 138 |
| Seseli . II. | 124 | Spermacece . L | 289 |
| Sesuvium . III. | 218 | Sphæranthus . V. | 174 |
| Shawia . V. | 202 | Sphagnum . VI. | 150 |
| Sibbaldia . II. | 227 | Spigelia . L | 415 |
| Sibthorpia . III. | 526 | Spilanthus . IV. | 457 |
| Sicyos . V. | 374 | Spinacia . V. | 416 |
| Sida . IV. | 120 | Spinifex . VI. | 9 |
| Sideritis . III. | 421 | Spiræa . III. | 248 |
| Sideroxyloides . L | 350 | Splachnum . VI. | 155 |
| Sideroxylon . II. | 17 | Spondias . III. | 166 |
| Sigesbeckia . V. | 117 | Strachys . III. | 433 |
| Silene . III. | 90 | Stæbelina . IV. | 477 |
| Silphium . V. | 152 | Stapelia . II. | 92 |
| Simaba . III. | 146 | Staphylea . II. | 195 |
| Simbuleta . III. | 551 | Statice . II. | 208 |
| Simira . II. | 235 | Stellaria . III. | 100 |
| Sinapis . IV. | 66 | Stellera . II. | 421 |
| Singana . III. | 381 | Stemodia . III. | 528 |
| Sipanea . II. | 212 | Sterculia . V. | 362 |
| Siparuna . V. | 381 | Steris . II. | 104 |
| Siphonanthus . L | 305 | Stewartia . IV. | 153 |
| Sirium . L | 325 | Stilbe . VI. | 57 |
| Sifon . II. | 162 | Stipa . L | 220 |
| Sisymbrium . IV. | 39 | Stilago . V. | 289 |
| Sisyrinchium . V. | 248 | Stillingia . V. | 364 |
| Sium . II. | 160 | Stoebe . V. | 176 |
| Skimmia . L | 318 | Stratiotes . III. | 334 |
| Sloanea . III. | 300 | Strumphia . V. | 179 |
| Smilax . V. | 419 | Struthiola . L | 334 |
| Smyrniun . II. | 179 | Strychnos . L | 496 |
| Sodada . II. | 441 | Styrax . III. | 60 |
| Solandra . IV. | 127 | Subularia . IV. | 10 |
| Solanum . L | 484 | Suriana . III. | 135 |

G E N E R U M.

| | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| Symphonia . IV. | 88 | Thelymitra . V. | 276 |
| Symphytum . I. | 391 | Themeda . VI. | 68 |
| Symplecos . IV. | 354 | Theobroma . IV. | 348 |
| Syringa . I. | 23 | Theophrasta . L | 414 |
| Sw-nckia . L | 48 | Thesium . II. | 61 |
| Swertia . II. | 108 | Thlaspi . IV. | 18 |
| Swietenia . III. | 34 | Thea . V. | 382 |
| | | Thouinia . L | 72 |
| | | Thryallis . III. | 40 |
| | | Thryophilon . VI. | 71 |
| | | Thuja . V. | 346 |
| | | Thumbergia . III. | 495 |
| | | Thymbra . III. | 414 |
| | | Thymus . III. | 449 |
| | | Tiarella . III. | 75 |
| | | Tibouchina . III. | 148 |
| | | Ticorea . IV. | 157 |
| | | Tigarea . V. | 445 |
| | | Tilia . III. | 303 |
| | | Tillæa . L | 347 |
| | | Tillandsia . II. | 268 |
| | | Tinus . II. | 454 |
| | | Tococa . III. | 147 |
| | | Tolwifera . III. | 31 |
| | | Tomex . III. | 157 |
| | | Tondin . II. | 447 |
| | | Tonina . V. | 379 |
| | | Tontalea . L | 358 |
| | | Topobea . III. | 200 |
| | | Tordylium . II. | 130 |
| | | Torenia . III. | 497 |
| | | Tormentilla . III. | 271 |
| | | Touchiroa . III. | 144 |
| | | Toulcia . II. | 447 |
| | | Tounatea . III. | 376 |
| | | Tournefortia . L | 400 |
| | | Touroubea . II. | 242 |
| | | Touroulia . III. | 275 |
| | | Tozzia . III. | 475 |
| | | Trachelium . L | 457 |
| | | Tradescantia . II. | 270 |
| | | Tragia . V. | 305 |
| | | Tragopogon . IV. | 376 |
| | | Trapa . L | 220 |
| | | Tremella . VI. | 258 |

| | | | |
|-------------------|-----|------------------|-----|
| Trewia. III. | 300 | Urtica. V. | 313 |
| Trianthema. III. | 63 | Utricularia. L. | 50 |
| Tribulus. III. | 29 | Uvaria. III. | 338 |
| Trichilia. III. | 33 | Uvularia. II. | 299 |
| Trichomanes. VI. | 139 | | |
| Trichosanthes. V. | 365 | V | |
| Trichostema. III. | 462 | | |
| Tridax. V. | 115 | | |
| Trientalis. II. | 376 | Vaccinium. II. | 398 |
| Trifolium. IV. | 316 | Vahlia. II. | 18 |
| Triglochin. II. | 364 | Valantia. VI. | 24 |
| Trigonella. IV. | 332 | Valeriana. L. | 87 |
| Trigonia. III. | 145 | Vallia. III. | 303 |
| Trigonis. II. | 446 | Vallisneria. V. | 394 |
| Trillium. II. | | Valsa. VI. | 381 |
| Trilix. III. | 288 | Vandellia. III. | 528 |
| Triopteris. III. | 115 | Vantanea. III. | 380 |
| Trionfium. L. | 468 | Varronia. II. | 14 |
| Triplaris. L. | 241 | Vatairea. IV. | 343 |
| Triplacum. V. | 294 | Vateria. III. | 307 |
| Trisedaria. L. | 250 | Vatica. III. | 168 |
| Triticum. L. | 237 | Velezia. II. | 108 |
| Triumfetta. III. | 164 | Vella. IV. | 9 |
| Trollius. III. | 371 | Veratrum. VI. | 8 |
| Tropæolum. II. | 308 | Verbascum. L. | 473 |
| Trophis. V. | 409 | Verbena. L. | 52 |
| Tulbagia. II. | 275 | Verbena. V. | 118 |
| Tulipa. II. | 301 | Veronica. L. | 25 |
| Turia. V. | 377 | Viburnum. II. | 189 |
| Turræa. III. | 34 | Vicia. IV. | 245 |
| Turnera. II. | 197 | Vieusseuxia. L. | 250 |
| Turritis. IV. | 62 | Vinea. II. | 69 |
| Tussilago. V. | 42 | Viola. V. | 183 |
| Typha. V. | 293 | Virea. V. | 197 |
| | | Viresta. L. | 416 |
| | | Viscoides. II. | 249 |
| | | Viscum. V. | 409 |
| | | Visnea. III. | 196 |
| | | Vitex. III. | 544 |
| | | Vitis. II. | 46 |
| | | Vochi. L. | 79 |
| | | Volkameria. III. | 542 |
| | | Volutella. II. | 458 |
| | | Votomita. L. | 355 |
| | | Vouapa. L. | 246 |

U

| | |
|------------|--|
| Ulex. IV. | |
| Ulmus. II. | |
| Ulva. VI. | |
| Uniola. L. | |
| Unona. II. | |
| Urena. II. | |
| Unxia. V. | |

| | |
|-----|--|
| 199 | |
| 106 | |
| 275 | |
| 202 | |
| 341 | |
| 140 | |
| 100 | |

| | | | |
|------------------|------------|---|---------------------|
| Voyria . II. | <u>239</u> | | |
| Wichendorfia . L | <u>117</u> | | |
| Waltheria . IV. | <u>87</u> | | Y |
| Weigela . L | <u>420</u> | Y | ucca . II. |
| Weinmannia . II. | <u>425</u> | | <u>339</u> |
| Weisia . VI. | <u>386</u> | | |
| Willuchia . L | <u>93</u> | | Z |
| Winthera . III. | <u>333</u> | | |
| Witfenia . L | <u>96</u> | | Z |
| Wulfenia . L | <u>11</u> | Z | ama . VI. |
| Warmbea . II. | <u>364</u> | | <u>83</u> |
| | | | Zannichellia . V. |
| | | | <u>287</u> |
| | | | Zanonia . V. |
| | | | <u>418</u> |
| | | | Zanthorrhiza . III. |
| | | | <u>153</u> |
| | | | Zanthoxylum . V. |
| | | | <u>415</u> |
| | | | Zea . V. |
| | | | <u>294</u> |
| | | | Zinnia . V. |
| | | | <u>92</u> |
| | | | Zanzania . V. |
| | | | <u>329</u> |
| | | | Ziziphora . L |
| | | | <u>37</u> |
| | | | Zorgera . V. |
| | | | <u>133</u> |
| | | | Zostera . V. |
| | | | <u>274</u> |
| | | | Zygophyllum . III. |
| | | | <u>35</u> |

X

| | |
|------------------|------------|
| Xanthium . V. | <u>320</u> |
| Xeranthemum . V. | <u>26</u> |
| Ximenia . II. | <u>395</u> |
| Xiphidium . L | <u>247</u> |
| Xylophylla . II. | <u>196</u> |
| Xylopi . V. | <u>265</u> |
| Xyris . L | <u>121</u> |



11-2-79

64 007609103



